




Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری سرطان تخمدان



اگرچه سرطان تخمدان انواع مختلفی دارد، اکثر دانشمندان معتقدند که این عوامل بر خطر کلی سرطان تخمدان تأثیر می‌گذارند. برخی ممکن است برای شما صدق کنند، اما برخی دیگر ممکن است صدق نکنند. و برخی را می‌توان تغییر داد، اما برخی دیگر را نمی‌توان تغییر داد.

زنانی که تحت عمل تخمدان‌برداری (برداشتن تخمدان‌ها) قرار گرفته‌اند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان در آن‌ها کاهش یافته است، اما هنوز هم خطر ابتلا به این بیماری را دارند.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

✓ وزن سالم را حفظ کنید

حفظ وزن مناسب، به‌ویژه بعد از یائسگی، خطر ابتلا به سرطان تخمدان و چند سرطان دیگر (روده بزرگ، کلیه، لوزالمعده و رحم) را کاهش می‌دهد. برای کنترل وزن: فعالیت بدنی منظم داشته باشید. رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات و غلات کامل مصرف کنید. غذا را آهسته و در وعده‌های کوچک‌تر بخورید. در صورت دشواری، از پزشک یا مشاور تغذیه کمک بگیرید.

✓ از درمان هورمونی یائسگی پرهیز کنید – با پزشک درباره خطرات و مزایا صحبت کنید

در حالی که درمان هورمونی یائسگی می‌تواند علائم متوسط تا شدید یائسگی را درمان کند، همچنین می‌تواند خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش دهد. اگر زنان تصمیم به استفاده از هورمون درمانی برای کاهش علائم یائسگی (مانند تعریق شبانه، گرگرفتگی، و خشکی واژن) بگیرند، باید برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باشد – نه بیشتر از ۱ تا ۳ سال. با یک پزشک درباره خطرات و مزایای درمان هورمونی یائسگی صحبت کنید.

✓ از پودر تالک پرهیز کنید:

استفاده پودر بچه به طور منظم در ناحیه تناسلی با افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان مرتبط است. البته دقیقاً هنوز مشخص نیست که چرا این اتفاق می‌افتد.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل تولید مثلی:

عوامل

هوشمند

سلامت



➤ شیردهی

زنانی که به مدت یک سال یا بیشتر شیر می‌دهند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان در آن‌ها کمتر است. وقتی یک زن در حال شیردهی است، تغییرات مهمی در سطح هورمون‌های مختلف در بدن او رخ می‌دهد. این تغییرات به محافظت در برابر سرطان تخمدان کمک می‌کنند.

➤ قرص‌های ضدبارداری

زنانی که قرص‌های ضدبارداری مصرف می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان در آن‌ها کمتر است. هرچه مدت بیشتری یک زن قرص ضدبارداری مصرف کند، خطر او کمتر می‌شود. قرص‌های ضد بارداری از آزاد شدن تخمک‌ها از تخمدان‌ها جلوگیری می‌کنند و سطح هورمون‌های مختلف در بدن زن را تغییر می‌دهند.

قرص‌های ضد بارداری می‌توانند تأثیرات مثبت و منفی بر سلامت زنان داشته باشند. آن‌ها می‌توانند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، سرطان رحم و سرطان تخمدان را در زنان کاهش دهند. با این حال، در حین مصرف آن‌ها، خطر ابتلا به سرطان سینه، حمله قلبی و سکته مغزی در زنان افزایش می‌یابد. برای برخی از زنان، آن‌ها می‌توانند عوارض جانبی مانند تهوع و استفراغ ایجاد کنند. به طور عمیق با یک پزشک درباره خطرات و فواید آن‌ها صحبت کنید. با هم می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا آن‌ها برای شما مناسب هستند یا نه.

➤ تعداد زایمان‌ها

زنان که بیش از ۲ فرزند به دنیا می‌آورند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان کمتری دارند. در حالی که یک زن باردار است، تخمدان‌های او تخمک‌های اضافی آزاد نمی‌کنند و تغییراتی در سطح هورمون‌های مختلف در بدن او رخ می‌دهد. این تغییرات به محافظت در برابر سرطان تخمدان کمک می‌کنند.

➤ سالیپینژکتومی و بستن لوله‌های رحمی

زنانی که لوله‌های فالوپ خود را "بسته" (بستن لوله) یا برداشته (سالیپینژکتومی) کرده‌اند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان در آن‌ها کمتر است. دانشمندان دقیقاً نمی‌دانند چرا، اما برخی انواع سرطان تخمدان ممکن است در لوله‌های فالوپ شروع شوند. بستن یا برداشتن لوله‌ها ممکن است فرآیندی را که منجر به توسعه سرطان تخمدان می‌شود مختل کند.

➤ هیستروکتومی

زنانی که هیستروکتومی (برداشتن رحم) انجام داده‌اند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان کمتری دارند. دانشمندان دقیقاً نمی‌دانند چرا، اما یکی از احتمالات این است که تغییرات در سطح هورمون‌ها پس از عمل جراحی به محافظت از تخمدان‌ها در برابر سرطان کمک می‌کند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن:

خطر ابتلا به سرطان تخمدان با افزایش سن افزایش می‌یابد. در حالی که برخی از زنان در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ سالگی به سرطان تخمدان مبتلا می‌شوند، اکثریت قریب به اتفاق موارد در زنان بالای ۴۵ سال تشخیص داده می‌شود. میانگین سنی که سرطان تخمدان تشخیص داده می‌شود ۶۳ سال است.

▪ قد بلند:

زنان قد بلند خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان تخمدان دارند. محققان دقیقاً نمی‌دانند چرا، اما ممکن است به این دلیل باشد که افراد قد بلند بیشتر رشد می‌کنند. برخی از همان هورمون‌ها و عوامل دیگری که باعث رشد افراد می‌شوند، ممکن است شانس تبدیل شدن سلول‌های تقسیم‌شونده به سلول‌های غیرطبیعی و سرطانی را نیز افزایش دهند.

▪ سابقه خانوادگی:

زنائیکه مادر یا خواهری با سرطان تخمدان دارند، خطر ابتلا به این بیماری در آنها بیشتر است. این به این دلیل است که برخی از موارد سرطان تخمدان به جهش‌هایی در ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن مرتبط هستند که می‌توانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند.

سرطان تخمدان

علائم سرطان تخمدان



درد شکم و لگن
نفخ
خونریزی‌های واژینال بعد از یائسگی
پیوست و اسهال
خستگی
کاهش وزن شدید

علل ابتلا به سرطان تخمدان



● سن بالا
● ابتلا به دیابت
● اختلالات و بیماری‌های ژنتیکی
● بیماری اندومتریوز
● سابقه شیمی درمانی

پیشگیری از سرطان تخمدان





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره سرطان سینه می دانیم، این موارد هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند


چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- شما کمتر از ۲ فرزند به دنیا آورده اید.
- شما سابقه خانوادگی سرطان تخمدان دارید.
- شما به طور منظم از پودر تالک ناحیه تناسلی به مدت ۸ روز یا بیشتر در ماه استفاده کرده اید.
- شما قرص های ضدبارداری مصرف نکرده اید.

چیزی که خطر شما را کاهش می دهد:

- شما قدبلند نیستید.
- شما اضافه وزن ندارید.
- شما در مجموع حداقل یک سال شیر داده اید.
- شما هیستروکتومی داشته اید.
- شما اندومتريوز نداشته اید.
- لوله های فالوپیتان را بسته اید یا برداشته اید.

مراحل سرطان تخمدان



SMART CANCER

Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می‌دهد؟


بررسی ریسک ابتلا

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟



• علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها


Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

• پیروی از سبک زندگی سالم:

ورزش منظم، تغذیه غنی از میوه، سبزیجات و غلات کامل، حفظ وزن مناسب،

• آگاهی از علائم هشداردهنده:

نفخ پایدار، درد یا فشار در لگن/شکم

احساس سیری سریع هنگام غذا خوردن

تغییرات ادراری یا گوارشی جدید

غریبالگری عمومی توصیه نمی‌شود چون شواهد کافی برای کاهش مرگ‌ومیر در جمعیت کم‌خطر

وجود ندارد.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. ارزیابی ژنتیکی و مشاوره

- مشاوره ژنتیک و آزمایش BRCA/Lynch در صورت سابقه خانوادگی یا ریسک ژنتیکی

۲. غربالگری منظم با آزمایشات تخصصی (در شرایط خاص):

- تست CA-125 و سونوگرافی ترانس واژینال هر ۶ تا ۱۲ ماه (بیشتر در زنان با جهش ژنتیکی)
- تأکید بر غربالگری در مراکز تخصصی زنان/سرطان

۳. مدیریت هورمونی:

- اجتناب از هورمون درمانی یا تستوسترون طولانی‌مدت در صورت ریسک بالا

۴. آموزش دقیق علائم هشداردهنده:

- به ویژه برای تشخیص زودهنگام و مراجعه سریع

۵. گزینه‌های پیشگیرانه جراحی (Prophylactic Surgery)

- سالپینژکتومی (تخمدان‌برداری) پیشگیرانه در زنان با جهش BRCA یا سابقه خانوادگی بسیار قوی، معمولاً پس از اتمام برنامه باروری

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و

ارزیابی دقیق انجام شود.