



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری سرطان معده

بیشتر دانشمندان موافقند که این موارد بر خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده تأثیر می‌گذارند. برخی ممکن است برای شما صدق کنند، اما برخی دیگر ممکن است صدق نکنند. و برخی را می‌توان تغییر داد، اما برخی دیگر را نمی‌توان. سرطان لوزالمعده دارای عوامل خطر قابل کنترلی کمی است. اما هنوز هم مهم است که ریسک خود را بشناسید و بدانید این عوامل چگونه با آن مرتبط هستند.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

✓ سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر ابتلا به ۱۵ نوع سرطان، از جمله سرطان لوزالمعده را افزایش می‌دهد. ترک سیگار در هر سنی باعث بهبود سلامت می‌شود.

✓ وزن سالم را حفظ کنید

افرادی که وزن سالم خود را حفظ می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان پروستات تهاجمی کمتری دارند. نگهداشتن وزن در حد مناسب همچنین خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان کلیه، سرطان تخمدان، سرطان رحم، بیماری قلبی، دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهد. این یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. پرس‌های کوچکتر انتخاب کنید و آرام‌تر غذا بخورید. یک رژیم غذایی غنی از میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل بخورید.

✓ فعالیت بدنی را در زندگی خود بگنجانید.

فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می‌برید، مانند پیاده‌روی، دویدن احساس نکنید که باید کاهش وزن را به تنهایی انجام دهید. کاهش وزن و حفظ وزن سالم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. با یک پزشک یا دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی برای مشاوره صحبت کنید. و به یاد داشته باشید: تغییرات کوچک می‌توانند با گذشت زمان تفاوت بزرگی ایجاد کنند



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن:

خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده با افزایش سن افزایش می‌یابد. این بیماری در افراد زیر ۴۵ سال نادر است و میانگین سنی که بیماری تشخیص داده می‌شود ۷۰ سال است.

▪ جنسیت:

مردان نسبت به زنان خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان لوزالمعده دارند. با این حال، این تفاوت در طول زمان در ایالات متحده در حال کاهش است. این ممکن است به عوامل خطر سرطان، مانند سیگار کشیدن، که در زنان رایج‌تر می‌شود، مربوط باشد.

▪ قد:

افراد قد بلند خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان لوزالمعده دارند. محققان دقیقاً نمی‌دانند چرا، اما ممکن است به این دلیل باشد که افراد قد بلند بیشتر رشد می‌کنند. برخی از همان هورمون‌ها و عوامل دیگری که باعث رشد افراد می‌شوند، ممکن است شانس تبدیل شدن سلول‌های تقسیم‌شونده به سلول‌های غیرطبیعی و سرطانی را نیز افزایش دهند.

▪ دیابت:

افرادی که دیابت دارند، خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده در آن‌ها بیشتر است. به طور معمول، لوزالمعده انسولین (یک هورمون) تولید می‌کند که به بدن کمک می‌کند قند خون را کنترل کرده و از آن برای انرژی استفاده کند. وقتی لوزالمعده تولید انسولین را متوقف می‌کند یا بدن نمی‌تواند به درستی از انسولین استفاده کند، قند خون از کنترل خارج می‌شود و این به دیابت معروف است. دیابت ممکن است نشانه‌ای باشد که سلول‌های لوزالمعده به درستی کار نمی‌کنند، اما هنوز مشخص نیست که دیابت چگونه به سرطان لوزالمعده مرتبط است.

▪ گروه خونی:


گروه‌های خونی A، AB و B با افزایش خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده مرتبط هستند. دقیقاً مشخص نیست که چرا این امر چنین است، اما ممکن است حداقل تا حدی به این دلیل باشد که برخی از گروه‌های خونی باعث واکنش‌های ایمنی و التهابی می‌شوند که در توسعه سرطان نقش دارند.

▪ پانکراتیت مزمن:

پانکراتیت مزمن زمانی رخ می‌دهد که تغییرات غیرطبیعی و زخم در لوزالمعده وجود داشته باشد. پانکراتیت مزمن به دلایل مختلفی مانند سوء مصرف الکل، سنگ کیسه صفرا، عفونت یا سایر بیماری‌ها رخ می‌دهد. این تغییرات غیرطبیعی در سلول‌های لوزالمعده ممکن است با گذشت زمان به سرطان منجر شوند.

▪ سابقه خانوادگی:

افرادی که یکی از بستگان نزدیک (مادر، پدر، برادر یا خواهر) آنها به سرطان لوزالمعده مبتلا است، خطر ابتلا به این بیماری در آنها بیشتر است. این به این دلیل است که برخی از سرطان لوزالمعده به جهش‌های ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن مرتبط است که می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه درباره سرطان لوزالمعده می دانیم، اینها عواملی هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند. شما می توانید برخی از آنها را تغییر دهید، اما نه همه آنها را.

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- شما دیابت یا قند خون بالا دارید.
- شما سابقه خانوادگی سرطان لوزالمعده دارید.
- شما گروه خونی A دارید.
- شما دچار پانکراتیت مزمن هستید.

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

- شما سیگار نمی کشید.
- تو قدبلند نیستی.
- شما اضافه وزن ندارید.

علائم سرطان پانکراس

- شکم درد یا کمر درد
- کاهش وزن
- کاهش اشتها
- خستگی
- تحریک پذیری
- مشکلات گوارشی
- بزرگ شدن کیسه صفرا
- لخته شدن خون
- اختلالات بافت چربی
- دیابت
- تورم غدد لنفاوی
- اسهال
- استئاتوره یا مدفوع چرب
- زردی



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟


بررسی ریسک ابتلا

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟



• می‌توان با دقت بیشتری محاسبه کرد.
• علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها

SMART CANCER
Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

سبک زندگی سالم:

- سیگار نکشیدن — سیگار یکی از عوامل خطر مهم برای سرطان پانکراس است.
- کنترل وزن و اجتناب از چاقی
- رژیم غذایی متعادل با میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل
- مدیریت سایر عوامل مرتبط
- کنترل دیابت و پیش‌دیابت
- در صورت داشتن پانکراتیت مزمن (غیر ژنتیکی) پیگیری دقیق‌تر شود

گایدلاین‌ها تأکید می‌کنند که غربالگری افراد بدون علامت و بدون ریسک بالا مؤثر نیست و ممکن است باعث زحمت، هزینه و آسیب‌های غیرضروری شود.



✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

برای افراد پرخطر، برخی گایدلاین‌ها توصیه به انجام پایش / غربالگری هدفمند کرده‌اند. این اقدامات مشروط، با مزایا و معایب، باید با آگاهی کامل و در مراکز دارای تجربه انجام شوند.

۱. مشاوره ژنتیک و بررسی ژنتیکی

- هر فردی که در خانواده‌اش موارد سرطان پانکراس داشته‌اند یا جهش ژنتیکی شناخته شده دارد، باید به مشاور ژنتیک ارجاع داده شود
- بررسی جهش‌هایی مانند BRCA2، PALB2، CDKN2A، STK11 و سایر ژن‌های مرتبط مفید است

۲. شروع غربالگری و پایش

- در افراد پرخطر توصیه می‌شود غربالگری با MRI (یا MRCP) یا EUS (اولتراسوند داخل پانکراس) آغاز شود.
- در کسانی که دارای جهش ژنتیکی هستند، پیشنهاد می‌شود که غربالگری سالانه انجام شود (با MRI یا EUS یا ترکیبی)
- برای جهش‌هایی مانند STK11 (Peutz-Jeghers) و CDKN2A، باید در سن‌های پایین‌تر شروع شود (مثلاً ۳۰-۳۵ یا ۴۰ سال)
- غربالگری در افراد پرخطر از سن ۵۰ سال یا ۱۰ سال قبل از اولین تشخیص خانوادگی شروع شود.
- افراد تحت غربالگری باید امید زندگی کافی (مثلاً حداقل ۱۰ سال) و شرایط فیزیکی مناسب برای بررسی یا درمان ممکن را داشته باشند.

۳. پایش نتایج و مدیریت یافته‌های مشکوک

- هر یافته مشکوک در MRI یا EUS باید با تیم تخصصی مورد بررسی قرار گیرد
- ممکن است بیوپسی، پیگیری فشرده‌تر یا مداخلات درمانی در صورت پیشرفت ضایعه انجام شود
- برخی مطالعات نشان داده‌اند افراد پرخطر تحت پایش، تومورهای کوچک‌تر و مراحل پایین‌تری در زمان تشخیص دارند که به بقا بهتر منجر شده است.

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.