



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری

پوکی استخوان



پوکی استخوان (تحلیل شدید استخوان) میلیون ها زن و مرد آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند منجر به درد، شکستگی و ناتوانی شود. بسیاری از موارد پوکی استخوان قابل پیشگیری هستند و گام های مهمی وجود دارد که می توانید برای کاهش خطر ابتلا به آن بردارید.

اکثر دانشمندان موافقند که این موارد بر خطر پوکی استخوان تأثیر می گذارند. برخی ممکن است برای شما صدق کند، اما برخی دیگر نه. و برخی را می توانید تغییر دهید، اما برخی دیگر را نمی توانید. یک سبک زندگی سالم برای کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان و همچنین سایر بیماری های مهم انتخاب کنید.

و فراموش نکنید که توصیه های غربالگری را دنبال کنید.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می توانی تغییر دهی:

✓ سیگار و الکل مصرف نکنید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم ترین کاری است که می توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر پوکی استخوان، بیماری قلبی، سکته مغزی، بیماری انسدادی مزمن ریه و ۱۵ نوع سرطان را افزایش می دهد.

✓ از نظر جسمی فعال باشید – حداقل ۳۰ دقیقه در روز را هدف قرار دهید.

فعال بودن از نظر جسمی خطر ابتلا به پوکی استخوان - و همچنین سرطان سینه، سرطان روده بزرگ، بیماری قلبی، دیابت و سکته مغزی - را کاهش می دهد. فعالیتهایی را که دوست دارید انتخاب کنید و آنها را در روال روزانه تان بگنجانید. ده دقیقه اینجا و آنجا در طول روز می تواند به سرعت به سی دقیقه ای که نیاز دارید اضافه شود. به جای آسانسور از پله ها استفاده کنید. با یک دوست قدم بزنید.

✓ هر روز سبزیجات برگ سبز بخورید.

خوردن منظم سبزیجات برگ سبز می تواند به کاهش خطر پوکی استخوان کمک کند. سبزیجات برگ دار در کنار سایر مواد مغذی، مقدار مناسبی ویتامین K دارند که می تواند به سلامت و استحکام استخوان ها کمک کند. نمونه هایی از سبزیجات برگ دار سبز شامل اسفناج، کلم بروکلی، کلم، برگ شلغم و کلم کیل است. نکات: از اسفناج استفاده کنید / کلم بروکلی، کلم، برگ شلغم و کلم کیل را به سوپ یا خورش اضافه کنید. در بیشتر روزهای هفته، یک سبزی برگ دار سبز را به عنوان غذای جانبی شام انتخاب کنید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ هر روز کلسیم مصرف کنید.

کلسیم یک ماده معدنی بسیار مهم برای ساخت استخوان‌ها است و همچنین ممکن است به محافظت در برابر پوکی استخوان کمک کند. توصیه می‌شود که اکثر بزرگسالان بسته به سن و جنس، روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم دریافت کنند. می‌توانید این مقدار را از راه‌های مختلفی مانند انتخاب لبنیات، لوبیا، غذاهای غنی‌شده با کلسیم (مانند غلات و آب پرتقال) و/یا مکمل‌های کلسیم دریافت کنید.

✓ هر روز یک مکمل ویتامین D، کلسیم + ویتامین D یا مولتی‌ویتامین مصرف کنید.

دریافت کافی ویتامین D می‌تواند به حفظ استحکام استخوان‌ها و کاهش خطر پوکی استخوان کمک کند. سعی کنید روزانه حدود ۱۰۰۰ واحد بین‌المللی (IU) ویتامین D دریافت کنید. علاوه بر مکمل‌ها، منابع خوب دیگر ویتامین D عبارتند از: تخم‌مرغ

ماهی‌های چرب (مانند ماهی تن و سالمون)
محصولات لبنی غنی‌شده و غلات صبحانه

نور مستقیم خورشید (که به تشکیل ویتامین D در پوست کمک می‌کند). با این حال، تنها چند دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید کافی است. جلوگیری از قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید که می‌تواند منجر به آفتاب‌سوختگی و افزایش احتمال آسیب پوستی و سرطان پوست شود، مهم است.

✓ از مصرف بیش از حد ویتامین A خودداری کنید – روزانه ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ واحد بین‌المللی رتینول مصرف کنید.

ویتامین A مطمئناً برای سلامتی مهم است، اما مصرف بیش از حد آن می‌تواند خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش دهد. مقادیر بالای شکل اصلی ویتامین A، به نام رتینول، ممکن است مانع از تنظیم طبیعی کلسیم بدن شود. با گذشت زمان، این امر ممکن است خطر پوکی استخوان و شکستگی را افزایش دهد.

بسیاری از غذاهای رایج – مانند شیر، شکلات‌های انرژی‌زا و غلات صبحانه محبوب – به دلیل غنی شدن با این ویتامین، سطوح بالایی از رتینول دارند. بهترین راه برای حفظ میزان مصرف رتینول در سطح سالم – و در عین حال داشتن یک رژیم غذایی سالم – کاهش مصرف برخی از غذاهای غنی‌شده و انتخاب‌های سالم‌تر با سایر غذاها است. نکات:

یک مولتی‌ویتامین با دوز ویتامین A 5000 واحد بین‌المللی یا کمتر انتخاب کنید؛ و حداقل ۲۰٪ از بتاکاروتن تشکیل شده باشد.

تعداد شکلات‌های انرژی‌زا مصرفی خود را کاهش دهید.

غلای را انتخاب کنید که با ویتامین A غنی نشده باشند، مانند جو دوسر کوئیکر یا کاشی پف‌دار.


در روزهایی که مولتی‌ویتامین مصرف می‌کنید، بیش از ۱-۲ وعده شیر مصرف نکنید.

ویتامین A به شکل کاروتنوئیدها (مانند بتاکاروتن) در واقع برای استخوان‌های شما بی‌خطر است و انتخاب خوبی برای حفظ میزان مصرف ویتامین A در سطح سالم است. میوه‌ها و سبزیجات، به ویژه میوه‌ها و سبزیجات زرد تیره یا نارنجی (مانند هویج و طالبی) منابع خوبی از کاروتنوئیدها هستند.

عوامل غیر قابل تغییر:

- **سن:** با افزایش سن ریسک بالاتر می‌شود؛ به خصوص سن بالای ۶۵ سال در زنان و بالای ۷۰ سال در مردان خطر ابتلا بسیار زیاد است.
- **جنسیت:** خانم‌ها بیشتر از مردان مبتلا می‌شوند. به دلیل یایسگی و افت هورمون‌های جنسی (استروژن) در این دوره
- **سابقه خانوادگی و ژنتیک:** داشتن والدین مبتلا ریسک یا سابقه شکستگی لگن قبل ۴۰ سال در افراد خانواده ریسک ابتلا را افزایش می‌دهد.
- **پیشینه بیماری روماتوئید آرتریت**
- **سابقه مصرف طولانی مدت داروهای استروئیدی (کورتون‌ها)**
- **دیابت یا قندخون بالا**
- **سابقه دریافت شیمی درمانی**
- **مصرف داروهای ضد تشنج**

پوکی استخوان





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

فراموش نکنید که غربالگری پوکی استخوان را انجام دهید.

نکات غربالگری

غربالگری به تشخیص زودهنگام کمک می کند، زمانی که بیماری قابل درمان تر است.

➤ **زنان ۶۵ ساله:** از ۶۵ سالگی، به طور منظم برای پوکی استخوان غربالگری شوند.

زنانی که در معرض خطر بیشتری برای پوکی استخوان هستند، ممکن است غربالگری را زودتر شروع کنند.

مردان: غربالگری پوکی استخوان به طور معمول توصیه نمی شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال با پزشک مشورت کنید.



علائم پوکی استخوان



درد یا
حساسیت استخوانی



شکستگی هایی با ضربه کم یا
بدون تروما



کوتاه شدن قد
در طول زمان



خم شدگی گردن



Normal Bone



Osteoporosis

هوشمند سلامت



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره دیابت می دانیم،

این موارد هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- سن بالا (بخصوص بالای ۶۵ سال در زنان و بالای ۷۰ سال در مردان)
- جنسیت زن (به دلیل یائسگی و افت هورمون استروژن)
- سابقه خانوادگی شکستگی بعد از ۵۰ سالگی (مادر یا پدر)
- کمبود تراکم استخوان (BMD پایین یا استئوپنی/پوکی استخوان در DEXA)
- روماتوئید آرتریت
- دیابت یا قند خون بالا
- شیمی درمانی (به ویژه مهارکننده های آروماتاز در زنان و درمان هورمونی سرطان پروستات در مردان)
- مصرف طولانی مدت استروئیدها (کورتون ها)
- مصرف داروهای ضد تشنج
- کمبود دریافت لبنیات و کلسیم
- کمبود مصرف سبزیجات برگ سبز
- کمبود ویتامین D یا عدم مصرف مکمل ها
- مصرف زیاد الکل
- سیگار کشیدن
- بی تحرکی یا فعالیت بدنی کم



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا


پویا پردازان عصر هوشمند

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟



• علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

SMART CANCER
Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

توصیه ها

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

- سبک زندگی سالم:

ترک سیگار، کاهش مصرف الکل

فعالیت بدنی: تمرینات وزن‌گذاری و مقاومتی حداقل ۳ بار در هفته

رژیم پرفیبر (سبزیجات، غلات کامل، حبوبات)

- مصرف کلسیم کافی (۱۰۰۰-۱۲۰۰ mg/day) و ویتامین D (800-1000 IU/day)

- غربالگری روتین از سن ۵۶ سال به بالا در خانم‌ها



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. تغذیه و سبک زندگی: همان توصیه‌های low-risk با تاکید بیشتر

۲. دارو درمانی: بیسفوسفونات‌ها. با صلاحدید و مشورت پزشک انجام شود

۳. ارزیابی تراکم استخوان: DEXA هر ۱-۲ سال

۴. پیشگیری از سقوط: فیزیوتراپی، اصلاح محیط خانه، کفش مناسب

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.

علائم پوکی استخوان را بهتر بشناسید

ضربان قلب شما افزایش پیدا کرده است
افزایش ضربان قلب به ۸۰ مورد در هر دقیقه یا بیشتر از آن می‌تواند خطر شکستگی ستون فقرات و لگن را افزایش دهد. دلیل این امر بسیار روشن است؛ ضربان قلب شما نشان‌دهنده سطح تناسب اندام بدن شماست

ناخن‌های شما به راحتی ریش ریش و شکسته می‌شود
افرادی که سطح پائینی از کلاژن (پروتئین تقویتی) را در ناخن‌های خود دارند، مقدار کافی از این پروتئین را در استخوان‌های خود نخواهند داشت. ناخن ضعیف و شکننده بدین معنی است که بدن شما کلسیم کافی برای ساخت استخوان را ندارد

لته‌های شما دچار عقب‌رفتگی شده است
زمانی که فک شما قدرت استخوان‌های خود را از دست می‌دهد، لته‌های موجود در دهان شروع به عقب‌رفتگی می‌کنند یا از دندان جدا می‌شوند. نشانه دیگری که می‌تواند هشداردهنده باشد، از دست دادن دندان است

در گرفتن اشیاء و استفاده از آن مشکل دارید
مطالعات نشان می‌دهد ارتباطی بین قدرت گرفتن اشیاء و چگالی استخوان‌ها وجود دارد. زنانی که چنین مشکلاتی دارند بیشتر از سایر افراد قدرت عضلات و تعادل بدن را از دست می‌دهند

منبع داده‌ها: مجله سلامت
ISNA / Design: Pedram Aghaei