




Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غرابالگری سکتہ

های مغزی



سکتہ مغزی یکی از علل اصلی مرگ و ناتوانی در جهان است. پیشگیری اولیه (برای کسانی که هنوز سکتہ نکرده‌اند) و پیشگیری ثانویه (برای کسانی که دچار سکتہ شده‌اند یا پیش‌سکتہ (TIA) داشته‌اند) اهمیت زیادی دارد.

اکثر دانشمندان موافقند که این موارد بر خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی تأثیر می‌گذارند. برخی ممکن است برای شما صدق کند، اما برخی دیگر نه. و برخی را می‌توانید تغییر دهید، اما برخی دیگر را نمی‌توانید.

یک سبک زندگی سالم برای کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و همچنین سایر بیماری‌های مهم انتخاب کنید.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

✓ وزن سالم را حفظ کنید

چاقی یکی از عوامل مرتبط با فشارخون، دیابت، اختلال چربی و در نتیجه سکتہ است. در صورت داشتن اضافه‌وزن / چاقی، کاهش وزن حتی ۵-۷٪ می‌تواند خطر را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد برای کنترل وزن:

فعالیت بدنی منظم داشته باشید.

رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات و غلات کامل مصرف کنید.

غذا را آهسته و در وعده‌های کوچک‌تر بخورید.

در صورت دشواری، از پزشک یا مشاور تغذیه کمک بگیرید

✓ فعالیت بدنی

هدف: حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته (مثال: ۳۰ دقیقه $\times$ ۵ روز).

فعالیت بدنی کم ریسک سکتہ را افزایش می‌دهد؛ ورزش مرتب کمک به کاهش فشار، چربی، وزن می‌کند.

فعالیت‌هایی را که دوست دارید انتخاب کنید و آن‌ها را در روال روزانه‌تان بگنجانید. ده دقیقه اینجا و آنجا در

طول روز می‌تواند به سرعت به سی دقیقه‌ای که نیاز دارید اضافه شود.

به جای آسانسور از پله‌ها استفاده کنید.

با یک دوست قدم بزنید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ رژیم غذایی سالم:

کاهش کالری اضافی و مصرف غذاهای پر فیبر (سبزی، میوه محدود شده به نوع و مقدار، غلات کامل، حبوبات)، پرهیز از مصرف زیاد نمک، چربی اشباع، غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی‌های شیرین و غذاهای فراوری شده. همه اینها به فشارخون بالا و چربی نامطلوب منجر می‌شوند. رژیم‌هایی مانند DASH و مدیترانه‌ای تأثیرات مفیدی در کاهش ریسک دارند.

✓ سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. ترک سیگار یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیری است.

✓ از کم‌خوابی، استرس مزمن و مصرف الکل سنگین پرهیز کنید:

عوامل روانی و استرس مزمن می‌توانند از طریق تأثیر بر فشارخون، التهاب و سایر مکانیسم‌ها، ریسک سکته را بالا ببرند. همچنین مصرف زیاد الکل به فشارخون بالا، اختلالات کواگولاسیون و خطر سکته مرتبط است.

✓ فشارخون خود را کنترل کنید—از پزشک درباره آن کمک بگیرید.

مهم‌ترین عامل قابل اصلاح. کنترل فشارخون با دارو و سبک زندگی می‌تواند به طرز قابل توجهی سکته را کاهش دهد. هدف فشار معمولاً کمتر از ۸۰/۱۳۰ mmHg توصیه می‌شود.

✓ چربی خون خود را کنترل کنید—از پزشک درباره آن کمک بگیرید.

افزایش LDL و کلسترول تام و نسبت نامطلوب لیپیدها ریسک سکته را بیشتر می‌کند. استفاده از استاتین‌ها برای کاهش کلسترول در افرادی با ریسک قلبی عروقی توصیه می‌شود.

✓ دیابت را کنترل کنید—از پزشک درباره آن کمک بگیرید

دیابت مستقل از سایر عوامل، ریسک سکته را افزایش می‌دهد. کنترل قند خون در افراد دیابتی یکی از اهداف مهم پیشگیری است.

✓ بیماری‌های قلبی و عروقی همزمان خود را کنترل کنید—از پزشک درباره آن کمک بگیرید.

بیماری عروق کرونر، نارسایی قلبی، بیماری عروق محیطی، تنگی کاروتید — این‌ها ریسک سکته را افزایش می‌دهند.

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن:

با افزایش سن، ریسک سکته به طرز قابل ملاحظه‌ای بالاتر می‌رود.

▪ جنسیت:

در بعضی جمعیت‌ها، مردان کمی ریسک بیشتری نسبت به زنان دارند، ولی پس از یائسگی در زنان افزایش می‌یابد.

▪ نژاد / قومیت:

برخی گروه‌های نژادی کمی بیشتر در معرض قرار دارند (مثلاً آمریکایی‌های سیاه در ایالات متحده).

▪ سابقه خانوادگی و ژنتیک:

اگر والد یا خواهر/برادر سابقه سکته داشته باشند، ریسک بالاتر است. نیز جهش‌های ژنتیکی خاص ممکن است ریسک را افزایش دهد.

▪ سابقه سکته یا پیش‌سکته (TIA):

کسی که قبلاً سکته کرده یا TIA داشته، احتمال سکته مجدد بسیار بالاتر است.

علائم سکته مغزی





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره دیابت می دانیم، این موارد هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- فشار خون بالا یا کنترل نشده
- دیابت
- کلسترول بالا یا لیپید نامطلوب
- سیگار کشیدن
- چاقی یا چاقی شکمی
- فیبریلاسیون دهلیزی یا بیماری قلبی
- افراد مسن با سابقه خانوادگی سکت

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

- وزن سالم (حفظ BMI در محدوده طبیعی)
- عدم مصرف سیگار و الکل
- کنترل فشار خون و چربی خون
- خواب کافی و مدیریت استرس
- سن کمتر از حدودی که معمولاً ریسک مطرح می شود (> ۵۵-۶۰ سال)
- بدون سابقه بیماری قلبی یا عروقی



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

هوشمند سلامت

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه ریسک بر اساس عواملی شناخته‌شده است که پژوهش‌های علمی نشان داده‌اند بر احتمال بیماری اثر دارند.

شما پرسشنامه‌ای را پر می‌کنید و پاسخ‌هایتان با فردی «میانگین» در همان سن و جنسیت مقایسه می‌شود.

نتیجه این مقایسه نشان می‌دهد که مجموعه عوامل شما نسبت به فرد معمولی ریسک بالاتری دارد یا پایین‌تر است.

چرا فقط یک تخمین است؟

- پیش‌بینی دقیق ریسک یک فرد خاص بسیار سخت است؛ اما برای گروه‌های بزرگ می‌توان با دقت بیشتری محاسبه کرد.
- علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

توصیه ها

✓ توصیه ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

• سبک زندگی سالم:

ترک سیگار و الکل / رژیم پرفیبر (سبزیجات، غلات کامل، حبوبات) / فعالیت بدنی ≤ 150 دقیقه در هفته / کنترل وزن و پرهیز از چاقی شکمی

• غربالگری دوره‌ای و کنترل فشار خون، دیابت و چربی در محدوده نرمال

• پایش دوره‌ای وضعیت قلبی-عروقی

✓ توصیه ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. کنترل شدید عوامل خطر: همان موارد low-risk با تاکید و پایش بیشتر

۲. داروهای پیشگیری احتمالی (بر اساس شرایط):

- استفاده از داروهای ضدپلاکتی (مثلاً آسپیرین) برای برخی افراد با ریسک قلبی-عروقی بالا (اگر مزایا بر عوارض غالب باشد و فقط با تصمیم پزشک معالج مصرف شود).
- کنترل فیبریلاسیون دهلیزی با آنتی‌کواگولان‌ها در کسانی که در معرض ریسک سکته هستند بر اساس معیارهای CHADSVASc

۳. پیگیری و پایش منظم:

- آزمایش فشار خون، قند، لیپیدها
- بررسی کاروتید اگر تنگی شریان کاروتید بالا شناسایی شده باشد
- کنترل بیماری قلبی همراه

۴. مداخلات ویژه در کسانی با سابقه سکته (ثانویه) یا TIA:

- استفاده از آنتی‌پلاکت‌ها یا داروهای ضدانعقاد بر اساس علت سکته
- در موارد خاص (مثلاً تنگی شدید کاروتید) مداخلات جراحی ممکن است توصیه شود.

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.