




Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری

سرطان رحم



سرطان رحم (که به آن سرطان اندومتر نیز گفته می‌شود) یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان است.

بیشتر دانشمندان توافق دارند که این موارد بر خطر ابتلا به سرطان رحم تأثیر می‌گذارند.

برخی ممکن است برای شما صدق کنند، اما برخی دیگر نه.

و برخی را می‌توانی تغییر دهی، اما برخی دیگر را نمی‌توانی.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

✓ وزن سالم را حفظ کنید

افرادی که وزن سالم خود را حفظ می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان پروستات تهاجمی کمتری دارند.

نگه‌داشتن وزن در حد مناسب همچنین خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان کلیه،

سرطان تخمدان، سرطان رحم، بیماری قلبی، دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهد.

این یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید.

پرس‌های کوچکتر انتخاب کنید و آرام‌تر غذا بخورید.

یک رژیم غذایی غنی از میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل بخورید.

فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می‌برید، مانند پیاده‌روی، دویدن

احساس نکنید که باید کاهش وزن را به تنهایی انجام دهید. کاهش وزن و حفظ وزن سالم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

با یک پزشک یا دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی برای مشاوره صحبت کنید.

و به یاد داشته باشید: تغییرات کوچک می‌توانند با گذشت زمان تفاوت بزرگی ایجاد کنند



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ حداقل ۳۰ دقیقه در روز فعالیت فیزیکی

فعال بودن به طور فیزیکی خطر ابتلا به سرطان رحم - همچنین سرطان سینه، سرطان روده بزرگ، بیماری قلبی و سکتة مغزی را کاهش می‌دهد. این همچنین راهی عالی برای کنترل وزن است. فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می‌برید و آنها را در برنامه روزانه‌تان بگنجانید. ده دقیقه اینجا و آنجا در طول روز می‌تواند به سرعت به ۳۰ دقیقه‌ای که نیاز دارید اضافه شود. به طور کلی، هر چه بیشتر انجام دهید، بهتر است. نکات:

- از پله‌ها به جای آسانسور استفاده کنید.
- در زمان ناهار با یک دوست پیاده‌روی کنید.
- روزنامه محلی خود را برای رویدادهایی که شما را به حرکت وا می‌دارد، بررسی کنید.

✓ قهوه بنوشید - در صورت عدم مشکلات مرتبط با قلبی حدود دو فنجان در روز باشد

نوشیدن منظم قهوه در روز (عادی یا بدون کافئین) می‌تواند خطر ابتلا به سرطان رحم را کاهش دهد. دقیقاً مشخص نیست که چرا اینطور است، اما قهوه ممکن است سطح استروژن و انسولین در بدن را کاهش دهد، که هر کدام می‌توانند به جلوگیری از تبدیل سلول‌ها به سرطان کمک کنند. قهوه سیاه سالم‌ترین است. خامه و شکر را محدود کنید و از نوشیدنی‌های قهوه مبتنی بر شیر و مخلوط‌شده دوری کنید، زیرا این نوشیدنی‌ها می‌توانند حاوی مقدار زیادی شکر، کالری و چربی ناسالم باشند.

✓ از درمان هورمونی یا انسگی پرهیز کنید - با پزشک درباره خطرات و فواید صحبت کنید

در حالی که درمان هورمونی یا انسگی می‌تواند علائم متوسط تا شدید یا انسگی را درمان کند، همچنین می‌تواند خطر ابتلا به سرطان رحم را افزایش دهد.

اگر زنان تصمیم بگیرند از درمان هورمونی برای کاهش علائم یا انسگی (مانند تعریق شبانه، گرگرفتگی و خشکی واژن) استفاده کنند، باید برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باشد - نه بیشتر از ۱ تا ۳ سال. و نباید به‌طور طولانی‌مدت با هدف کاهش خطر بیماری‌هایی مانند بیماری قلبی یا از دست دادن استخوان (پوکی استخوان) مصرف شوند. با یک پزشک درباره خطرات و مزایای درمان هورمونی یا انسگی صحبت کنید.

چه افرادی بیشتر در معرض خطر سرطان رحم قرار دارند؟

- دیابت
- اضافه وزن
- فشار خون بالا
- ژنتیک و سابقه بیماری در خانواده
- مصرف برخی داروهای خاص از جمله داروی تاموکسیفن که برای درمان سرطان سینه است





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن

خطر ابتلا به سرطان رحم با افزایش سن افزایش می‌یابد. بیشتر موارد در زنان بالای ۶۲ سال تشخیص داده می‌شوند.

▪ تعداد زایمان‌ها

زنان که هرگز زایمان نکرده‌اند، خطر بالاتری برای ابتلا به سرطان رحم دارند. یکی از دلایل این است که بارداری سطح هورمون‌ها را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که به محافظت از سلول‌های رحم در برابر سرطانی شدن کمک می‌کند.

▪ سن یائسگی

زنانی که در سنین بالاتر به یائسگی (زمانی که قاعدگی‌های منظم متوقف می‌شود) می‌رسند، خطر ابتلا به سرطان رحم در آن‌ها بیشتر است. این به این دلیل است که یائسگی دیر هنگام بدن زن را در طول زندگی‌اش به مقادیر بیشتری از هورمون استروژن معرض می‌کند. این سطوح بالاتر استروژن خطر تبدیل شدن سلول‌های رحم به سلول‌های سرطانی را افزایش می‌دهد.

▪ تاموکسیفن

تاموکسیفن دارویی است که برای زنانی که در معرض خطر بالای سرطان سینه هستند تجویز می‌شود. این دارو اثرات هورمون استروژن را در بافت پستان مسدود کرده و می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان کمک کند. با این حال، این دارو همچنین عوارض جانبی جدی دارد، مانند افزایش خطر ابتلا به سرطان رحم. تاموکسیفن برای همه مناسب نیست و فقط می‌تواند توسط پزشک تجویز شود.

▪ دیابت

زنانی که دیابت دارند ممکن است کمی بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان رحم باشند. دانشمندان مطمئن نیستند چرا. یکی از دلایل ممکن است این باشد که دیابت سطح استروژن را در بدن زن افزایش می‌دهد. استروژن یک هورمون تولید مثل زنانه است که عمدتاً در طول چرخه قاعدگی ترشح می‌شود. سطوح بالای استروژن ممکن است باعث شود سلول‌های رحم (رحم) سرطانی شوند.

افرادی که دیابت دارند همچنین در معرض خطر بالاتری برای سرطان پانکراس، بیماری قلبی و سکته مغزی هستند.

▪ سابقه خانوادگی

زنانی که مادر یا خواهری با سرطان رحم دارند، در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به این بیماری هستند. این به این دلیل است که برخی از سرطان‌های رحم به جهش‌های ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن مرتبط هستند که می‌توانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه درباره سرطان رحم می دانیم، این ها عواملی هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند. شما می توانید برخی از آن ها را تغییر دهید، اما نه همه آن ها را.

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- شما دیابت یا قند خون بالا دارید.
- شما هیچ کودکی به دنیا نیاورده اید.
- شما سابقه خانوادگی سرطان رحم دارید.
- شما تاموکسیفن مصرف کرده اید.

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

- شما اضافه وزن ندارید.
- شما حداقل ۳۰ دقیقه در روز فعال هستید.
- شما به مدت ۵ سال یا بیشتر از قرص های ضدبارداری استفاده کرده اید.
- شما روزانه ۲ یا بیشتر فنجان قهوه می نوشید (کافئین دار یا بدون کافئین).

علائم سرطان رحم



ترشحات واژن

خونریزی واژن



درد هنگام ادرار

قاعدگی نامنظم



درد واژن

درد لگن



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه می‌شود؟	
ریسک بالا (High Risk)	ریسک متوسط / کم (Average / Low Risk)
داشتن سندرم ارثی Lynch (HNPCC) یا جهش‌های مرتبط.	افرادی که فاقد ژن پرخطر از قبل شناخته شده (مثلاً Lynch)، بدون سابقه خانوادگی قوی، بدون ضایعات پیش‌سرطانی یا بیماری‌های مرتبط (مثل آتروفی متاپلازی گسترده) هستند.
سابقه خانوادگی قوی سرطان آندومتر یا کولورکتال در بستگان درجه اول، یا جهش ژنی شناخته شده (مثلاً MSH2, MLH1, MSH6, PMS2).	نتیجه این یا پایین‌تر است
سابقه آتیپیکال اندومتریال هایپرپلازی / EIN (Endometrial Intraepithelial Neoplasia) یا AEH.	چرا فقط یک
قرارگیری طولانی‌مدت در معرض استروژن بدون پروژسترون (مثلاً آتروفی چاقی محور یا درمان تاموکسیفن در برخی زنان).	می‌توان با دقت بیشتری محاسبه کرد.
	• علم همواره در حال پیشرفت است و شوندد یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها


Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌های عمومی برای همه (ریسک متوسط / کم)

- **آگاهی و مراجعه سریع برای علائم:** خونریزی واژینال غیرطبیعی (به‌ویژه بعد از یائسگی) را سریعاً گزارش کنید. اکثراً این علامت‌ها در مراحل قابل درمان رخ می‌دهد.
- **کاهش وزن و کنترل متابولیک:** کنترل وزن، مدیریت دیابت و فعالیت فیزیکی منظم مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه هستند (چاقی علت بزرگی از موارد آندومتر است).
- **داروها و هورمون‌ها:** مصرف طولانی‌مدت تاموکسیفن در زنانی که به‌منظور درمان سرطان پستان مصرف می‌کنند، با ریسک بالاتر آندومتر مرتبط است. در این موارد با پزشک درباره مزایا/مضرات صحبت کنید.

هیچ غربالگری روتینی برای افراد بدون علامت و بدون ریسک بالا توصیه نمی‌شود. (پاپ اسمیر یا سونوگرافی روتین برای غربالگری عمومی اثبات‌شده نیست)؛ آگاهی از علائم و پیگیری سریع مهم‌تر

است



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

برای افراد پرخطر، برخی گایدلاین‌ها توصیه به انجام پایش / غربالگری هدفمند کرده‌اند. این اقدامات مشروط، با مزایا و معایب، باید با آگاهی کامل و در مراکز دارای تجربه انجام شوند.

۱. مشاوره ژنتیک و بررسی ژنتیکی

هر فردی با سابقه خانوادگی قوی سرطان رحم/کولون یا با تشخیص فردی زیر ۵۰ سال/چند عضو مبتلا، باید به مشاور ژنتیک ارجاع شود تا بررسی جهش‌های مرتبط (MSH2, MLH1, MSH6, PMS2, EPCAM) و گاهی سایر ژن‌ها) انجام شود. تشخیص Lynch مسیر مراقبتی را کاملاً تغییر می‌دهد.

۲. شروع زودتر و روش‌های پایش (surveillance)

- افراد با Lynch: اکثر دستورالعمل‌ها پیشنهاد می‌کنند که بحث غربالگری/پایش آندومتر (معمولاً بیوپسی آندومتر سالانه و/یا بررسی با TVUS به‌عنوان تکمیل‌کننده) از سن حدود ۳۰-۳۵ سال یا ۱۰ سال زودتر از جوان‌ترین مورد خانوادگی مبتلا شروع شود. (جزئیات ممکن است بین منابع متفاوت باشد)
- زنانی با سابقه EIN/AEH یا ضایعات پیش‌سرطانی: پیگیری پس از درمان باید منظم و نزدیک (مثلاً هر ۳-۶ ماه اولیه، سپس بر حسب پاسخ) انجام شود.

۳. نحوه و محل انجام پایش

پایش و غربالگری هدفمند باید در مراکز تجربه‌دار انجام شود تا نمونه‌برداری و تفسیر پاتولوژی استاندارد، و تصمیم‌گیری‌های درمانی سریع و مناسب انجام شود. مشارکت در برنامه‌های ثبت یا مطالعات بالینی توصیه می‌شود.

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.