**dance**

Một lớp học nhảy có $n$ học viên, học viên thứ $i$ có chiều cao là $h_i$ $(i = 1,2, \dots, n)$. Trong một buổi học, sau khi hướng dẫn cho tất cả các học viên, thầy giáo muốn chọn ra $k$ đôi nhảy, mỗi đôi gồm hai học viên để trình diễn và rút kinh nghiệm. Với một đôi nhảy, chênh lệch chiều cao giữa hai học viên càng nhỏ càng tốt, do đó, thầy giáo muốn lựa chọn ra $k$ đôi nhảy mà tổng bình phương các chênh lệch chiều cao giữa hai học viên trong cùng một đôi của cả $k$ đôi là nhỏ nhất.

**Yêu cầu:** Cho $n$ số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ là chiều cao của $n$ học viên và số nguyên dương $k$, hãy chọn ra $k$ đôi nhảy mà tổng bình phương các chênh lệch chiều cao giữa hai học viên trong cùng một đôi của cả $k$ đôi là nhỏ nhất.

**Dữ liệu:**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương $n, k$ $(k \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, trong đó $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá $\frac{n}{2})$;
- Tiếp theo là một dòng chứa $n$ số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ $(h_i \leq 10^6)$.

**Kết quả:**

- Ghi ra một số là số tổng bình phương các chênh lệch chiều cao giữa hai học viên trong cùng một đôi của cả $k$ đôi là nhỏ nhất.

**Subtask 1:** $n \leq 2e3$;

**Subtask 2:** $n \leq 2e5$

| Input | Output |
|---|---|
| 5 2<br>2 5 3 3 6 | 1 |