klrseq

Cho một dãy gồm N số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_N)$ và ba số nguyên K, L, R ($1 \le L \le R \le N$).

Yêu cầu: Hãy chọn ra **đúng K đoạn con liên tiếp** rời nhau:

$$[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_K, r_K] \quad (1 \le l_1 \le r_1 < l_2 \le r_2 < \dots < l_K \le r_K \le N)$$

sao cho:

1. Độ dài mỗi đoạn con đều nằm trong khoảng $[L, R]$ (tức $L \le r_i - l_i + 1 \le R$ với mọi $1 \le i \le K$).
2. Tổng giá trị các phần tử trong cả K đoạn con là **lớn nhất**.

Input

- Dòng đầu tiên chứa 4 số nguyên dương N, K, L, R cách nhau bởi dấu cách, lần lượt là số lượng phần tử của dãy số, số lượng đoạn con liên tiếp cần chọn, độ dài tối thiểu và độ dài tối đa của mỗi đoạn con.
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ cách nhau bởi dấu cách, là các phần tử của dãy số. *Dữ liệu luôn đảm bảo $K \times L \le N$ để chắc chắn luôn tồn tại ít nhất một cách chọn hợp lệ.*

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là tổng giá trị lớn nhất của đúng K đoạn con liên tiếp rời nhau đã chọn.

Giới hạn: $N \le 3e5; K \le N; -10^9 \le a_i \le 10^9$.

Subtask 1 (30%): $N, K \le 300$.

Subtask 2 (20%): $N, K \le 3000$.

Subtask 3 (30%): $N, K \le 1e5$.

Subtask 4 (20%): Không có ràng buộc nào thêm.

Input	Output
7 2 2 3 2 -4 5 3 -1 4 2	14