

វិញ្ញាសា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ

មេរៀន៖ សម្រាប់ឆ្នាំទី២

ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់ពី A ដល់ E ។

សំណួរ ១. តើលក្ខណៈណាមួយខាងក្រោមដែលកំណត់ ថាអនុគមន៍ $T : V \rightarrow W$ ជា បម្លែងលីនេអ៊ែរ ចំពោះគ្រប់ វ៉ិចទ័រ $u, v \in V$ និងស្កាលែរ c ?

- A. $T(u + v) = T(u) + T(v)$ និង $T(cu) = cT(u)$
B. $T(u + v) = T(u) - T(v)$ និង $T(cu) = T(u)$
C. $T(u + v) = T(u) \cdot T(v)$ និង $T(cu) = c + T(u)$
D. $T(u + v) = T(u)$ និង $T(cu) = cT(u)$
E. $T(u \cdot v) = T(u) \cdot T(v)$

សំណួរ ២. តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរកំណត់ ដោយ $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ ។ តើម៉ាទ្រីសនៃ T ស្មើ មួយណា?


- A. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

សំណួរ ៣. តាង $T(x, y, z) = (x + y, y - z)$ ជាបម្លែង លីនេអ៊ែរពី $\mathbb{R}^3$ ទៅ $\mathbb{R}^2$ ។ តើវិមាត្រនៃ សូល (Nullity) របស់ T ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 3
E. 4

សំណួរ ៤. តាមទ្រឹស្តីបទ Rank-Nullity បើ $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ មាន Nullity ស្មើនឹង ២ តើរ៉ង់ (Rank) នៃ T ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
E. 5



រូប ១.

សំណួរ ៥. ក្នុង រូប ១. ខាងលើ តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជា ចំណាំងផ្ទាត់ (Reflection) ធៀបនឹងអ័ក្ស x ។ តើម៉ាទ្រីស របស់វាគឺអ្វី?

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

សំណួរ ៦. តើម៉ាទ្រីសមួយណាជាបម្លែងលីនេអ៊ែរនៃរង្វិល (Rotation) មុំ $\theta = 90^\circ$ តាមទិសដៅជ្រុងទ្រនិចនាឡិកា ជុំវិញគល់អ័ក្សកូអរដោនេ?

- A. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

សំណួរ ៧. តាង T_1 និង T_2 ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរលើ $\mathbb{R}^2$ ដែល មាន ម៉ាទ្រីស រៀងគ្នា A និង B ។ តើមួយណា ជា ម៉ាទ្រីសបណ្តាក់នៃបម្លែង $T_2 \circ T_1$?

- A. $A + B$ B. AB
C. BA D. $B^{-1}A$
E. $A^{-1}B$

សំណួរ ៨. បម្លែងលីនេអ៊ែរ $T : V \rightarrow W$ ជា អនុគមន៍ ប្រកាន់ (Injective / One-to-one) លុះត្រាតែ៖

- A. $\text{Im}(T) = W$
B. $\dim(V) = \dim(W)$
C. $\ker(T) = V$
D. $\ker(T) = \{0\}$
E. $T(0) = 1$

សំណួរ ៩. បម្លែងលីនេអ៊ែរ $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ជា អនុគមន៍ ពេញ (Surjective / Onto) លុះត្រាតែជួរឈរ (Columns) នៃម៉ាទ្រីស A របស់វា៖

- A. ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា

- B. មិនអាស្រ័យលើនេវ៉ែរ
- C. បង្កើតបានជាគោលនៃ $\mathbb{R}^n$
- D. ផ្គុំបានលំហ $\mathbb{R}^n$ (Span $\mathbb{R}^n$)
- E. ផ្គុំបានលំហ $\mathbb{R}^m$ (Span $\mathbb{R}^m$)

សំណួរ ១០. បើ $T(v) = \lambda v$ គ្រប់វ៉ិចទ័រមិនសូន្យ v នោះ v ជា៖

- A. តម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalue)
- B. វ៉ិចទ័រផ្ទាល់ (Eigenvector)
- C. វ៉ិចទ័រគោល (Basis vector)
- D. ស្នូល (Kernel)
- E. វ៉ិចទ័រសូន្យ

សំណួរ ១១. តាង $T : V \rightarrow V$ ជាប្លែងលីនេអ៊ែរ។ បើ $[T]_B$ ជាម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល B , ហើយ P ជាម៉ាទ្រីសប្តូរគោល (Transition matrix) ពីគោល C ទៅគោល B ។ តើម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល C កំណត់បានតាមរូបមន្តមួយណា?


- A. $P^{-1}[T]_B P$
- B. $P[T]_B P^{-1}$
- C. $P^T[T]_B P$
- D. $P[T]_B P^T$
- E. $P^{-1}[T]_B P^{-1}$

សំណួរ ១២. យក $V = \mathbb{R}^3$ ។ តាង $T : V \rightarrow V$ ជាការប្លែងលីនេអ៊ែរមួយ កំណត់បានម៉ាទ្រីស

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $T^3 = 0$ ប៉ុន្តែ $T^2 \neq 0$ (Nilpotent)។ តើសំណើមួយណាខាងក្រោម ដែលពិតប្រាកដ?

- A. T អាចសរសេរជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន
- B. T មានច្រមាស់ (Invertible)
- C. តម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់របស់ T គឺ ០
- D. $\dim(V) \leq 2$
- E. T មានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើ 1



សំណួរ ១៣. តាង $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាប្លែងប្តូរទ្រង់ទ្រាយ (Shear Transformation) ស្របនឹងអ័ក្ស x មានមេគុណ $k = 2$ កំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$T(x, y) = (x + 2y, y)$$

ដែលប្លែងការេឯកតា (ពណ៌ខៀវ) ទៅជាប្រលេឡូក្រាម (ពណ៌ក្រហម) ដូចរូប។ តើក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមនោះស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

សំណួរ ១៤. តាង $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ជាចំណោលអរតូកូណាល់ (Orthogonal projection) ទៅលើប្លង់ $W : x + y = 0$ កាត់តាមគល់តម្រុយ។ បើ A ជាម៉ាទ្រីសរបស់ T គឺ៖

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

តើមួយណា ជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាទ្រីសចំណោល A ?

- A. $A^2 = I$ និង $A^T = A$
- B. $A^2 = 0$ ជានិច្ច
- C. $A^T = -A$
- D. $A^T A = I$
- E. $A^2 = A$ និង $A^T = A$

សំណួរ ១៥. តាង P_2 ជាលំហវ៉ិចទ័រនៃពហុធាមានដឺក្រេ ≤ 2 ។ ប្លែង $T : P_2 \rightarrow P_2$ កំណត់ដោយ $T(p(x)) = p(x) + xp'(x)$ ។ គេកំណត់ដាន (Trace) របស់ម៉ាទ្រីស $A(n \times n)$ ដោយ៖

$$\text{Trace}(T) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

តើដាន (Trace) របស់ម៉ាទ្រីសរបស់ T ខាងលើធៀបនឹងគោល $\{1, x, x^2\}$ ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 6
- E. 7

$$L \times U = A$$

សំណួរ ១៦. ដូចរូបតំណាងខាងលើ តើការបំបែកម៉ាទ្រីស $A = LU$ តំណាងឱ្យអ្វី?

- A. L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ លើ, U ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណក្រោម
- B. L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ ក្រោម, U ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណលើ
- C. L ជាម៉ាទ្រីសស៊ីមេទ្រី, U ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- D. L ជាម៉ាទ្រីសឯកតា, U ជាម៉ាទ្រីសអវក្ខណៈ
- E. L និង U សុទ្ធតែជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណក្រោម

សំណួរ ១៧. យកម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ ។ បើ $A = LU$ តើមួយណាជាម៉ាទ្រីស U ?

- | | |
|---|---|
| A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ | B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ |
| C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ | D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ |
| E. $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ | |

សំណួរ ១៨. បើ A ជាម៉ាទ្រីសលំដាប់ 3×2 ហើយគេធ្វើការបំបែក $A = LU$ (ដែល L ជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណក្រោម) តើ L និង U ត្រូវមានលំដាប់ប៉ុន្មាន?

- A. L លំដាប់ 3×3 និង U លំដាប់ 3×2
- B. L លំដាប់ 2×2 និង U លំដាប់ 3×2
- C. L លំដាប់ 3×2 និង U លំដាប់ 2×2
- D. L លំដាប់ 3×3 និង U លំដាប់ 2×3
- E. L លំដាប់ 2×3 និង U លំដាប់ 3×3

សំណួរ ១៩. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ ។ ក្នុងការបំបែក $A = LU$ ដែល៖

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l_{21} & 1 \end{pmatrix} \text{ និង } U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \end{pmatrix}$$

តើតម្លៃ m_{21} និង u_{22} ស្មើប៉ុន្មាន?

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| A. $m_{21} = 2, u_{22} = 5$ | B. $m_{21} = 2, u_{22} = 1$ |
| C. $m_{21} = 1, u_{22} = 2$ | D. $m_{21} = -2, u_{22} = 1$ |
| E. $m_{21} = 0, u_{22} = 5$ | |

សំណួរ ២០. តើលក្ខខណ្ឌអ្វីដែល ម៉ាទ្រីស ការេ A អាចបំបែកជា LU បានដោយមិនចាំបាច់ប្តូរជួរដេក (No row exchanges)?

- A. ដេទែមីណង់នៃ A ស្មើសូន្យ
- B. A ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- C. គ្រប់មីនរមេ (Leading principal minors) មិនសូន្យ
- D. គ្រប់ធាតុរបស់ A ជាចំនួនគតិមាន
- E. ធាតុអង្កត់ទ្រូងទាំងអស់ស្មើសូន្យ

សំណួរ ២១. ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរ $Ax = b$ ដោយប្រើការបំបែក $A = LU$ តើគេត្រូវដោះស្រាយតាមជំហានណាខ្លះ?

- A. រក y ពី $Uy = b$, រួចរក x ពី $Lx = y$
- B. រក x ពី $Ux = b$ ដោយផ្ទាល់
- C. រក y ពី $Ly = b$, រួចរក x ពី $Ux = y$
- D. រក y ពី $Ly = x$, រួចរក x ពី $Ux = y$
- E. រក x ពី $(L + U)x = b$

សំណួរ ២២. បើ ម៉ាទ្រីស A ទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជួរដេក (Row exchanges) កំឡុងពេលធ្វើ Gaussian elimination តើការបំបែក LU ទូទៅមួយណាត្រូវបានប្រើប្រាស់?

- A. ការបំបែក $A = LDU$
- B. ការបំបែក $PA = LU$ ដែល P ជាម៉ាទ្រីសមានចម្រាស់
- C. ការបំបែក $A = L^T U$
- D. ការបំបែក Cholesky $A = LL^T$
- E. មិនអាចបំបែកបានទេក្នុងគ្រប់ករណី

សំណួរ ២៣. តាង A ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ $n \times n$ ដែល $A = LU$ ដោយ L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ ក្រោម មានអង្កត់ទ្រូងជាលេខ 1 ។ តើដេទែមីណង់នៃ A អាចគណនាយ៉ាងដូចម្តេច?

- A. ផលបូកធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ U
- B. ផលគុណធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ U
- C. ផលគុណធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ L

សំណួរ ៣២. តើ លក្ខខណ្ឌ មួយ ណា ដែល ចាំបាច់ និង គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី ឱ្យ ម៉ាទ្រីស ការេ A អាច ធ្វើជា ម៉ាទ្រីស អង្កត់ទ្រូងបាន ផ្អែកលើភាពស្មុន់របស់វា?

- A. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្មុន់ពីជគណិត (Algebraic mult.) ធំជាងភាពស្មុន់ធរណីមាត្រ (Geometric mult.)
- B. ម៉ាទ្រីស A មិនមានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើសូន្យទេ
- C. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្មុន់ពីជគណិត ស្មើនឹងភាពស្មុន់ធរណីមាត្រ
- D. ផលបូកតម្លៃផ្ទាល់ទាំងអស់របស់វាស្មើសូន្យ
- E. វ៉ិចទ័រផ្ទាល់ ទាំងអស់ របស់ វា ជា វ៉ិចទ័រ អរតូកូណាល់

សំណួរ ៣៣. គេ ឱ្យ ម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 5×5 មួយដែល មានតម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់គឺ $\lambda = 4$ ។ ពហុគុណពីជគណិត (Algebraic multiplicity) របស់វាស្មើ ៥ ។ បើគេដឹងថា លំហវ៉ិចទ័រផ្ទាល់ (Eigenspace) របស់វាមានវិមាត្រស្មើ ២ (i.e., វាមានប្លក់ Jordan ចំនួន ២) ហើយមានប្លក់ Jordan ធំបំផុតទំហំ 3×3 ។ តើម៉ាទ្រីសទម្រង់ Jordan Canonical Form របស់ A គឺជាអ្វី?

- A. $J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$
- B. $J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$
- C. $J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

- D. $J = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$
- E. $J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

សំណួរ ៣៤. តាង A ជា ម៉ាទ្រីស លំដាប់ 5×5 ដែល ជា ម៉ាទ្រីសនិលប៉ូតង់ (Nilpotent) ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ $A^2 = 0$ តែ $A \neq 0$ (ប្លក់ ទំហំ ធំ បំផុត គឺ 2×2) ។ ប្រសិនបើ រង់ (Rank) របស់ម៉ាទ្រីស A ស្មើនឹង ២ មានន័យថា Nullity ស្មើ ៣ (មានប្លក់ Jordan ចំនួន ៣) ។ តើ ម៉ាទ្រីស ទម្រង់ Jordan របស់ A មានទម្រង់យ៉ាងដូចម្តេច?

- A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- E. ម៉ាទ្រីសសូន្យទំហំ 5×5

សន្លឹកចម្លើយ (Answer Sheet)

មុខវិជ្ជា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ (ឆមាសទី២)

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ ល.រ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមគូសរង្វង់ ឬផាត់ពណ៌ឱ្យពេញលើជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់។

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

ពិន្ទុសរុប៖ _____ / 32