

A
SPI-1 type III secretion
orgA
invI
STM4315
invJ*
spaO
sipC
invG
sopB
prgI*
prgH*
sipD
invE
hilA
fliK
flgI
flgG
fliL
flgC
flgN
invA
sicA
STM4261
sipB
sipA
flgE
flgL
flgM
flgD
fliC
sopE2
STM3216
hilD
cheW
trg
cheA
fliD*
fliA*
fliZ
ttrC
tsr
cheM
fliT
fliB
STM3138
Flagella and chemotaxis
B
Smaller components (n = 14)
fhuA
cysP
cysH
sbp
fepC
fepA
metH
cysK
cysC
entE
fhuE
cysI
cirA
aidB
fadB
fabB
accA
yafH
yeaD
dmsA
sdhC
pgm
STM4308
sdhB
rbsK-3
sucB
STM3792
STM1498
STM0360
STM3362
aldB
cydB
yjfN
yjgB
argG
glpA
hisI
carB
glpB
serB
mopB
yejE
htpG
yejF
up in LFS
down in LFS
top-10 hub
edge, also supported without text-mining
edge, depends on text-mining
Node size = degree; edge width = STRING combined score (0.7-1.0); * = stays a top-10 hub when text-mining evidence is removed.
47 genes without a partner are not shown. Associations indicate functional linkage, not proof of physical binding.