

Exhibit 618-13 Kw Value Associated with Various Fragment Contents.

Fragment vol. %	Mulch factor 1/	<u>Kf value classes of less than 2 mm soil fraction</u>										
		.10	.15	.20	.24	.28	.32	.37	.43	.49	.55	.64
5	.90	.09	.14	.18	.22	.25	.29	.33	.39	.44	.50	.58
10	.77	.08	.12	.15	.18	.22	.25	.28	.33	.38	.42	.49
15	.68	.07	.10	.14	.16	.19	.22	.25	.29	.33	.37	.43
20	.61	.06	.09	.12	.15	.17	.20	.23	.26	.30	.37	.39
25	.54	.05	.08	.11	.13	.15	.17	.20	.23	.26	.30	.35
30	.48	.05	.07	.10	.12	.13	.15	.18	.21	.24	.26	.31
35	.43	.04	.06	.09	.10	.12	.14	.16	.18	.21	.24	.28
40	.38	.04	.06	.08	.09	.11	.12	.14	.16	.19	.21	.24
45	.34	.03	.05	.07	.08	.10	.11	.13	.15	.17	.19	.22
50	.30	.03	.05	.06	.07	.08	.10	.11	.13	.15	.17	.19
55	.26	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.11	.13	.12	.14
60	.22	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.11	.12	.14
65	.19	.02	.03	.04	.05	.05	.06	.07	.08	.09	.10	.12
70	.16	.02	.02	.03	.04	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10
75	.13	.01	.02	.03	.04	.04	.04	.04	.06	.06	.07	.08
80	.10	.01	.02	.02	.02	.03	.03	.04	.04	.05	.06	.06
85	.08	.01	.02	.02	.02	.02	.03	.03	.03	.04	.04	.05
90	.06	.01	.01	.01	.01	.02	.02	.02	.03	.03	.03	.04
95	.04	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.02	.02	.02	.02	.03
100	.03	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.02	.02	.02

1/ Mulch factor is the ratio of the soil loss from soils with the specified fragment volumes to that from soils with no fragments. The table was constructed from the zero canopy curve, figure 6, page 19 in AH 537 (USDA-SEA 1978).