

CONTRÔLE CONTINU N° 1

Enseignant-Formateur : H. El-Otmany

A.U. : 2019-2020

Exercice n°1 Les données ci-dessous représentent les durées (exprimées en minutes) de 400 consultations d'un site web :

Durée de consultation]0; 8]]8; 16]]16; 24]]24; t]]t; 44]]44; 60]]60; 84]
Effectif	24	a	b	68	56	44	12

Certaines données sont illisibles et ont été remplacées par t , a et b .

- Déterminer a et b en sachant que le quatrième décile est égal à 19 minutes.
- Déterminer t sachant que la durée moyenne de consultation est égale à 26 minutes.
- Tracer l'histogramme de la distribution.
- Tracer la fonction des fréquences cumulées. Situer sur ce graphique la médiane et la calculer. Calculer les autres quartiles.
- Représenter les différentes caractéristiques numériques à l'aide d'une boîte à moustaches (box-plot).

Exercice n°2 On a mesuré la teneur minérale des vertèbres lombaires de quarante femmes. Les mesures (en g/dm²) sont données dans la liste ci-dessous : (on notera x cette série statistique)

60	61	63	64	66	67	69	70
71	71	72	74	75	75	76	76
77	77	78	79	79	80	81	81
81	82	82	83	84	84	85	86
87	88	88	89	92	94	95	97

- Préciser la population et la variable étudiées. Quel est le type de cette variable ?
- On décide de regrouper les données de manière discrète.
 - Combien observe-t-on de modalités ?
 - Représenter les données regroupées par un graphique adapté.
 - Calculer la moyenne (on précisera la formule qui aura été utilisée).
 - Calculer la variance (on précisera la formule qui aura été utilisée), puis l'écart-type.
 - Calculer la médiane (on précisera la formule qui aura été utilisée).
- Vu le nombre de modalités, on décide de regrouper les données selon les classes suivantes : $[60; 69[$, $[69; 76[$, $[76; 80[$, $[80; 84[$, $[84; 91[$ et $[91; 98[$.
 - Donner la série des données regroupées.
 - Représenter les données regroupées par un graphique adapté.
 - Déterminer la classe modale.
 - Calculer la moyenne (on précisera la formule qui aura été utilisée).
 - Calculer la variance (on précisera la formule qui aura été utilisée) puis l'écart-type.

- (f) Calculer la médiane (on précisera la formule qui aura été utilisée).
 - (g) Commenter les différences constatées entre les différentes caractéristiques étudiées ci-dessus.
4. On observe dix individus supplémentaires : (on notera y cette série statistique)

61 71 71 77 78 79 80 81 86 89

Sur cet échantillon, on obtient une moyenne égale à 77,3 et une médiane égale à 78,5.

- (a) Peut-on calculer rapidement la moyenne sur les cinquante individus en utilisant les réponses de la question 2 ? Si oui, calculer cette nouvelle moyenne.
- (b) Peut-on calculer rapidement la médiane sur les cinquante individus en utilisant les réponses de la question 2 ? Si oui, calculer cette nouvelle médiane.