

Exercice n°1

1) Déterminer les domaines de définition respectifs des fonctions suivantes, puis déterminer les dérivées partielles des fonctions suivantes

$$\begin{array}{ll} 1. f(x, y) = \frac{xy}{x+y} & 2. g(x, y) = \frac{x^3y+y^2x^2}{x+y} \\ 3. h(x, y) = \frac{xye^x}{x^2+y^2-4} & 4. k(x, y) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{x^2+y^2-25}} \\ 5. l(x, y) = \frac{2x}{y} + \frac{y}{2x} & 6. u(x, y) = \frac{(x+y)^2}{xy-4} \\ 7. l(x, y) = \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2}\right) & 8. u(x, y) = \arctan\left(\frac{x-y}{1+xy}\right) \\ 9. l(x, y) = \sqrt{1+x^2+y^2} & 10. u(x, y) = \ln(1+x^2+y^2) \end{array}$$

Exercice n°2 Pour les fonctions de deux variables suivantes, calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial g}{\partial y}$

$$f(x, y) = \tan(xy) + y, \quad f(x, y) = \frac{x+y}{3+x^2y^2}, \quad f(x, y) = \exp(2x-y) \ln\left(\frac{x}{y}\right).$$

Exercice n°3 Étudier la continuité de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, l'existence et la continuité des dérivées partielles premières de $f = f(x, y)$.

$$f = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad f = \begin{cases} y^2 \sin \frac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

$$f = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad f = \begin{cases} (x^2 + y^2)^x & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice n°4 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Étudier la continuité et la différentiabilité de f en $(0, 0)$.
2. f est-elle de classe C^1 dans \mathbb{R}^2 .

Exercice n°5 Soit f la fonction numérique définie sur \mathbb{R}^2 par

$$f(x, y) = \frac{x^3y^3}{x^2+y^2} \quad \text{pour } (x, y) \neq 0 \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

Montrer que f est de classe C^1 . f admet-elle des dérivées partielles d'ordre 2 à l'origine ?

Exercice n°6 On considère la fonction f définie de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.
2. Montrer que f est de classe C^∞ sur \mathbb{R}^2 .
3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$. En déduire que f n'est pas de classe C^∞ sur \mathbb{R}^2 .

Exercice n°7 Soit f définie de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Donner l'expression de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Calculer les dérivées partielles secondes croisées en 0 et montrer que :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0).$$

3. f est-elle C^2 .

Exercice n°8 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe de C^1 et $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x, y, z) = f(x - y, y - z, z - x).$$

Montrer que

$$\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial z} = 0.$$

Exercice n°9 Comment faut-il choisir le nombre réel α pour que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ \alpha & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

soit continue au point $(0,0)$? Soit différentiable au point $(0,0)$?

Exercice n°10 Étudier la continuité de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, l'existence et la continuité des dérivées partielles premières de $f = f(x, y)$.

$$f = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad f = \begin{cases} y^2 \sin \frac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

$$f = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad f = \begin{cases} (x^2 + y^2)^x & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice n°11 Étudier la différentiabilité des applications suivantes et calculer leur différentielle ainsi que leur dérivées partielles. $Z = x^3 + y^2 + 5xy$ et $(U, V, W) = \left(e^x \sin y, \sqrt{e^{x+y} - x^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$.

Exercice n°12 Montrer que sur un ouvert que l'on précisera :

$$\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial z} = 1 \quad \text{si } U = x + \frac{x - y}{y - z}$$