


8. 여러 가지 부등식 step C 풀이

1 (1)번 원래 부등식은

$$\begin{cases} x^2 - (a+1)x + a < 0 & (a) \\ x \geq 3 & (b) \end{cases}$$


여기서 (a)를 인수분해하면 $(x-1)(x-a) < 0$ 이고, 2가지 경우로 나눌 수 있다.

1. (a)의 해가 $1 < x < a$ 인 경우 부등식을 그림으로 그려보자.



이 때 부등식의 해가 있으려면 파란색으로 색칠된 부분이 존재해야 한다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서 이 경우에는 $a > 3$ 이 성립하여야 한다.

2. (a)의 해가 $a < x < 1$ 인 경우 방금 전처럼 그림으로 나타내면



그림에서 볼 수 있듯 겹치는 부분이 없으므로 이때 조건을 만족하는 a의 범위는 존재하지 않는다.

따라서 답은 $a \geq 3$ 이다.

1 (2)번 원래 부등식은

$$\begin{cases} x^2 + x - 6 > 0 & (a) \\ |x - a| \leq 1 & (b) \end{cases}$$

우선 (a)를 인수분해하면 $(x+3)(x-2) > 0$ 이므로 이를 풀면 $x > 2, x < -3$ 이다. 또한, (b)를 풀면 $-1 + a \leq x \leq 1 + a$ 임을 알 수 있다.


이 부등식이 해를 가지기 위해서는 $-1 + a < -3$ 또는 $1 + a > 2$ 이어야 하고, 따라서 이 일차부등식을 풀면 답을 구할 수 있다.

따라서 답은 $a < -2, a > 1$ 이다.

2번 원래 부등식을 다음과 같이 놓자.

$$\begin{cases} x^2 + ax + b < 0 & (a) \\ x^2 + 3x \geq 0 & (b) \end{cases}$$

(b)를 풀면 해가 $x \leq -3, x \geq 0$ 임을 알 수 있다. 또한, 주어진 연립부등식의 해가 $0 \leq x < 3$ 인 것을 통해 (a)의 해는 $k < x < 3$ 의 꼴임을 알 수 있다. 이때 부등식이 성립하는 경우를 그림으로 그려보면 다음과 같다.



근과 계수의 관계의 의해 $3 + k = -a$, $3k = b$ 임을 알 수 있다. $-3 \leq k \leq 0$ 이므로 $|a| + |b| = 3 + k - 3k$ 이고, $3 - 2k = 5$ 이므로 k 는 -1 , a 는 -2 , b 는 -3 임을 알 수 있고, 이 문제의 답은 13이 된다.

3번 주어진 부등식을 정리하면

$$|(m+1)(x-1)| > (m+1)(m+2)$$

이 경우에서 우변의 값의 범위에 따라 몇 가지 경우로 나눌 수 있다.

1. $(m+1)(m+2) < 0$ 인 경우 주어진 부등식의 해는 모든 실수이다.

2a. $m = -1$ 인 경우 $0 > 0$ 이므로 해가 없다. 따라서 $b = -1$ 이다.

2b. $m = -2$ 인 경우 $|-x+1| > 0$ 이므로 $x \neq 1$ 이다.

3. $(m+1)(m+2) > 0$ 인 경우 절댓값 기호를 풀면

$$(m+1)(x-1) > (m+1)(m+2)$$

또는

$$(m+1)(x-1) < -(m+1)(m+2)$$

임을 쉽게 알 수 있다.

여기서 $m+1 > 0$ 이면 $x-1 > m+2$ 또는 $x-1 < -(m+2)$ 이고, 이를 풀면 $x > m+3$ 또는 $x < -(m+1)$ 이다. 따라서 $a = 0$ 이다.

반대로 $m+1 < 0$ 이면 $x-1 < m+2$ 또는 $x-1 > -(m+2)$ 이고, 이를 방금 것처럼 풀면 $x < m+3$ 또는 $x > -(m+1)$ 이다. 따라서 $c = -2$ 이다.

정답은 $a = 0$, $b = -1$, $c = -2$ 이므로 $a - 2b - 3c = 8$ 이다.

4번 주어진 이차방정식을 그래프로 나타냈을 때의 축의 방정식은 $x = -2a$ 이고, a 가 양수이므로 축은 y 축 왼쪽에 존재한다는 것을 알 수 있다. 즉, 실근이 존재한다면 적어도 하나는 음수인 것이다. 따라서 주어진 이차방정식이 실근을 가지면 되므로

$$(4a)^2 - 4(4 - a^2) \geq 0$$

를 만족하면 되고, 정리하면

$$20a^2 - 16 \geq 0$$

이를 풀면 $a \geq \frac{2}{\sqrt{5}}$ 이고, $m = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 이다. 따라서 답은 $5m^2 = 4$.

5번 $t^2 - 2t - 2 = (t-1)^2 - 3$ 이고, $f(x)$ 의 값은 다음과 같이 경우를 나누어 범위를 확인할 수 있다.

1. $x \leq 1 \leq x+2$ 인 경우 x 의 범위는 $-1 \leq x \leq 1$ 이고, $f(x) = -3$ 이므로 정수 x 로 $-1, 0, 1$ 이 가능하다.

2. $1 < x$ 인 경우 $f(x) = x^2 - 2x - 2$ 이고, $x^2 - 2x - 2 \leq x$ 를 풀면 정수해의 값은 $0, 1, 2, 3$ 이다.

3. $x+2 < 1$ 인 경우 $f(x) = (x+2)^2 - 2(x+2) - 2$ 이고, 이를 정리하면 $f(x) = x^2 + 2x - 2$ 이다. 이때 $x^2 + 2x - 2 \leq x$ 를 풀면 정수해의 값은 -2, -1, 0, 1이다.

따라서 정수 x 의 개수는 6개이다.

6번 우선 조건 (가)에 의해 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 3$ 에 의해 대칭임을 알 수 있다. 따라서 문제의 조건을 이용하면 $f(x)$ 를 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$f(x) = n(x-3)^2 + m$$

여기서 n, m 은 자연수이다. (나)를 이용하면 다음 이차방정식은 중근을 갖는다.

$$n(x-3)^2 + m = 2x - 4$$

따라서 판별식을 이용하면 다음과 같다.

$$(6n+2)^2 - 4n(9n+m+4) = 0$$

이를 간단히 하면

$$2n - mn + 1 = 0$$

이고, 이를 통해 $n = 1, m = 3$ 임을 알 수 있다.

$y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = kx + 6 + k - k^2$ 이 서로 다른 두 교점을 가지므로 다음 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 가진다.

$$x^2 - 6x + 12 = kx + 6 + k - k^2$$

판별식을 이용하여 부등식을 세우고, 정리하면

$$3k^2 - 16k - 12 < 0$$

이를 풀면 $-\frac{2}{3} < k < 6$ 임을 알 수 있다.

따라서 자연수 k 로 가능한 것은 1, 2, 3, 4, 5 6개임을 알 수 있다.