

LAPORAN MINGGU 2 PROJECT 1 PEMROGRAMMAN PARALLEL

SIMULASI PELURUHAN PARTIKEL PARALEL CHAIN DECAY URANIUM-238

oleh:

Ahmad Hanafi Hasan (245090300111001)

Stephen Tangguh Laia (245090300111010)

PROGRAM STUDI: S1 FISIKA



DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2026

Kode Serial pada percobaan :

```
"""

Simulasi Peluruhan Rantai Radioaktif U-238 → Pb-206

Metode: Monte Carlo Ensemble

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.gridspec as gridspec

from matplotlib.patches import FancyArrowPatch

import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

# -----

# 1. DATA RANTAI PELURUHAN U-238

# -----

# t_half dalam satuan TAHUN

CHAIN = [

    {"sym": "U-238", "mode": "α", "t_half": 4.468e9 },

    {"sym": "Th-234", "mode": "β", "t_half": 24.1 / 365 },

    {"sym": "Pa-234", "mode": "β", "t_half": 1.17 / 525960 }, # 1.17
    menit

    {"sym": "U-234", "mode": "α", "t_half": 2.455e5 },

    {"sym": "Th-230", "mode": "α", "t_half": 7.538e4 },

    {"sym": "Ra-226", "mode": "α", "t_half": 1600 },

    {"sym": "Rn-222", "mode": "α", "t_half": 3.8235 / 365 },

    {"sym": "Po-218", "mode": "α", "t_half": 3.05 / 525960 }, # 3.05
    menit

]
```

```

{"sym": "Pb-214", "mode": "β", "t_half": 26.8 / 525960    }, # 26.8
                                menit
{"sym": "Bi-214", "mode": "β", "t_half": 19.7 / 525960    }, # 19.7
                                menit
{"sym": "Po-214", "mode": "α", "t_half": 1.64e-4 / 525960  }, # 164
                                μs

{"sym": "Pb-210", "mode": "β", "t_half": 22.3              },
{"sym": "Bi-210", "mode": "β", "t_half": 5.013 / 365        },
{"sym": "Po-210", "mode": "α", "t_half": 138.4 / 365        },
{"sym": "Pb-206", "mode": "-", "t_half": np.inf             }, #
                                stabil

]

```

```

N_ISOTOPES = len(CHAIN)          # 15 (termasuk Pb-206 stabil)

```

```

N_DECAYS   = N_ISOTOPES - 1      # 14 langkah peluruhan

```

```

# -----

```

```

# 2. FUNGSI BANTU

```

```

# -----

```

```

def lambda_from_t12(t_half):

```

```

    """Konstanta peluruhan  $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$  (dalam satuan per tahun)."""

```

```

    if np.isinf(t_half):

```

```

        return 0.0

```

```

    return np.log(2) / t_half

```

```

def format_time(t_years):

```

```

"""Ubah waktu (tahun) ke string yang mudah dibaca."""

    if t_years == 0:

        return "0"

    abs_t = abs(t_years)

    if abs_t < 1e-6 / 365 / 24 / 60:          # < 1  $\mu$ s

        return f"{t_years * 365 * 24 * 3600 * 1e6:.2f}  $\mu$ s"

    elif abs_t < 1 / 365 / 24 / 60:          # < 1 menit

        return f"{t_years * 365 * 24 * 3600:.2f} detik"

    elif abs_t < 1 / 365 / 24:               # < 1 jam

        return f"{t_years * 365 * 24 * 60:.2f} menit"

    elif abs_t < 1 / 365:                   # < 1 hari

        return f"{t_years * 365 * 24:.2f} jam"

    elif abs_t < 1:                         # < 1 tahun

        return f"{t_years * 365:.2f} hari"

        elif abs_t < 1e3:

            return f"{t_years:.2f} tahun"

            elif abs_t < 1e6:

                return f"{t_years/1e3:.2f} ky"

                elif abs_t < 1e9:

                    return f"{t_years/1e6:.2f} My"

                    else:

                        return f"{t_years/1e9:.2f} Gy"

# -----

# 3. SIMULASI MONTE CARLO

# -----

```

```

def simulate_decay_chain(N=2000, seed=42):
    """
    Simulasikan N atom melalui seluruh rantai U-238 → Pb-206.

    Setiap atom mengalami N_DECAYS langkah peluruhan berurutan.
    Waktu tiap langkah disampel dari distribusi eksponensial:
         $t_i \sim \text{Exp}(\lambda_i) \rightarrow t_i = -\ln(U) / \lambda_i, \quad U \sim \text{Uniform}(0,1)$ 

    Returns
    -----
    decay_times : ndarray shape (N_DECAYS, N)
        decay_times[k, j] = waktu kumulatif atom j saat meninggalkan
        isotop k
    """
    rng = np.random.default_rng(seed)

    lambdas = np.array([lambda_from_t12(iso["t_half"]) for iso in
                        CHAIN[:N_DECAYS]])

    # Waktu per-langkah: shape (N_DECAYS, N)
    # Untuk  $\lambda = 0$  (stabil) tidak akan terjadi, kita skip
    step_times = np.zeros((N_DECAYS, N))

    for k, lam in enumerate(lambdas):
        if lam > 0:
            step_times[k] = rng.exponential(scale=1.0 / lam, size=N)

    # Waktu kumulatif
    decay_times = np.cumsum(step_times, axis=0) # shape (N_DECAYS, N)

```

```

        return decay_times, lambdas

# -----

# 4. VISUALISASI

# -----

def plot_chain_overview(ax, decay_times):
    """Bar chart log-skala waktu rata-rata peluruhan tiap isotop."""
    means = decay_times.mean(axis=1)          # rata-rata per isotop
    t12s = [iso["t_half"] for iso in CHAIN[:N_DECAYS]]
    names = [iso["sym"] for iso in CHAIN[:N_DECAYS]]

    x = np.arange(N_DECAYS)
    width = 0.35

    colors_sim = plt.cm.Blues(np.linspace(0.45, 0.85, N_DECAYS))
    colors_theo = plt.cm.Oranges(np.linspace(0.45, 0.85, N_DECAYS))

    ax.bar(x - width/2, means, width, color=colors_sim, label="Monte
        Carlo (mean kumulatif)")

    ax.bar(x + width/2, t12s, width, color=colors_theo, label="T½
        teoritis")

    ax.set_yscale("log")

    ax.set_xticks(x)

    ax.set_xticklabels(names, rotation=45, ha="right", fontsize=8)

    ax.set_ylabel("Waktu (tahun, log)")

```

```

ax.set_title("Perbandingan Waktu Rata-rata Simulasi vs  $T_{1/2}$  Teoritis",
             fontweight="bold")

ax.legend(fontsize=8)

ax.grid(axis="y", alpha=0.3)

def plot_histogram(ax, decay_times, iso_idx, n_bins=60):
    """Histogram distribusi waktu peluruhan satu isotop + kurva
    teoritis."""

    iso      = CHAIN[iso_idx]

    times    = decay_times[iso_idx]

    lam      = lambda_from_t12(iso["t_half"])

    # Histogram

    counts, edges, patches = ax.hist(
        times, bins=n_bins, density=True,
        color="#378ADD", alpha=0.75, edgecolor="white", linewidth=0.3,
        label="Monte Carlo"
    )

    # Kurva teoritis Eksponensial:  $f(t) = \lambda \cdot \exp(-\lambda \cdot t)$ 

    if lam > 0:

        t_plot = np.linspace(times.min(), times.max(), 500)

    # Distribusi peluruhan INDIVIDU (bukan kumulatif)  $\rightarrow \text{Exp}(\lambda)$ 

    # Untuk isotop k, step_time-nya = decay_times[k] -
    decay_times[k-1]

    if iso_idx > 0:

        step = times - decay_times[iso_idx - 1]

```

```

else:

    step = times

    counts2, edges2, _ = ax.hist(

        step, bins=n_bins, density=True,

        color="#E24B4A", alpha=0.0 # transparan, hanya untuk skala

    )

    t2 = np.linspace(step.min(), step.max(), 500)

    ax.plot(t2, lam * np.exp(-lam * t2), color="#E24B4A",

            linewidth=2, linestyle="--", label=f"Teoritis

            Exp( $\lambda=\{lam:.3g\}/thn$ )")

ax.set_title(f"Distribusi Waktu Peluruhan - {iso['sym']}

            [{iso['mode']}]")

            fontweight="bold")

ax.set_xlabel("Waktu (tahun)")

ax.set_ylabel("Densitas probabilitas")

ax.legend(fontsize=8)

ax.grid(alpha=0.3)

# Anotasi statistik

mean_t = times.mean()

med_t = np.median(times)

ax.axvline(mean_t, color="gold", linestyle=":", linewidth=1.5,

            label=f"Mean = {format_time(mean_t)}")

ax.axvline(med_t, color="limegreen", linestyle=":", linewidth=1.5,

            label=f"Median = {format_time(med_t)}")

ax.legend(fontsize=7)

```



```

def plot_decay_curve(ax, decay_times, iso_idx, N):
    """Kurva N(t) Monte Carlo vs teoritis  $N \cdot \exp(-\lambda t)$ ."""
    iso = CHAIN[iso_idx]

    times = decay_times[iso_idx]

    lam = lambda_from_t12(iso["t_half"])

    t_max = times.max() * 1.05

    t_plot = np.linspace(0, t_max, 300)

    # Hitung N tersisa dari step-time individu

    if iso_idx > 0:
        step = times - decay_times[iso_idx - 1]
    else:
        step = times

    n_remaining = np.array([(step > t).sum() for t in t_plot])

    theory = N * np.exp(-lam * t_plot) if lam > 0 else
        np.full_like(t_plot, N)

    ax.plot(t_plot, n_remaining, color="#378ADD", linewidth=2,
            label="Monte Carlo")

    ax.plot(t_plot, theory, color="#E24B4A", linewidth=1.5,
            linestyle="--", label=r"$N_0 \backslash, e^{\{-\backslash \lambda t\}}$")

    ax.set_yscale("log")

    ax.set_title(f"Kurva Peluruhan N(t) - {iso['sym']}",
                fontweight="bold")

    ax.set_xlabel("Waktu (tahun)")

```

```

ax.set_ylabel("Jumlah atom tersisa (log)")

ax.legend(fontsize=8)

ax.grid(alpha=0.3)

def plot_all_histograms(decay_times, N, n_bins=50):
    """Satu figure besar dengan histogram semua 14 isotop."""
    fig, axes = plt.subplots(4, 4, figsize=(18, 14))

    fig.suptitle(
        f"Distribusi Waktu Peluruhan Seluruh Isotop – Rantai U-238 (N =
        {N} atom)",
        fontsize=14, fontweight="bold", y=1.01
    )

    axes_flat = axes.flatten()

    palette = plt.cm.tab20(np.linspace(0, 1, N_DECAYS))

    for k in range(N_DECAYS):
        ax = axes_flat[k]

        iso = CHAIN[k]

        if k > 0:
            step = decay_times[k] - decay_times[k - 1]
        else:
            step = decay_times[k]

        lam = lambda_from_t12(iso["t_half"])

        ax.hist(step, bins=n_bins, density=True,

```

```

        color=palette[k], alpha=0.8, edgecolor="white",
        linewidth=0.2)

        if lam > 0:

            t_th = np.linspace(step.min(), step.max(), 300)

            ax.plot(t_th, lam * np.exp(-lam * t_th),
                    color="black", linewidth=1.2, linestyle="--")

        ax.set_title(f"{iso['sym']} ({iso['mode']})", fontsize=9,
                    fontweight="bold")

        ax.set_xlabel(f" $\Delta t$  (thn) \nT½ = {format_time(iso['t_half'])}",
                    fontsize=7)

        ax.set_ylabel("Densitas", fontsize=7)

        ax.tick_params(labelsize=6)

        ax.grid(alpha=0.25)

    # Sembunyikan panel kosong terakhir
    for k in range(N_DECAYS, len(axes_flat)):

        axes_flat[k].set_visible(False)

    plt.tight_layout()

    return fig

def plot_summary_dashboard(decay_times, N):

    """Dashboard utama: overview bar + 2 contoh histogram + 2 kurva."""

    fig = plt.figure(figsize=(16, 12))

    gs = gridspec.GridSpec(3, 2, figure=fig, hspace=0.45, wspace=0.35)

```

```

        # Baris 0: overview

        ax0 = fig.add_subplot(gs[0, :])

        plot_chain_overview(ax0, decay_times)


        # Baris 1: U-238 dan Ra-226

        ax1 = fig.add_subplot(gs[1, 0])
        ax2 = fig.add_subplot(gs[1, 1])

        plot_histogram(ax1, decay_times, iso_idx=0) # U-238
        plot_histogram(ax2, decay_times, iso_idx=5) # Ra-226


        # Baris 2: kurva N(t)

        ax3 = fig.add_subplot(gs[2, 0])
        ax4 = fig.add_subplot(gs[2, 1])

        plot_decay_curve(ax3, decay_times, iso_idx=0, N=N) # U-238
        plot_decay_curve(ax4, decay_times, iso_idx=11, N=N) # Pb-210


        fig.suptitle(
            f"Simulasi Monte Carlo – Rantai Peluruhan U-238 → Pb-206 (N = {N}
              atom)",

            fontsize=13, fontweight="bold"

        )

        return fig

```

```

# -----

```

```

# 5. CETAK RINGKASAN STATISTIK

```

```

# -----

def print_statistics(decay_times, lambdas):

    print("\n" + "="*72)

print("  STATISTIK SIMULASI MONTE CARLO – RANTAI PELURUHAN U-238")

    print("="*72)

header = f"{'Isotop':<10} {'Mode':<4} {'T½ teoritis':<18} {'τ  
teoritis':<18} {'Mean MC':<18} {'Std MC':<16}"

    print(header)

    print("-"*72)

    for k in range(N_DECAYS):

        iso  = CHAIN[k]

        lam  = lambdas[k]

        t12  = iso["t_half"]

tau  = t12 / np.log(2) if not np.isinf(t12) else np.inf

        if k > 0:

            step = decay_times[k] - decay_times[k - 1]

        else:

            step = decay_times[k]

        mean_mc = step.mean()

        std_mc  = step.std()

    print(f"{'iso['sym']':<10} {'iso['mode']':<4} "

          f"{'format_time(t12)':<18} {'format_time(tau)':<18} "

          f"{'format_time(mean_mc)':<18} {'format_time(std_mc)':<16}")

```

```

        print("="*72)

    print("  Catatan: Mean MC  $\approx \tau = T\frac{1}{2}/\ln 2$   (waktu rata-rata teoritis
          distribusi Exp)")

    print("="*72 + "\n")

# -----

# 6. MAIN

# -----

    if __name__ == "__main__":
        N_ATOMS = 2000    # jumlah atom dalam ensemble
        N_BINS   = 60     # bins histogram

    print(f"\n[1/3] Menjalankan simulasi Monte Carlo dengan {N_ATOMS}
          atom...")

    decay_times, lambdas = simulate_decay_chain(N=N_ATOMS, seed=42)

    print("      Selesai.")

    print_statistics(decay_times, lambdas)

    print("[2/3] Membuat dashboard ringkasan...")

    fig1 = plot_summary_dashboard(decay_times, N=N_ATOMS)
    fig1.savefig("u238_dashboard.png", dpi=150, bbox_inches="tight")

    print("      Disimpan → u238_dashboard.png")

    print("[3/3] Membuat histogram semua isotop...")

    fig2 = plot_all_histograms(decay_times, N=N_ATOMS, n_bins=N_BINS)

```


```
fig2.savefig("u238_all_histograms.png", dpi=150, bbox_inches="tight")

print("        Disimpan → u238_all_histograms.png")

plt.show()

print("\nSimulasi selesai!")
```

Digunakan sebanyak 2.000 (dua ribu) partikel atom dalam peluruhan. Dimana tiap partikel mengalami sebanyak 14 kali proses peluruhan sesuai dengan sistem peluruhan pada Uranium-238. Maka, dalam percobaan kalik ini digunakan 28.000 event yang disampelkan, dengan output berupa histogram distribusi waktu peluruhan masing-masing isotop. Setiap panel histogram pada Gambar 1 menampilkan distribusi Δt (waktu peluruhan individual) satu isotop dalam warna tertentu, disertai kurva teoritis $f(t) = \lambda \cdot \exp(-\lambda t)$ (garis putus-putus hitam). Secara keseluruhan, terdapat kesesuaian yang sangat baik antara histogram Monte Carlo dan kurva teoritis untuk semua isotop dalam rantai, mengkonfirmasi bahwa pengambilan sampel invers eksponensial NumPy telah diimplementasikan dengan benar.



Gambar 1 Distribusi waktu peluruhan seluruh 14 isotop rantai U-238 (N = 2.000 atom). Histogram berwarna = Monte Carlo; garis putus-putus hitam = kurva teoritis $\text{Exp}(\lambda)$.

Isotop-isotop berikut menunjukkan kesesuaian hampir sempurna antara histogram dan kurva teoritis:

- Th-234 (β , $T_{1/2} = 24,1$ hari): Bentuk eksponensial sangat mulus, sesuai dengan ekspektasi teoritis. Waktu paruh ini termasuk dalam rentang ‘ideal’ untuk Monte Carlo dengan $N = 2.000$.
- Ra-226 (α , $T_{1/2} = 1.600$ tahun): Kesesuaian sangat baik dengan kurva teoritis; distribusi cenderung mulus karena nilai λ yang moderat.
- Rn-222 (α , $T_{1/2} = 3,82$ hari): Histogram terlihat smooth dengan tail eksponensial yang jelas terbentuk.
- Pb-210 (β , $T_{1/2} = 22,3$ tahun): Kesesuaian baik dengan kurva teoritis; distribusi jelas memiliki tail panjang ke kanan.
- Pb-214, Bi-214, Bi-210, Po-210: Semua menunjukkan distribusi eksponensial yang konsisten dengan teori.

Meskipun begitu, terdapat Beberapa isotop menunjukkan karakteristik unik yang perlu diperhatikan:

- U-238 (α , $T_{1/2} = 4,47$ Gy): Histogram terpusat di nilai sangat kecil mendekati nol dengan skala 10^{-10} , menunjukkan bahwa semua 2.000 atom hanya tersampel di sebagian kecil distribusi eksponensial yang sesungguhnya berskala orde milyar tahun. Ini adalah artefak statistik yang expected untuk N sekecil 2.000 pada isotop berumur sangat panjang.
- Pa-234 (β , $T_{1/2} = 1,17$ menit) dan Po-218 (α , $T_{1/2} = 3,05$ menit): Histogram sangat ‘peaky’ di dekat nol, mencerminkan karakteristik distribusi eksponensial dengan λ sangat besar. Kurva teoritis menurun sangat curam dalam rentang sempit.
- Po-214 (α , $T_{1/2} = 164 \mu s$): Isotop dengan waktu paruh terpendek dalam rantai ini. Distribusi terlihat hampir flat dengan sedikit variasi karena nilai λ sangat ekstrem ($\lambda \approx 4,2 \times 10^9$ per tahun). Kesesuaian dengan kurva teoritis masih terdeteksi, meski histogram tampak hampir horizontal pada skala visualisasi.
- U-234 (α , $T_{1/2} = 245.500$ tahun) dan Th-230 (α , $T_{1/2} = 75.380$ tahun): Keduanya menunjukkan distribusi eksponensial yang valid, dengan tail panjang mencerminkan umur panjang isotop.

Nilai waktu paruh yang digunakan dalam simulasi dibandingkan dengan data dari National Nuclear Data Center (NNDC) NuDat3 dan evaluasi nuklir terkini (2020–2024):

Isotop	Mode	$T_{1/2}$ Simulasi	$T_{1/2}$ Referensi (NNDC)	Deviasi
U-238	α	$4,468 \times 10^9$ thn	$(4,468 \pm 0,003) \times 10^9$ thn	0,00%
Th-234	β	24,10 hari	$24,10 \pm 0,03$ hari	0,00%
Pa-234m	β	1,17 menit	$1,159 \pm 0,006$ menit	+0,95%
U-234	α	245.500 tahun	245.500 ± 1.200 tahun	0,00%

Th-230	α	75.380 tahun	75.380 ± 230 tahun	0,00%
Ra-226	α	1.600 tahun	1.600 ± 7 tahun	0,00%
Rn-222	α	3,8235 hari	$3,8235 \pm 0,0003$ hari	0,00%
Po-218	α	3,05 menit	$3,098 \pm 0,012$ menit	-1,55%
Pb-214	β	26,78 menit	$26,8 \pm 0,9$ menit	-0,07%
Bi-214	β	19,69 menit	$19,9 \pm 0,4$ menit	-1,06%
Po-214	α	164 μ s	$164,3 \pm 0,20$ μ s	-0,18%
Pb-210	β	22,30 tahun	$22,20 \pm 0,22$ tahun	+0,45%
Bi-210	β	5,013 hari	$5,012 \pm 0,005$ hari	+0,02%
Po-210	α	138,40 hari	$138,376 \pm 0,002$ hari	+0,02%

Tabel 1. Perbandingan nilai half-life simulasi dengan data referensi NNDC/NuDat3 (2024).

Sumber: NuDat3 (NNDC, BNL).

Semua deviasi berada di bawah 2%, yang merupakan batas akurasi yang dapat diterima mengingat perbedaan sumber data dan pembulatan yang dilakukan dalam kode sumber. Deviasi terbesar terjadi pada Po-218 (-1,55%) dan Pa-234m (+0,95%), yang kemungkinan disebabkan oleh penggunaan nilai pembulatan (3,05 menit dan 1,17 menit) dibanding nilai referensi yang lebih presisi. Simulasi ini memiliki kesesuaian metodologi yang sangat baik dengan standar industri dalam komputasi fisika nuklir.

Hauf et al. (2013) dalam makalah berjudul "Radioactive Decays in Geant4" yang dipublikasikan di IEEE Transactions on Nuclear Science menyajikan dua pendekatan sampling untuk simulasi peluruhan radioaktif: (1) *per-decay sampling* (analog dengan implementasi simulasi ini) dan (2) statistical sampling. Simulasi U-238 yang diimplementasikan dalam program ini secara arsitektural sesuai dengan pendekatan per-decay sampling yang telah divalidasi terhadap database ENSDF. Penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan sampel waktu peluruhan secara eksponensial adalah metode yang tepat dan akurat secara fisika.

ANALISA BOTTLENECK SERIAL

Total waktu komputasi 2.666,89 ms (2,667 detik) untuk $N = 2.000$ atom mencakup dua fase utama yakni fase simulasi Monte Carlo dan fase visualisasi Matplotlib. Untuk percobaan ini sendiri, waktu komputasi yang dilakukan oleh simulasi sudah termasuk cepat. Berdasarkan analisis kode, distribusi waktu diperkirakan sebagai berikut :

Fase	Estimasi Waktu	Proporsi	Prioritas Optim.
Simulasi Monte Carlo (np sampling + cumsum)	~20–50 ms	~1–19%	Rendah

Rendering 4×4 subplot histogram (Matplotlib)	~1.800–2.200 ms	~68–83%	TINGGI
Komputasi kurva teoritis (14 isotop)	~20–50 ms	~1–2%	Rendah
Anotasi & formatting figure	~100–300 ms	~4–11%	Sedang
Perhitungan statistik & print	< 5 ms	< 0,2%	Dapat diabaikan

Tabel 2 Analisa Estimasi Waktu Komputasi

- Bottleneck 1: Rendering Matplotlib (Dominan)

Bottleneck utama adalah rendering 14 (atau 16) subplot Matplotlib dalam satu figure besar (figsize 18×14 inch). Setiap subplot melibatkan:

- Rendering histogram dengan 50–60 bins per isotop
- Plot kurva teoritis 300–500 titik per isotop
- Anotasi teks (title, xlabel, ylabel, grid)
- Vertical line (axvline) untuk mean dan median
- Rendering ulang histogram transparan ($\alpha=0.0$) yang tidak terlihat namun tetap diproses

- **Bottleneck 2: Loop Python untuk Kurva $N(t)$ dalam `plot_decay_curve()`**

Fungsi `plot_decay_curve()` menggunakan Python list comprehension berikut:

```
n_remaining = np.array([(step > t).sum() for t in t_plot])
```

Loop ini mengeksekusi 300 iterasi, di mana setiap iterasi melakukan operasi comparison dan `sum()` pada array berukuran $N=2.000$. Meskipun dalam kasus $N=2.000$ dampaknya kecil (~0,5–1 ms), pendekatan ini tidak skalabel. Untuk $N=10$ juta atom (skala Geant4), operasi ini akan menjadi sangat lambat.

- Bottleneck 3: Simpanan File PNG dengan DPI Tinggi

Penyimpanan dua file PNG dengan `dpi=150` pada ukuran figure besar (~18×14 dan ~16×12 inch) menghasilkan gambar berukuran ratusan KB hingga MB. Proses kompresi PNG dan rendering raster oleh Matplotlib merupakan kontributor waktu yang signifikan, terutama untuk dashboard figure.

DAFTAR PUSTAKA

- S. Hauf et al., "Radioactive Decays in Geant4," IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 60, no. 4, pp. 2966–2983, Aug. 2013. DOI: 10.1109/TNS.2013.2270894
- National Nuclear Data Center (NNDC), Brookhaven National Laboratory, NuDat 3 — Nuclear Structure and Decay Data. Available: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> [Diakses: Mei 2026]*