



ĐỀ ÁN 818-BYT

"Tài liệu ban hành kèm theo quyết định sốngày của Bộ Trưởng Bộ Y Tế"



CHƯƠNG TRÌNH SÀNG LỌC PHÒNG CHỐNG UNG THƯ VÚ, UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

dean818k.vn

Lưu hành nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH SÀNG LỌC VÀ PHÒNG CHỐNG UNG THƯ THEO ĐỀ ÁN 818 CỦA BỘ Y TẾ

UNG THƯ CỔ TỬ CUNG (UTCTC)

Đối tượng cần sàng lọc

- Tất cả phụ nữ đã từng quan hệ tình dục.
- Tiêm vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung do HPV.
- Có nhiều bạn tình hoặc bạn tình có nhiều bạn tình khác.
- Quan hệ tình dục không an toàn, không sử dụng bao cao su.
- Hút thuốc lá nhiều và kéo dài.
- Sử dụng thuốc tránh thai nội tiết kéo dài ít nhất trên 5 năm.

Kỹ thuật sàng lọc

- Nghiệm pháp VIA
- Xét nghiệm tế bào học
- Định type HPV
- Xét nghiệm marker: CEA; SCC

Lịch sàng lọc

- Định kỳ sàng lọc HR-HPV¹: 5 năm 1 lần²
- Hoặc kết hợp papsmear và type HP: 5 năm 1 lần²



Bộ dụng cụ tự thu mẫu phục vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung

GÓI SÀNG LỌC K CỔ TỬ CUNG

Bao gồm đầy đủ các dịch vụ thăm khám lâm sàng và xét nghiệm tiêu chuẩn phục vụ sàng lọc định kỳ UTCTC

Gói UTCTC tiết kiệm

STT	CÁC DANH MỤC XÉT NGHIỆM
1	Khám lâm sàng
2	Siêu âm đầu dò âm đạo
3	Có khả năng phát hiện và xác định 21type 2 Type nguy cơ cao phổ biến: 16, 18. các type nguy cơ cao hiếm gặp Type nguy cơ cao: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82. 3 Type nguy cơ thấp: 6, 11, 44. Các tuyp khác: 26, 53, 66 Hóa chất sử dụng: CE-IVD Công nghệ sử dụng: Realtime PCR.
4	Markers: CEA, SCC

Gói UTCTC đầy đủ

STT	CÁC DANH MỤC XÉT NGHIỆM
1	Khám lâm sàng
2	Siêu âm đầu dò âm đạo
3	Có khả năng phát hiện và xác định 21type 2 Type nguy cơ cao phổ biến: 16, 18. các type nguy cơ cao hiếm gặp Type nguy cơ cao: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82. 3 Type nguy cơ thấp: 6, 11, 44. Các tuyp khác: 26, 53, 66 Hóa chất sử dụng: CE-IVD Công nghệ sử dụng: Realtime PCR.
4	Xét nghiệm CellPrep Pap test Phát hiện bất thường tế bào cổ tử cung Phương pháp: Tế bào học nhúng dịch LBC
5	Markers: CEA, SCC

UNG THƯ VÚ

WHO 2017: thế giới có khoảng 24,5 triệu ca mắc ung thư với 1,9 triệu ca mắc ung thư vú ở nữ giới

Việt Nam 2018: trong tổng cộng 165.000 số ca ung thư mắc mới có 15.000 ca ung thư vú (9.2%) và ghi nhận 6.000 ca tử vong do ung thư vú

Đối tượng cần sàng lọc

- Đối tượng nguy cơ cao gồm:
- Gia đình có tiền sử người thân bị ung thư vú, ung thư buồng trứng
- Đột biến gen di truyền BRCA A1 và BRCA2
- Có người thân (bố mẹ ruột, anh chị em hoặc con ruột có đột biến gen BRCA1 và hoặc BRCA2
- Điều trị xạ vùng ngực trong giai đoạn từ 10-30 tuổi
- Các đối tượng còn lại có nguy cơ trung bình

Kỹ thuật sàng lọc

- Khám vú
- X/Quang tuyến vú
- Xét nghiệm BRCA1, BRCA2
- Xét nghiệm marker CEA, CA15.3

Lịch sàng lọc

- Sàng lọc bắt đầu từ 40 tuổi với người có nguy cơ trung bình, 30 tuổi với người có nguy cơ cao
- X/Quang vú định kỳ 1 năm 1 lần
- Sàng lọc gen: Đột biến BRCA1 và BRCA2 (1 lần trong đời)

GÓI SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ

Bao gồm đầy đủ các dịch vụ thăm khám lâm sàng và xét nghiệm tiêu chuẩn phục vụ sàng lọc định kỳ ung thư vú

STT	CÁC DANH MỤC XÉT NGHIỆM
1	Khám lâm sàng
2	Siêu âm tuyến vú 2 bên
3	Chọc tế bào tuyến vú
4	Nhuộm và đọc xét nghiệm tế bào tuyến vú
5	Markers: CEA, CA 15.3
6	BRCA1/BRCA2

UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

Tổ chức giám sát ung thư toàn cầu (2018): thế giới có hơn 295 nghìn trường hợp ung thư buồng trứng đã được phát hiện, và gần 185 nghìn trường hợp tử vong xảy ra do ung thư buồng trứng (chiếm 4,4% toàn bộ tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư ở phụ nữ).

Đối tượng nguy cơ cao cần sàng lọc

- Có người thân mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng.
- Có bất thường gen BRCA1 hoặc BRCA2.
- Có các gen liên quan đến ung thư đại trực tràng nonpolyposis di truyền (hội chứng Lynch).
- Thừa cân, béo phì.
- Trên 50 tuổi.
- Có triệu chứng cảnh báo mắc ung thư buồng trứng: Đau bụng dưới, sụt cân nhanh, chán ăn, đầy bụng, buồn nôn,...

Lịch sàng lọc

- Xét nghiệm CA-125 khi có nguy cơ.
- Khám phụ khoa và Siêu âm vùng chậu => 06 tháng/lần

GÓI SÀNG LỌC UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

Bao gồm đầy đủ các dịch vụ thăm khám lâm sàng và xét nghiệm tiêu chuẩn phục vụ sàng lọc định kỳ ung thư buồng trứng

STT	CÁC DANH MỤC XÉT NGHIỆM
1	Khám lâm sàng
2	Siêu âm đầu dò âm đạo
3	Markers: CA12.5, HE4, CA72.4

UNG THƯ CỔ TỬ CUNG (UTCTC)

Đứng thứ 2

Về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong trong các loại ung thư thường gặp ở nữ giới tại Việt Nam

99.7%

NGUYÊN NHÂN LÀ ĐÔ HPV


GÓI XÉT NGHIỆM GENOME-HPV

	XÉT NGHIỆM GENOME-HPV	XÉT NGHIỆM GEN-HPV 21 TYPES
Công nghệ/ Thiết bị	Realtime PCR. Sử dụng thiết bị Realtime System-CE-VD	Realtime PCR. Sử dụng thiết bị Realtime System-CE-IVD
Các type phát hiện	Có khả năng phát hiện 15 type • 2 Type nguy cơ cao phổ biến: 16, 18. • 11 Type nguy cơ cao hiếm gặp: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68. • 2 Type nguy cơ thấp: 6, 11.	Có khả năng phát hiện và xác định 21type • 2 Type nguy cơ cao phổ biến: 16, 18. • các type nguy cơ cao hiếm gặp • Type nguy cơ cao: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82. • 3 Type nguy cơ thấp: 6, 11, 44. • Các tuyp khác: 26, 53, 66
Loại mẫu	Phết dịch cổ tử cung	
Thời gian trả kết quả	03 ngày	
Độ nhạy	ĐỘ NHẠY CAO ; ĐỘ ĐẶC HIỆU CAO	

- Các type gây ung thư gồm: 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82. Trong đó, type 16 và 18 phổ biến nhất.
- Type HPV 16 và 18 có nguy cơ cao nhất và phổ biến nhất. Sự liên quan liên quan của 2 type này với các loại ung thư như sau:
 - + Ung thư cổ tử cung: 70%.
 - + Ung thư hậu môn: 92%.
 - + Ung thư hầu họng: 89%.
 - + Ung thư âm đạo: 80%.
 - + Ung thư âm hộ: 80%.

PREP: xét nghiệm tế bào học nhúng dịch (LBC), phát hiện bất thường cổ tử cung được chỉ định trong phác đồ tầm soát UTCTC của Úc.

***Nguồn:** National Cervical Screening Program: Guidelines for the management of screen-detected abnormalities, screening in specific populations and investigation of abnormal vaginal bleeding*





TIÊM VẮC XIN HPV PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

Kính gửi Quý khách hàng!

Ung thư cổ tử cung (UTCTC) đứng thứ 3 trên thế giới và thứ 2 tại Việt Nam về tỉ lệ mắc ung thư của phụ nữ.

Trung bình mỗi ngày có **7** phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung ở Việt Nam. Mỗi năm có khoảng hơn **4.000** người được phát hiện mắc.

Việt Nam có khoảng hơn **37** triệu phụ nữ có nguy cơ mắc căn bệnh này.

BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH TỐT NHẤT LÀ TIÊM VẮC XIN

- Chỉ với 03 liều vắc xin phụ nữ sẽ tránh được nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung
- Vắc xin Gardasil (Mỹ): Phòng 4 tuýp HPV đó là **6, 11, 16 và 18**;
- Độ tuổi tiêm cho nữ giới **từ 9 tuổi đến 26 tuổi**;



LỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN HPV:

- **Mũi 1: 0,5ml tiêm bắp**
- **Mũi 2: cách mũi thứ nhất 2 tháng**
- **Mũi 3: nhắc lại lúc 6 tháng.**



DANH MỤC CÁC XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm miễn dịch

STT	CÁC DANH MỤC XÉT NGHIỆM
I	XÉT NGHIỆM MARKER UNG THƯ
1	Ca12.5: Marker ung thư buồng trứng
2	Ca15.3: Marker ung thư vú
3	SCC: Chỉ điểm K vòm, cổ tử cung
4	CEA: Marker ung thư đường tiêu hóa
5	Ca72-4: Marker ung thư dạ dày
6	CA19-9: Marker ung thư đại tràng
7	AFP: Marker ung thư gan (AFP)
8	FT3: Xét nghiệm tuyến giáp
9	FT4: Xét nghiệm tuyến giáp
10	TSH: Xét nghiệm tuyến giáp
11	AntiTG: Marker ung thư sớm tuyến giáp
12	Cyfra21.1: Marker ung thư phổi
13	NSE: Marker ung thư phổi tế bào nhỏ
II	XÉT NGHIỆM UNG THƯ VÀ BỆNH LÝ
1	Ung thư vú và buồng trứng di truyền (2 gen BRCA1/BRCA2): Xác định đột biến gen gây ung thư vú và buồng trứng di truyền hoặc có tính gia đình

2	GenomePAC CD: PGS (Dịch vụ bộ gen cá nhân) Nữ: 12 loại ung thư và 16 loại bệnh 12 loại ung thư (Ung thư tuyến giáp, Thực quản, Dạ dày, Gan, Đại trực tràng, Bàng Quang, Thận, Phổi, Tuyến tụy, Vú, Buồng trứng, Nội mạc tử cung) 15 loại bệnh (Phình động mạch não, Viêm xương khớp, Đau nửa đầu, Béo phì, Huyết áp, Trúng phong, Rung tâm nhĩ, Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Hen suyễn, Loãng xương, Bệnh Alzheimer, Rối loạn trầm cảm, Đái tháo đường tuýp II, Nhồi máu cơ tim, Bệnh Parkinson)
3	GenomePAC Life: PGS (Dịch vụ bộ gen cá nhân) 6 loại ung thư: Ung thư tuyến giáp; Ung thư phổi; Ung thư gan; Ung thư dạ dày; Ung thư đại trực tràng; Ung thư tuyến tụy
III	XÉT NGHIỆM UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
1	Xét nghiệm HPV định type (Ung thư cổ tử cung) type 16 và 18)
2	Xét nghiệm HPV định type (ung thư cổ tử cung) type 6,11,16 và 18)
3	Xét nghiệm HPV định type (Ung thư cổ tử cung) - 15 type - Các type nguy cơ ung thư cao (ung thư cổ tử cung, âm đạo, dương vật...) • 2 Type nguy cơ cao phổ biến: 16, 18. • 11 Type nguy cơ cao hiếm gặp: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68. • 2 Type nguy cơ thấp: 6, 11.
4	Xét nghiệm virus HPV gây ung thư hậu môn
5	Định type HPV (Ung thư cổ tử cung) - Các type nguy cơ ung thư cao (ung thư cổ tử cung, âm đạo, dương vật...) (21 type bao gồm các type hay gặp: 6, 11, 16, 18)
6	Định type HPV (Ung thư cổ tử cung) - Các type nguy cơ ung thư cao (ung thư cổ tử cung, âm đạo, dương vật...) (24 type bao gồm các type hay gặp: 6, 11, 16, 18)
7	Cellprep pap test (Ung thư cổ tử cung): Có khả năng phát hiện sớm những bất thường trong tế bào cổ tử cung với nhiều mức độ khác nhau.
8	PAP'SMEAR Xét nghiệm tế bào Cổ tử cung giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và bệnh lý ác tính ở tử cung.
9	Xét nghiệm tế bào âm đạo (Soi tươi dịch âm đạo): Phát hiện các loại nấm, vi khuẩn, gây bệnh phụ khoa

CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC

Xét nghiệm khác

STT	XÉT NGHIỆM KHÁC
1	HBV - DNA PCR
2	HE4: Đánh giá nguy cơ ung thư buồng trứng



ĐỀ ÁN 818

TỔNG CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

