

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 테니스를 안 쳐도 생기나요?

반복적인 손목 사용, 작업과 운동 등 다양한 부하로 생길 수 있습니다.

Q2 주사를 맞으면 낫나요?

종류와 시점에 따라 이득과 위험이 달라 반복 사용은 신중해야 합니다.

Q3 관절경이 항상 필요한가요?

아닙니다. 병변 위치와 동반 관절 문제에 따라 접근법이 달라집니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 외상 뒤 팔꿈치 변형 또는 관절을 움직일 수 없음
- 손의 감각·근력이 갑자기 떨어지거나 열감·발열 동반

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

수술 권유를 받았어도 다시 확인할 수 있습니다.
증상·진찰·영상이 맞는지, 비수술 선택지와 수술 범위를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 팔꿈치 관절경

검사와 영상을 직접 설명하고 필요한 치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 영상 CD·판독지
- 치료·수술 이력
- 복용 중인 약·알레르기

대표 전화 031-328-0333

경기도 용인시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사 결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

테니스 엘보

팔꿈치 바깥쪽 힘줄 통증, 부하 조절과 재활이 치료의 출발점입니다.



질환과 치료를 이해하기 위한 해부 그림

관절경 건 병변 정리술(선택적)

주사 횟수보다 통증을 만드는 작업 방식과 운동 계획을 함께 바꾸는 것이 재발 예방에 중요합니다.

01 질환·증상

손목을 펴는 힘줄이 팔꿈치 바깥쪽 뼈에 붙는 부위에서 반복 부하로 변성되고 통증이 생기는 질환입니다.



이런 증상을 확인합니다

- 컵 들기·문고리 돌리기 때 바깥쪽 통증
- 손목을 뒤로 젖히거나 꽉 칠 때 통증
- 팔꿈치 바깥 뼈 주변의 압통

진단의 핵심

영상만으로 수술을 결정하지 않습니다.
증상·진찰·영상이 같은 부위를 가리키는지 확인합니다.

02 치료 선택

증상·진찰·영상·치료 반응·회복 목표를 함께 보고 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 통증을 만드는 작업과 운동 부하 조절
- 스트레칭·편심성 근력 재활
- 보조기·체외 충격파·선택적 주사

수술을 검토할 때

- 체계적인 비수술 치료에도 증상이 오래 지속
- 통증 때문에 일·생활 기능 제한이 큰 경우
- 힘줄 병변과 증상이 일치하거나 관절 안 치료가 필요할 때

치료의 흐름

비수술 치료

기능 재평가

필요 시 수술

03 수술·회복

관절경 건 병변 정리술(선택적)



- 가 관절경으로 관절 안 동반 병변 확인
- 나 변성된 힘줄 부착부를 필요한 범위에서 정리
- 다 주변 인대·신경을 보호하고 마무리

회복은 날짜보다 기능 기준으로

- 초기 | 상처 보호와 가벼운 팔꿈치 움직임
- 중기 | 관절 운동 뒤 손목 신전근 강화
- 복귀 | 통증 없는 악력과 반복 작업 내구성 확인

알아둘 위험과 한계

감염, 관절 강직, 통증 지속, 힘줄 약화, 인대·신경 손상, 추가 수술 가능성이 있습니다.