

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 검사 없이 수술하나요?

전형적 증상과 진찰을 기본으로 필요 시 신경 전도·근전도 검사를 추가합니다.

Q2 내시경이면 흉터가 없나요?

절개가 작아도 흉터·통증과 합병증 가능성은 있습니다.

Q3 저림은 바로 없어지나요?

압박 기간과 신경 손상 정도에 따라 회복 속도가 다릅니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 엄지 힘이 빠르게 떨어지거나 근육이 눈에 띄게 꺼짐
- 외상 뒤 손 감각과 혈액 순환이 급격히 나빠짐

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

수술 권유를 받았어도 다시 확인할 수 있습니다.
증상·진찰·영상이 맞는지, 비수술 선택지와 수술 범위를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 손·손목
내시경

검사와 영상을 직접 설명하고 필요한
치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 영상 CD·판독지
- 치료·수술 이력
- 복용 중인 약·알레르기

대표 전화 031-328-0333

경기도 용인시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사
결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

수근관 증후군

엄지부터 약지까지 저리고 밤에 깨는 증상, 정중
신경 압박을 확인합니다.



질환과 치료를 이해하기 위한 해부 그림

내시경 수근관 감압술

야간 저림은 비교적 빨리 줄 수 있지만 오래된
무감각과 근력 저하는 천천히 회복되거나 남을 수
있습니다.

01 질환·증상

손목의 좁은 통로에서 정중 신경이 눌려 손 저림, 야간통, 엄지 힘 저하가 생기는 질환입니다.



이런 증상을 확인합니다

- 엄지·검지·중지·약지 일부의 저림
- 밤에 깨거나 손을 털면 잠시 나아짐
- 단추·젓가락이 어렵고 물건을 떨어뜨림

진단의 핵심

영상만으로 수술을 결정하지 않습니다.
증상·진찰·영상이 같은 부위를 가리키는지 확인합니다.

02 치료 선택

증상·진찰·영상·치료 반응·회복 목표를 함께 보고 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 손목 보조기·활동 조절
- 약물 또는 선택적 주사
- 감각·엄지 근력과 전기 진단 검사 재평가

수술을 검토할 때

- 야간통과 저림이 비수술 치료에도 지속
- 감각 저하나 엄지 근육 약화가 진행
- 검사에서 의미 있는 정중 신경 압박이 확인될 때

치료의 흐름


비수술 치료

기능 재평가

필요 시 수술

03 수술·회복

내시경 수근관 감압술



- 가 작은 절개로 내시경을 수근관에 삽입
- 나 정중 신경을 보호하며 횡수근 인대 절개
- 다 감압 상태와 출혈 여부 확인

회복은 날짜보다 기능 기준으로

- 초기 | 손을 올리고 손가락을 움직여 부종 예방
- 중기 | 상처와 감각을 보며 가벼운 손 사용 확대
- 복귀 | 악력·집기·반복 작업 강도에 맞춰 조정

알아둘 위험과 한계

감염, 출혈, 신경·힘줄 손상, 손바닥 통증, 불안전 감압, 증상 지속·재발 가능성이 있습니다.