

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 한 번 접질려도 수술하나요?

대부분은 보호와 재활이 먼저이며 반복 불안정성이 남을 때 검토합니다.

Q2 관절경도 함께 하나요?

연골·충돌 병변이 의심되면 관절 안을 확인하고 치료할 수 있습니다.

Q3 언제 운동에 복귀하나요?

근력·균형·점프와 방향 전환 안정성을 확인한 뒤 단계적으로 결정합니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 다친 뒤 뼈 압통이 심하고 네 걸음도 걷기 어려움
- 발이 차갑거나 감각이 줄고 변형이 뚜렷함

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

수술 권유를 받았어도 다시 확인할 수 있습니다.
증상·진찰·영상이 맞는지, 비수술 선택지와 수술 범위를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 발목 관절경

검사와 영상을 직접 설명하고 필요한 치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 영상 CD·판독지
- 치료·수술 이력
- 복용 중인 약·알레르기

대표 전화 031-328-0333

경기도 용인시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사 결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

발목 외측 인대 손상

반복되는 접질림과 발목 빠짐, 인대 기능과 관절 안 손상을 함께 확인합니다.




질환과 치료를 이해하기 위한 해부 그림

발목 관절경 검사·MBO

통증 감소뿐 아니라 발목이 빠질 것 같은 느낌과 반복 염좌가 줄었는지를 기능으로 평가합니다.

01 질환·증상

발목 외측 인대가 늘어나거나 파열된 뒤 충분히 회복되지 않으면 반복적으로 접질리고 불안정한 느낌이 남을 수 있습니다.



이런 증상을 확인합니다

- 평지에서도 반복적으로 발목이 접질림
- 바깥쪽 통증·부종과 불안감
- 달리기·등산·방향 전환이 어려움

진단의 핵심

영상만으로 수술을 결정하지 않습니다.
증상·진찰·영상이 같은 부위를 가리키는지 확인합니다.

02 치료 선택

증상·진찰·영상·치료 반응·회복 목표를 함께 보고 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 보조기와 활동 조절
- 비골근 강화·균형·고유 감각 재활
- 통증 원인에 따른 선택적 치료

수술을 검토할 때

- 충분한 재활 뒤에도 반복적으로 접질림
- 진찰·스트레스 검사에서 기계적 불안정성 확인
- 관절 안 연골·충돌 병변을 함께 치료해야 할 때

치료의 흐름

비수술 치료

기능 재평가

필요 시 수술

03 수술·회복

발목 관절경 검사·MBO



- 가 관절경으로 연골·충돌 병변 확인 및 필요 시 치료
- 나 늘어난 외측 인대를 해부학적 위치에 봉합
- 다 긴장도와 발목 안정성 확인

회복은 날짜보다 기능 기준으로

- 초기 | 봉합 인대 보호와 상처·부종 관리
- 중기 | 관절 운동·근력·균형 회복
- 복귀 | 한 발 서기·점프·방향 전환 안정성 확인

알아둘 위험과 한계

감염, 신경 자극·감각 저하, 관절 강직, 통증 지속, 불안정성 재발, 추가 수술 가능성이 있습니다.