

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 모양이 휘면 꼭 수술하나요?

아닙니다. 통증·보행·신발 불편이 치료 판단의 중심입니다.

Q2 교정기만으로 펴질 수 있나요?

패드·교정기·넓은 신발은 불편을 줄일 수 있지만, 변한 뼈 정렬을 되돌리지는 못합니다.

Q3 MICA는 누구에게나 가능한가요?

체중부하 X-ray, 관절 상태와 변형 정도를 보고 맞는 수술법을 선택합니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 갑작스러운 심한 통증과 뚜렷한 발적·열감
- 잘 낫지 않는 상처·궤양 또는 새로 생긴 감각 저하

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

증상과 체중부하 X-ray가 맞는지, 비수술 선택지와 수술 범위를 함께 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 족부·발목

진찰과 영상을 직접 설명하고 개인별 치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 체중부하 X-ray·판독지
- 신발· 깔창·약물 등 치료 기록
- 통증이 심해지는 상황과 기간

대표 전화 031-328-0333

용인특례시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사 결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

무지외반증

엄지 안쪽 돌출과 신발 통증, 앞발 정렬을 함께 확인합니다.



최소침습 Chevron·Akin 절골술(MICA)

수술은 모양이 아니라 통증·보행·신발 불편과 체중부하 X-ray를 함께 보고 결정합니다.

01 질환·증상

엄지발가락이 둘째발가락 쪽으로 기울고 첫째 중족골이 안쪽으로 벌어지면서, 엄지 관절 안쪽이 돌출되는 변형입니다.



이런 증상을 확인합니다

- 엄지 안쪽 돌출이 신발에 닿아 아픔
- 볼 넓은 신발이 필요하고 오래 걷기 불편
- 앞발바닥 굳은살·통증, 둘째발가락 변형

진단의 핵심

체중을 실은 X-ray로 엄지 기울기와 첫째 중족골 정렬, 관절염 여부를 확인합니다.

02 치료 선택

증상·진찰·영상·생활 불편을 함께 보고 치료 방향을 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 앞볼 넓은 신발과 낮은 굽
- 패드·깔창·진통 소염 치료
- 활동 조절과 경과 확인

수술을 검토할 때

- 충분히 치료해도 통증이 반복될 때
- 신발·보행·일상 기능이 제한될 때
- 둘째발가락 변형·앞발 통증이 진행될 때

치료의 흐름

비수술 치료

>

증상·X-ray
재평가

>

필요 시 수술

03 수술·회복

최소침습 Chevron·Akin 절골술(MICA)



- 가 작은 절개와 영상장비로 뼈 위치 확인
- 나 Chevron 절골로 첫째 중족골 정렬 교정
- 다 필요 시 Akin 절골 후 나사로 고정

회복은 뼈 유합을 확인하며

- 초기: 상처·부종 관리, 수술 신발, 체중부하는 지시에 따라
- 이후: X-ray로 뼈 유합을 확인하며 신발과 활동을 단계적으로

알아둘 위험과 한계

감염, 신경 자극·감각 저하, 관절 강직, 나사 자극, 지연 유합·불유합, 재발, 과소·과교정, 전이 중족통 등이 있을 수 있습니다.