Lec35

02 April 2026 09:11 AM

Example 1:



Input: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]

$i = n/2$

5 : [1][1]

15 + 5
= 20 − 5
= 25

$i = \cancel{0}\ \cancel{1}\ 2$

$j = i$

$n = 3$

$= n - i - 1$

$1 = 3 - 1 - 1$

$0 = 3 - 2 - 1$



$i = \cancel{0}\ 1$

arr[1][1]
[1][1]
[2][2] sum += 1

$n - i - 1$



```
for(i=0; i<n; i++){
    sum += arr[i][i]
}

for(i=0; i<n; i++){
    sum += arr[i][n-i-1]
}

if(n%2 != 0){
    return sum -= arr[n/2][n/2]
}
return sum
```

sum = 0

$i = n-1$

3

$c = 3$



min = 1 2 3



[1, 2, 8, 4, 9]



min = 1 — C1 C2 C3

min = 2 → C1 ✗ C2 C3 2 − 1 = 1

min = 3 → C1 C2 C3 4 − 2 = 2

min = 4 → C1 ✗ ✗ C2 ✗ 2 − 1 = 1

4 − 1 = 3

min=1

min = 4 → C_1 × × C_2 ×

2-1-1
4-1=3
8-4=4

isitPossible(stall, noc, min)

1, 2, 3, 4

$x^k <= n$

min=1

while (isitPossible(stall, noc, min))

min++

}

return = min-1

min=4



$\frac{0+8}{2} = 4$

$\frac{0+3}{2} = 1$

$\frac{1+3}{2} = 2$

$\frac{3+3}{2} = 3$