

Name: Luong Thi Uy Thieu
Class: DMA-B05

HOMEWORK
DISCRETE MATHEMATICS
PROBLEMSET 07

Problem 1:

Packets 2,1,3. (2 lost)

Consider $P(2) = 2, P(3) = 1, P(5) = 3$

$P(x)$ go through $(2,2), (3,1), (5,3)$

$$\Rightarrow P(x) = 2 * \frac{(x-3)(x-5)}{(2-3)(2-5)} + 1 * \frac{(x-2)(x-5)}{(3-2)(3-5)} + 3 * \frac{(x-2)(x-3)}{(5-2)(5-3)}$$

$$\Rightarrow P(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{13}{3}x + 8$$

Send $P(1) = \frac{13}{3}, P(2) = 2, P(3) = 1, P(4) = \frac{4}{3}, P(5) = 3$

Receive $P(2) = 2, P(3) = 1, P(5) = 3$

\Rightarrow The corrected values of the error packages are $P(1) = \frac{13}{3}$ and $P(4) = \frac{4}{3}$

Problem 2:

a) Error rate is $1/5 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow E(x)$ degree 1 $\Rightarrow E(x) = x + b_0$

$n + 2k = 5 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow P(x)$ degree $(n-1) = 2$

$Q(x) = P(x) * E(x) \Rightarrow Q(x)$ degree 3 $\Rightarrow Q(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$

$$R(x_1) = R(1) = 2$$

$$R(x_4) = R(4) = 5$$

$$R(x_2) = R(2) = 1$$

$$R(x_5) = R(5) = 3$$

$$R(x_3) = R(3) = 4$$

$$\text{Have: } Q(x) = R(x) * E(x)$$

$$\Rightarrow Q(1) = R(1) * E(1)$$

.....

$$Q(5) = R(5) * E(5)$$

$$\Rightarrow a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2 + 2b_0 \equiv a_3 + a_2 + a_1 + a_0 + 5b_0 = 2$$

$$a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 2 + b_0 \equiv a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 + 6b_0 = 2$$

$$6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 = 5 + 4b_0 \equiv 6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 + 3b_0 = 5$$

$$a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 = 6 + 5b_0 \equiv a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 + 2b_0 = 6$$

$$6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 = 1 + 3b_0 \equiv 6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 + 4b_0 = 1$$

$$\Rightarrow a_3 = \frac{-1}{20} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$a_2 = \frac{7}{4} \equiv 0 \pmod{7}$$

$$a_1 = \frac{-9}{4} \equiv 3 \pmod{7}$$

$$a_0 = \frac{351}{20} \equiv 6 \pmod{7}$$

$$b_0 = -3 \equiv 4 \pmod{7}$$

$\Rightarrow Q(x) = x^3 + 3x + 6$ and $E(x) = x - 3 \Rightarrow E(3) = 0 \Rightarrow$ packet x_3 at which error occurred

$$\Rightarrow P(x) = R(x) = Q(x) / E(x) = x^2 + 3x + 12 \equiv x^2 + 3x + 5 \pmod{7}$$

\Rightarrow The corrected value of the error packet is: $P(3) = 23 \equiv 2 \pmod{7}$

b) Error rate is $1/5 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow E(x)$ degree 1 $\Rightarrow E(x) = x + b_0$

$$n + 2k = 5 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow P(x) \text{ degree } (n-1) = 2$$

$$Q(x) = P(x) * E(x) \Rightarrow Q(x) \text{ degree } 3 \Rightarrow Q(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$R(x_1) = R(1) = 3$$

$$R(x_4) = R(4) = 2$$

$$R(x_2) = R(2) = 2$$

$$R(x_5) = R(5) = 5$$

$$R(x_3) = R(3) = 1$$

$$\text{Have: } Q(x) = R(x) * E(x)$$

$$\Rightarrow Q(1) = R(1) * E(1)$$

.....

$$Q(5) = R(5) * E(5)$$

$$\Rightarrow a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 3(1 + b_0) \equiv a_3 + a_2 + a_1 + a_0 + 4b_0 = 3$$

$$a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 2(2 + b_0) \equiv a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 + 5b_0 = 4$$

$$6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 = 1(3 + b_0) \equiv 6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 + 6b_0 = 3$$

$$a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 = 2(4 + b_0) \equiv a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 + 5b_0 = 1$$

$$6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 = 5(5 + b_0) \equiv 6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 + 2b_0 = 4$$

$$\Rightarrow a_3 = \frac{3}{10} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$a_2 = \frac{7}{10} \equiv 0 \pmod{7}$$

$$a_1 = \frac{-4}{5} \equiv 2 \pmod{7}$$

$$a_0 = 4 \pmod{7}$$

$$b_0 = \frac{-3}{10} \equiv -1 \equiv 6 \pmod{7}$$

$\Rightarrow Q(x) = x^3 + 2x + 4$ and $E(x) = x - 1 \Rightarrow E(1) = 0 \Rightarrow$ packet x_1 at which error occurred

$$\Rightarrow P(x) = R(x) = Q(x) / E(x) = x^2 + x + 3$$

\Rightarrow The corrected value of the error packet is: $P(1) = 5$

c) Error rate is $1/5 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow E(x)$ degree 1 $\Rightarrow E(x) = x + b_0$

$$n + 2k = 5 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow P(x) \text{ degree } (n-1) = 2$$

$$Q(x) = P(x) * E(x) \Rightarrow Q(x) \text{ degree } 3 \Rightarrow Q(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$R(x_1) = R(1) = 5$$

$$R(x_4) = R(4) = 2$$

$$R(x_2) = R(2) = 1$$

$$R(x_5) = R(5) = 5$$

$$R(x_3) = R(3) = 1$$

$$\text{Have: } Q(x) = R(x) * E(x)$$

$$\Rightarrow Q(1) = R(1) * E(1)$$

.....

$$Q(5) = R(5) * E(5)$$

$$\Rightarrow a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 5(1 + b_0) \equiv a_3 + a_2 + a_1 + a_0 + 2b_0 = 5$$

$$a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 1(2 + b_0) \equiv a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 + 6b_0 = 2$$

$$6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 = 1(3 + b_0) \equiv 6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 + 6b_0 = 3$$

$$a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 = 2(4 + b_0) \equiv a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 + 5b_0 = 1$$

$$6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 = 5(5 + b_0) \equiv 6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 + 2b_0 = 4$$

$$\Rightarrow a_3 = \frac{37}{100} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$a_2 = \frac{1}{20} \equiv 6 \pmod{7}$$

$$a_1 = \frac{-3}{4} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$a_0 = \frac{653}{100} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$b_0 = \frac{-3}{5} \equiv -2 \equiv 5 \pmod{7}$$

$\Rightarrow Q(x) = x^3 + 6x^2 + x + 1$ and $E(x) = x - 2 \Rightarrow E(2) = 0 \Rightarrow$ packet x_2 at which error occurred

$$\Rightarrow P(x) = R(x) = Q(x) / E(x) = x^2 + 8x + 17 \equiv x^2 + x + 3$$

\Rightarrow The corrected value of the error packet is: $P(2) = 9 \equiv 2 \pmod{7}$

d) Error rate is $1/5 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow E(x)$ degree 1 $\Rightarrow E(x) = x + b_0$

$n + 2k = 5 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow P(x)$ degree $(n-1) = 2$

$Q(x) = P(x) * E(x) \Rightarrow Q(x)$ degree 3 $\Rightarrow Q(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$

$$R(x_1) = R(1) = 5$$

$$R(x_4) = R(4) = 2$$

$$R(x_2) = R(2) = 2$$

$$R(x_5) = R(5) = 5$$

$$R(x_3) = R(3) = 3$$

$$\text{Have: } Q(x) = R(x) * E(x)$$

$$\Rightarrow Q(1) = R(1) * E(1)$$

.....

$$Q(5) = R(5) * E(5)$$

$$\Rightarrow a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 5(1 + b_0) \equiv a_3 + a_2 + a_1 + a_0 + 2b_0 = 5$$

$$a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 2(2 + b_0) \equiv a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 + 5b_0 = 4$$

$$6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 = 3(3 + b_0) \equiv 6a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 + 4b_0 = 2$$

$$a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 = 2(4 + b_0) \equiv a_3 + 2a_2 + 4a_1 + a_0 + 5b_0 = 1$$

$$6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 = 5(5 + b_0) \equiv 6a_3 + 4a_2 + 5a_1 + a_0 + 2b_0 = 4$$

$$\Rightarrow a_3 = \frac{-3}{25} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$a_2 = \frac{4}{5} \equiv 5 \pmod{7}$$

$$a_1 = \frac{-7}{10} \equiv 0 \pmod{7}$$

$$a_0 = \frac{341}{50} \equiv 5 \pmod{7}$$

$$b_0 = \frac{-9}{10} \equiv -3 \equiv 4 \pmod{7}$$

$\Rightarrow Q(x) = x^3 + 5x^2 + 5$ and $E(x) = x - 3 \Rightarrow E(3) = 0 \Rightarrow$ packet x_3 at which error occurred

$$\Rightarrow P(x) = R(x) = Q(x) / E(x) = x^2 + 8x + 24 \equiv x^2 + x + 3$$

\Rightarrow The corrected value of the error packet is: $P(3) = 15 \equiv 1 \pmod{7}$