

TD07: Estimation Theory

EE21: Random Signal Processing

April 2018

Zhigang SU, Yajuan ZHANG
Sino-European Institute of Aviation Engineering
Civil Aviation University of China

Outline

1 Exercise 1

2 Exercise 2

3 Exercise 3

4 Exercise 4

Problem Description

设有 N 次观测 $z_i = A + \nu_i (i = 1, 2, \dots, N)$, 其中 ν_i 为高斯白噪声且 $\nu_i \sim N(0, \sigma^2)$, 并与 A 统计独立; A 在 $(-A_0, A_0)$ 上服从均匀分布, 证明 A 的最大后验概率估计为:

$$\hat{A}_{map} = \begin{cases} -A_0, & (\bar{z} < -A_0) \\ \bar{z}, & (-A_0 \leq \bar{z} \leq A_0) \\ A_0, & otherwise \end{cases}$$

其中,

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$$

Solution

证明:

$$\begin{aligned}
 f(z_i|A) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z_i-A)^2}{2\sigma^2}} \\
 f(A) &= \begin{cases} \frac{1}{2A_0}, & (-A_0 < -A < A_0) \\ 0, & otherwise \end{cases} \\
 f(A|z) &= \frac{f(z|A)f(A)}{f(z)} \dots\dots\dots (1)
 \end{aligned}$$

求 A 的最大后验概率估计, 即求使得(1)式最大的 A 值作为其估计值。由于 $f(z)$ 与 A 无关, 所以求(1)式的最大值即为求使其分子最大的 A 值。

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

Solution

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

$$\begin{aligned}f(z|A)f(A) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (z_i - A)^2\right\} f(A) \\ \ln\{f(z|A)f(A)\} &= \ln\{f(A)\} - \frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (z_i - A)^2 \\ &= \ln\{f(A)\} - \frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) \\ &\quad - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (z_i^2 - 2Az_i + A^2)\end{aligned}$$

当 $\bar{z} < -A_0$ 时, 取 $\hat{A}_{map} = -A_0$;

当 $\bar{z} > A_0$ 时, 取 $\hat{A}_{map} = A_0$;

Solution

当 $|\bar{z}| \leq A_0$ 时, 即为求使得

$$g(A) = NA^2 - 2A \sum_{i=1}^N (z_i)$$

最小的 A 值, 求导使其导数为0, 则

$$A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i = \bar{z}$$

综合以上,

$$\hat{A}_{map} = \begin{cases} -A_0, & (\bar{z} < -A_0) \\ \bar{z}, & (-A_0 \leq \bar{z} \leq A_0) \\ A_0, & otherwise \end{cases}$$

[Exercise 1](#)[Exercise 2](#)[Exercise 3](#)[Exercise 4](#)

Outline

① Exercise 1

② Exercise 2

③ Exercise 3

④ Exercise 4

TD07: Estimation
Theory

Zhigang SU, Yajuan
ZHANG



Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

Problem Description

从有噪声的观测中估计天线方位角。在观测之前已知角度 s 在 $[-1, 1]$ （单位为 $mrad$ ）上均匀分布，噪声 n_i 是各自独立的且与 s 无关，噪声的分布密度为

$$f(n_i) = \begin{cases} 1 - |n_i|, & (-1 < n_i < 1) \\ 0, & (otherwise) \end{cases}$$

观测样本为 $z_i = s + n_i$ 。

- 1 求单次观测 $z_i = 1.5$ 时的均方估计；
- 2 求单次观测 $z_i = 1.5$ 时的最大后验概率估计。

Solution

(1)

$$\hat{\theta}_{ms} = E[s|z] = \int_{-\infty}^{+\infty} s f(s|z) ds$$

$$f(s|z) = \frac{f(z|s)f(s)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(z|s)f(s)ds}$$

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_{ms} &= E[s|z] \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} s f(z|s)f(s)ds}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(z|s)f(s)ds} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} s(1 - |z - s|)f(s)ds}{\int_{-\infty}^{+\infty} (1 - |z - s|)f(s)ds} \\ &= \frac{\int_{0.5}^1 s(s - 0.5)f(s)ds}{\int_{0.5}^1 (s - 0.5)f(s)ds} = \frac{5}{6}\end{aligned}$$

Solution

(2)

$$f(z; s) = \begin{cases} 1 - |z - s|, & (-1 < z - s < 1) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

由最大后验概率方程，当一次观测 $z_1 = 1.5$ 时，使得最大后验概率方程取最大值的 s 的值为**1**，所以：

$$\hat{s}_{map} = 1$$

Outline

1 Exercise 1

2 Exercise 2

3 Exercise 3

4 Exercise 4

TD07: Estimation
Theory

Zhigang SU, Yajuan
ZHANG



Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

Exercise 3

Problem Description

给定 $z = \frac{s}{2} + n$, n 是均值为零方差为1的高斯随机变量:

- 1 求 s 的最大似然估计 \hat{s}_{ml} ;
- 2 对下列 $f(s)$ 求最大后验估计 \hat{s}_{map} .

$$f(s) = \begin{cases} \frac{1}{4} \exp(-\frac{s}{4}), & (s \geq 0) \\ 0, & (s < 0) \end{cases}$$

Exercise 3

Solution

(1) 首先构建 s 的最大似然函数:

$$f(z; s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(z - \frac{s}{2}\right)^2\right\}$$

则 \hat{s}_{ml} 即为使上式取值最小的 s 值, 所以:

$$\hat{s}_{ml} = 2z$$

Solution

(2) s 的后验概率为:

$$\begin{aligned} f(s|z) &= \frac{f(z|s)f(s)}{f(z)} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(z - \frac{s}{2}\right)^2\right\} \frac{1}{4} \exp\left\{-\frac{s}{4}\right\}}{f(z)} \end{aligned}$$

由于 $f(z)$ 与 s 无关, 所以求上式的极大值, 即为求其分子的最大值。整理其分子得:

$$\frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{8}(s+1-2z)^2 + \frac{1-4z}{8}\right\}$$

求得使上式最大的 s 作为 \hat{s}_{map} , 则:

$$\hat{s}_{map} = \begin{cases} 2z - 1, & (z \geq \frac{1}{2}) \\ 0, & (z < \frac{1}{2}) \end{cases}$$

Outline

1 Exercise 1

2 Exercise 2

3 Exercise 3

4 Exercise 4

TD07: Estimation
Theory

Zhigang SU, Yajuan
ZHANG



Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

Exercise 4

Problem Description

设观测信号 $z_i = A + \nu_i (i = 1, 2, \dots, N)$, 已知 ν_i 是相互独立, 具有相同分布的高斯白噪声, 其均值为 0, 方差为 σ^2 ; 信号 A 也是一零均值方差为 σ_A^2 的高斯信号, 且与噪声统计独立。通过 N 次观测对信号 A 进行估计, 求信号 A 的最小均方估计 \hat{A}_{ms} , 最大后验概率估计 \hat{A}_{map} 和条件中位数估计 \hat{A}_{med} 。

Solution

(1) 先求后验概率密度

$$f(A|z) = \frac{f(z|A)f(A)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(z|A)f(A)dA}$$

$$f(z|A) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (z_i - A)^2\right]$$

$$f(A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_A^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_A^2} \sum_{i=1}^N (A - \mu_A)^2\right]$$

Solution

$$f(z|A)f(A) = K * \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (z_i - A)^2 - \frac{1}{2\sigma_A^2} \sum_{i=1}^N (A - \mu_A)^2\right\}$$

其中, $K = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_A^2}},$

$$f(z|A)f(A) = K \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sigma^2}(NA^2 - 2NA\bar{z}) + \frac{1}{\sigma_A^2}(A - \mu_A)^2\right]\right\}$$

式中, $\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$ 。定义:

$$W(A) = \frac{1}{\sigma^2}(NA^2 - 2NA\bar{z}) + \frac{1}{\sigma_A^2}(A - \mu_A)^2$$

则

$$f(z|A)f(A) = K \exp\left\{-\frac{1}{2}W(A)\right\}$$

Solution

$$\begin{aligned} f(A|z) &= \frac{f(z|A)f(A)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(z|A)f(A)dA} \\ &= \frac{\exp\{-\frac{1}{2}W(A)\}}{\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{-\frac{1}{2}W(A)\}dA} \end{aligned}$$

上式的分母与 A 无关， $W(A)$ 是 A 的二次型，经过配方可得：

$$W(A) = \frac{1}{\sigma_{A|z}^2}(A - \mu_{A|z})^2 - \frac{\mu_{A|z}^2}{\sigma_{A|z}^2} + \frac{\mu_A^2}{\sigma_A^2}$$

其中，

$$\begin{aligned} \sigma_{A|z}^2 &= \left(\frac{N}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_A^2}\right)^{-1} \\ \mu_{A|z} &= \left(\frac{N}{\sigma^2}\bar{z} + \frac{\mu_A}{\sigma_A^2}\right)\sigma_{A|z}^2 \end{aligned}$$

Solution

将 $W(A)$ 带入 $f(A|z)$ 得

$$\begin{aligned} f(A|z) &= \frac{\exp[-\frac{1}{2\sigma_{A|z}^2}(A - \mu_{A|z})^2] \exp[-\frac{1}{2}(\frac{\mu_A^2}{\sigma_A^2} - \frac{\mu_{A|z}^2}{\sigma_{A|z}^2})]}{\int_{-\infty}^{+\infty} \exp[-\frac{1}{2\sigma_{A|z}^2}(A - \mu_{A|z})^2] \exp[-\frac{1}{2}(\frac{\mu_A^2}{\sigma_A^2} - \frac{\mu_{A|z}^2}{\sigma_{A|z}^2})] dA} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{A|z}^2}} \exp\{-\frac{1}{2\sigma_{A|z}^2}(A - \mu_{A|z})^2\} \end{aligned}$$

由上式可以看出，后验概率密度是高斯的。
最小均方估计为被估计量的条件均值，所以

$$\hat{A}_{ms} = \mu_{A|z} = (\frac{N}{\sigma^2}\bar{z} + \frac{\mu_A}{\sigma_A^2})\sigma_{A|z}^2 = \frac{\frac{N}{\sigma^2}\bar{z} + \frac{\mu_A}{\sigma_A^2}}{\frac{N}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_A^2}} = \frac{\sigma_A^2}{\sigma_A^2 + \sigma^2/N}\bar{z}$$

Solution

令

$$k = \frac{\sigma_A^2}{\sigma_A^2 + \sigma^2/N}$$

则:

$$\hat{A}_{ms} = k\bar{z}$$

由于最大后验概率估计是使后验概率密度最大所对应的 A 值且条件中位数是 A 的条件概率密度的中位数, 因此可得

$$\hat{A}_{map} = \hat{A}_{med} = \mu_{A|z} = \hat{A}_{ms}$$

即最大后验概率估计、条件中位数估计和最小均方估计相等。