

用到的公式

haodayizhia

2023 年 6 月 21 日

目录

1	二体问题	1
1.1	核心公式	1
1.2	推导用到的向量公式	1
1.3	角动量 \vec{h} 守恒	2
1.4	近地点方向 \vec{B}	2
1.5	运动轨迹	2
1.6	活力公式	2
1.7	anomaly 转换	2
1.8	Conversion between rv and orbit elements	3

1 二体问题

1.1 核心公式

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r} \quad (1.1)$$

1.2 推导用到的向量公式

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) \quad (1.2)$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \quad (1.3)$$

1.3 角动量 \vec{h} 守恒

$$\vec{h} = \vec{r} \times \dot{\vec{r}} \quad (1.4)$$

1.4 近地点方向 \vec{B}

$$\dot{\vec{r}} \times \vec{h} = \frac{\mu}{r} \vec{r} + \vec{B} \quad (1.5)$$

1.5 运动轨迹

$$r = \frac{h^2/\mu}{1 + B/\mu \cos \theta} \quad (1.6)$$

$$r = \begin{cases} a & e = 0, \text{圆} \\ \frac{p}{1+e \cos \theta} = \frac{a(1-e^2)}{1+e \cos \theta} & 0 < e < 1, \text{椭圆} \\ \frac{p}{1+\cos \theta} & e = 1, \text{抛物线} \\ \frac{p}{1\pm e \cos \theta} = \frac{a(1-e^2)}{1\pm e \cos \theta} & 1 < e, \text{双曲线} \end{cases} \quad (1.7)$$

1.6 活力公式

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a} \quad (1.8)$$

1.7 anomaly 转换

θ : True anomaly(真近点角), E : Eccentric anomaly(偏近点角), M : Mean anomaly(平近点角).

$$a - r = ae \cos E \quad (1.9)$$

$$M = n(t - \tau) = E - e \sin E \quad (1.10)$$

1.8 Conversion between rv and orbit elements

rv to σ

$$\begin{cases} e = \frac{|\dot{\vec{r}} \times \vec{h} - \frac{\mu}{r} \vec{r}|}{\mu} \\ a = \frac{h^2}{\mu(1-e^2)} \\ i = \arccos \frac{\vec{h} \cdot (0,0,1)}{h} \\ \Omega = \arccos \frac{\vec{B} \times \vec{h} \cdot (1,0,0)}{B \cdot h} \end{cases} \quad (1.11)$$

参考文献