数值分析 整理：常微分方程数值解，数值积分，插值法和函数逼近，非线性方程

数值分析 整理：常微分方程数值解，数值积分，插值法和函数逼近，非线性方程
- 常微分方程数值解
  - 差分方法
  - 线性多步法
  - 绝对稳定性和相对稳定性
- 数值积分
  - 代数精度、插值型求积公式
  - Newton-Cotes型公式、复合公式、Romberg算法、Gauss型公式、数值微分和奇异积分
- 插值法与函数逼近
  - 多项式插值、Runge现象与分段低次插值
  - 函数逼近和数据拟合
- 求解非线性方程

常微分方程数值解

差分方法

- Euler单步法 $y_{n+1}=y_n+hf_n$（Taylor展开，或者用左矩公式计算数值积分$y_{n+1}=y_n+\int_{t_n}^{t_n+h}f(s,y(s))\mathrm{d}s$）
- 隐式Euler法 $y_{n+1}=y_n+hf_{n+1}$. 由于f_{n+1}的计算实际上要用到y_{n+1}，所以需要用Picard迭代法求解
- 梯形法 $y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(f_n+f_{n+1})$
- Runge-Kutta法 用数值积分公式推导

  $y_{n+1}=y_n+h\sum_{j=1}^m c_jK_j$

  其中$K_j=f(s_j,y(s_j))$，$y(s_j)$同样用数值积分$y(s_j)=y_n+h\sum_{l=1}^{j-1}b_{jl}K_l$来代替

  最终得到**显式Runge-Kutta形式**：

  $$y_{n+1}=y_n+h\sum_{j=1}^m c_jK_j,\quad K_j=f\left(x_n+a_jh,y_n+h\sum_{l=1}^{j-1}b_{jl}K_l\right)$$

  这里a,b,c系数的确定可以通过Taylor展开待定系数法.

  在$y(s_j)$的数值积分中也可以考虑率所有$s_1,\cdots,s_m$上的插值：$y(s_j)=y_n+h\sum_{l=1}^m b_{jl}K_l$

  此时得到**隐式Runge-Kutta形式**：

  $$y_{n+1}=y_n+h\sum_{j=1}^m c_jK_j,\quad K_j=f\left(x_n+a_jh,y_n+h\sum_{l=1}^{m}b_{jl}K_l\right).$$

  这时K_j需要通过求解方程来确定.
- **差分法的局部截断误差**

  我们考虑单步、显式的差分格式：

  $$y_{n+1}=y_n+h\phi(t_n,y_n;h).$$

  定义**局部截断误差**为：

  $$L(t_n,y(t_n);h):=y(t_{n+1})-[y(t_n)+h\phi(t_n,y(t_n);h)]$$

  它的含义是：如果认为第n步计算出来的函数值是准确的，那么再向后计算一步（得到y_{n+1}）与真实值的误差

  整体截断误差：

  $$\varepsilon_n:=y(t_n)-y_n.$$

  一般来说，整体截断误差很难分析（只能对一些简单的方法，例如Euler法来分析，而且通常需要对f提一些额外要求，例如满足Lipschitz条件等），但是局部截断误差的阶数往往都是可以分析的（Taylor展开即可）
- 适定性：“真解存在唯一”

Picard-Lindelof定理 对于初值问题$y'(t)=f(t,y)$，$y(t_0)=y_0$，如果f关于y满足Lipschitz条件，则初值问题存在唯一解，也成为该问题是适定的

- 相容性：对于一个适定问题，如果$\frac{1}{h}L(t,y(t);h)\to 0$对所有$t$都成立，i.e.：

$$\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(t+h)-f(t)}{h}-\phi(t,y(t);h)\right]=0.$$

  则称该差分格式和原问题是相容的.

  例如，如果$L(t,y(t);h)=O(h^2)$（局部截断误差为2阶），则该差分问题是所谓一阶相容的

  单步法是相容的当且仅当$\lim_{h\to 0}\phi(t,y,h)=f(t,y)$对所有$t$成立（利用$f$的一致连续性，把导数求到数值积分内部再取极限即可证明）

- 收敛性：令$E(h)=\max_{0\le n\le N}|\varepsilon_n|=\max|y(t_n)-y_n|$，若$E(h)\to 0$，则称该单步、显式差分格式是收敛的

  若$\phi(t,y,h)$是连续函数且关于y是Lipschitz的，则该格式是收敛的当且仅当其是相容的（从而把收敛性的分析转化成了对ϕ本身性质的分析）

线性多步法

- 单步法

$$y_{n+1}=y_n+h\phi(t_n,y_n;h).$$

  线性k步法

$$\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j}=h\sum_{j=0}^{k-1}\beta_j f_{n+j}+h\beta_k f_{n+k}$$

  $\beta_k=0$为显式多步法，$\beta_k\neq 0$为隐式多步法

- 线性多步法的局部截断误差：

$$L(t_n,y(t_n);h)=\sum_{j=0}^{k}[\alpha_j y(t_{n+j})-h\beta_j f(t_{n+j},y(t_{n+j}))]$$

- 相容性：

  如果$\frac{1}{h}L(t,y(t);h)\to 0$，则称多步法和原问题相容.

  特别地，设局部截断误差$L(t,y(t);h)=O(h^{p+1})$，则该多步法和原IVP是p阶相容的

  线性多步法是相容的当且仅当$\rho(1)=0$且$\rho'(1)=\sigma(1)$，其中ρ和σ分别是第一和第二特征多项式：

$$\rho(\lambda)=\sum_{j=0}^{k}\alpha_j\lambda^j,\quad \sigma(\lambda)=\sum_{j=0}^{k}\beta_j\lambda^j.$$

  例如在多步法$y_{n+2}-(1+a)y_{n+1}+ay_n=\frac{h}{4}[(3-b)f_{n+2}+(1-3b)f_n]$取$a=0$，$b=1$，则：

$$\rho(\lambda)=\lambda^2-\lambda,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda^2-1).$$

  于是$\rho(1)=0$，$\rho'(1)=1$，但$\sigma(1)=0$，所以该格式不是相容的. 而如果取$a=b=1$，则为：

$$\rho(\lambda)=\lambda^2-2\lambda+1,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda^2-1),$$

  此时$\rho(1)=0$，$\rho'(1)=0$，$\sigma(1)=0$，此时相容.

- 多步法对**初值的稳定性**：

  定义：称多步法对初值是稳定的，如果存在常数C、h_0，对任何$\varepsilon>0$，只要$h<h_0$，如果两组初值$\{u_j\}_{j=0}^{k-1}$和$\{v_j\}_{j=0}^{k-1}$满足$\max_{0\le j\le k-1}|u_j-v_j|<\varepsilon$，则对于这两组初值算出来的解$\{u_n\}_{n=0}^{N}$和$\{v_n\}_{n=0}^{N}$满足必然有：

$$\max_{nh\le T}|u_n-v_n|\le C\max_{0\le j\le k-1}|u_j-v_j|.$$

  对于单步法$y_{n+1}=y_n+h\phi(t_n,y_n;h)$，如果$\phi$关于$y$满足Lipschitz条件，则单步法一定是稳定的

  多步法对初值稳定当且仅当$\rho(\lambda)$的所有根都在闭单位圆盘中，而且单位圆周上的所有根都是单根

  仍然举上面的例子，取$a=b=1$，则$\rho(\lambda)$有二重根1，所以对初值不稳定.

绝对稳定性和相对稳定性

- Setting：要估计舍入误差的影响. 对于多步法取一个模型问题$f=\mu y$（即线性增长），则要想保证误差有界，必须满足：

$$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=0$$

  的根模都小于1（这里的$\overline{h}=\mu h$）
- 绝对稳定：$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=0$**的根都在单位（开）圆盘内**，则多步法对于$\overline{h}$绝对稳定（必要条件：本身指数衰减，即$\mathrm{Re}\mu<0$）

  仍然举上面的例子：

$$\rho(\lambda)=\lambda^2-\lambda,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda^2-1)$$

  为了简单起见，我们只考虑$\mu\in\mathbb{R}$的情形，此时：

$$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=(1-\overline{h}/2)\lambda^2-\lambda+\overline{h}/2=0$$

  可见两个根分别是1和$\frac{\overline{h}}{2-\overline{h}}$，注意恒有一个根不在单位开圆盘内，所以对于所有$\mu\in\mathbb{R}$，该方法对$\overline{h}$都不是绝对稳定的！
- 相对稳定：$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=0$**的模最大根**$\lambda_1$**满足**$\lambda_1=e^{\overline{h}}+O(h^{p+1})$**，且其他根**$\lambda_j$**满足**$|\lambda_j|<|\lambda_1|$，则是相对稳定的.

  对于上面的例子：

$$\rho(\lambda)=(\lambda-1)^2,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda-1)(\lambda+1)$$

  此时：

$$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=(\lambda-1)\left(\lambda-1-\frac{\overline{h}}{2}\lambda-\frac{\overline{h}}{2}\right)=0$$

  的两个根分别是1和$\frac{1+\overline{h}/2}{1-\overline{h}/2}$. 其中$\frac{1+\overline{h}/2}{1-\overline{h}/2}=1+\overline{h}+O(\overline{h}^2)=e^{\overline{h}}+O(\overline{h}^2)$.

  另一方面，

$$\left|\frac{1+\overline{h}/2}{1-\overline{h}/2}\right|=\sqrt{1+\frac{\mathrm{Re}\overline{h}}{|1-\overline{h}/2|^2}},$$

  如果$\mathrm{Re}\overline{h}>0$，则$\lambda_1$满足$\lambda_1=e^{\overline{h}}+O(\overline{h}^2)$且$|\lambda_1|>|\lambda_2|=1$，为相对稳定的；

  如果$\mathrm{Re}\overline{h}<0$，则$\lambda_1=1=e^{\overline{h}}+O(\overline{h})$，且$|\lambda_2|=\sqrt{1+\frac{\mathrm{Re}\overline{h}}{|1-\overline{h}/2|^2}}<1=|\lambda_1|=1$，也是相对稳定的，因此相对稳定域就是整个复平面（无条件相对稳定）.

数值积分

代数精度、插值型求积公式

- 求积公式：$\int_a^b\rho(x)f(x)\mathrm{d}x\approx\sum_{i=0}^n A_if(x_i)$，$\{x_i\}\subset[a,b]$是求积节点

  定义误差$E_n(f)=\int_a^b\rho(x)f(x)\mathrm{d}x-\sum_{i=0}^n A_if(x_i)$
- 代数精度：如果$E_n(x^m)=0$对$m=0,\cdots,M$都成立，则称求积公式至少具有M阶代数精度。如果$E_n(x^{M+1})\neq 0$，则代数精度为M
- 插值型求积公式：对于f以及求积节点$\{x_i\}_{i=0}^n$，考虑Lagrange插值多项式：

$$L_n(x)=\sum_{i=0}^n f(x_i)l_i(x),\quad l_i(x)=\prod_{i\neq j=0}^n\frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}.$$

  （注意$l_i(x_j)=\delta_{ij}$）

  则求积公式为：

$$\int_a^b\rho(x)f(x)\mathrm{d}x\approx\int_a^b\rho(x)L_n(x)\mathrm{d}x=\sum_{i=0}^n A_if(x_i),\quad \text{其中}A_i=\int_a^b\rho(x)l_i(x)\mathrm{d}x$$

  误差公式为：

$$E_n(f)=\int_a^b \rho(x)R_n(x)\mathrm{d}x,\quad \text{其中}R_n(x)=f(x)-L_n(x)=f[x,x_0,\cdots,x_n]\omega_{n+1}(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

很显然，当f是次数不超过n的多项式，那么$R_n(x)\equiv 0$，此时$E_n(f)=0$，插值积分准确，因此插值型的求积公式至少具有n阶代数精度

- **【命题】如果求积公式$\int_a^b \rho(x)f(x)\mathrm{d}x\approx\sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$至少具有$n$阶代数精度，则它必然是插值型的**

  【证明】分别计算$E_n(l_i)$即可

- 收敛性：记步长$h=\max_{1\le k\le n}(x_k-x_{k-1})$，如果有$\lim_{h\to 0}\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)=\int_a^b \rho(x)f(x)\mathrm{d}x$
- 稳定性：如果$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得$\max_k\left|f(x_k)-\widehat{f_k}\right|\le\delta$时（节点处的函数值误差），有$\left|I_n(f)-\widehat{I_n}(f)\right|\le\varepsilon$，则称该求积公式是稳定的
- 相容性：如果公式对$f\equiv 1$是准确成立的，则称其是相容的（可以认为具有0阶代数精度），也就是：

$$\int_a^b \rho(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^n A_k.$$

- **【命题】如果公式是相容的，而且每个$A_k>0$，则它必是稳定的**

  【证明】直接计算，然后利用$A_k>0$去掉绝对值

Newton-Cotes型公式、复合公式、Romberg算法、Gauss型公式、数值微分和奇异积分

- Newton-Cotes型公式：用等距节点构造的插值积分公式

  $n=1$：梯形公式：

$$I_1(f)=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$$

  $n=2$：Simpson公式：

$$I_2(f)=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$$

- 【命题】n阶Newton-Cotes型公式至少具有n阶代数精度，如果n是偶数，则代数精度为$n+1$

  【证明】对Simpson（$n=2$）进行推导，更高阶的格式完全类似：

  令：

$$\begin{aligned}
q(x)&=\int_a^x \omega_3(x)\mathrm{d}x=\frac{(x-a)^2(x-b)^2}{4},\\
E_2(f)&=\int_a^b f[x,x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\mathrm{d}x\\
&=\int_a^b f[x,x_0,x_1,x_2]q'(x)\mathrm{d}x\\
&=f[x,x_0,x_1,x_2]q(x)|_a^b-\int_a^b q(x)f[x,x,x_0,x_1,x_2]\mathrm{d}x\\
&=-\int_a^b q(x)f[x,x,x_0,x_1,x_2]\mathrm{d}x\\
&=(\text{积分中值定理})f[\eta,\eta,x_0,x_1,x_2]\int_a^b q(x)\mathrm{d}x\\
&=-\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi).
\end{aligned}$$

- 复合公式：采用分段低次插值来近似计算积分
  - 复合梯形公式

$$\begin{aligned}
I(f)&=\sum_{j=1}^n\int_{x_j-1}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x\approx\sum_{j=1}^n\frac{h}{2}[f(x_{j-1})+f(x_j)]\\
&=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_j)\right]\equiv T_n
\end{aligned}$$

    【命题】复合梯形公式是稳定的. 求积系数>0

    【命题】复合梯形公式是二阶收敛的

FACT：对于梯形公式，有误差估计式：

$$
\begin{aligned}
E_1(f) &= \int_a^b f[x,a,b](x-a)(x-b)\mathrm{d}x = f[\eta,a,b]\int_a^b (x-a)(x-b)\mathrm{d}x \\
&= \frac{f^{(2)}(\xi)}{2!}(-(b-a)^3/6) = -\frac{(b-a)^3}{12}f^{(2)}(\xi).
\end{aligned}
$$

$$
\int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = \frac{h}{2}[f(x_{j-1})+f(x_j)] - \frac{h^3}{12}f''(\xi_j), \quad \xi_j \in (x_{j-1},x_j)
$$

$$
\Rightarrow I(f) = \sum_{j=1}^n \int_{x_j-1}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = T_n - \frac{h^3}{12}\sum_{j=1}^n f''(\xi_j),
$$

其中

$$
\left|\frac{h^3}{12}\sum_{j=1}^n f''(\xi_j)\right| \le \frac{1}{12}h^3 n\|f''\|_\infty = \frac{b-a}{12}h^2\|f''\|_\infty.
$$

缩小步长的复合梯形公式：

$$
T_{2n} = \frac{1}{2}(T_n+H_n), \quad H_n = \frac{h}{2}\sum_{i=1}^n f(x_{i-\frac{1}{2}}), \quad x_{i-\frac{1}{2}} = x_i - \frac{1}{2}h = a+(i-1/2)h.
$$

- 复合Simpson公式：

$$
S_n = \frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}H_n.
$$

【命题】复合Simpson公式是四阶收敛的

FACT：对于Simpson公式，$E_2(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi)$，$\xi \in (a,b)$

$$
\int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = \frac{h}{6}[f(x_{j-1})+4f(x_{j-1/2})+f(x_j)] - \frac{h^5}{2880}f^{(4)}(\xi_j),
$$

$$
\Rightarrow I(f) = \sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = S_n - \frac{h^5}{2880}\sum_{j=1}^n f^{(4)}(\xi_j),
$$

$$
\Rightarrow \left|\frac{h^5}{2880}\sum_{j=1}^n f^{(4)}(\xi_j)\right| \le \frac{h^4}{2880}\left\|f^{(4)}\right\|_\infty.
$$

- 复合Hermite公式：

  Hermite插值积分：

$$
\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)] + \frac{(b-a)^2}{12}[f'(a)-f'(b)] + E(f)
$$

  这里：

$$
E_n = \int_a^b R_n(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f[a,a,b,b,x](x-a)^2(x-b)^2\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^5}{720}f^{(4)}(\eta).
$$

  如果用复合公式：

$$
U_n = \frac{h}{2}[f(a)+f(b)+\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)] + \frac{h^2}{12}[f'(a)-f'(b)]
$$

  Rmk：复合Hermite公式只比复合梯形公式T_n多了两端点的导数项，精度却直接提高到了四阶

- Gauss型公式：不采用等距节点，而是采用最优化的节点选择，使得代数精度尽可能高
  - 误差项：

$$
E_n(f) = I(f) - I_n(f) = (f[x,x_0,\cdots,x_n],\omega_{n+1})_\rho
$$

  其中$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x-x_i)$。

  假设f是M次多项式，则$f[x,x_0,\cdots,x_n]$是次数为$M-(n+1)$的多项式，即$f[x,x_0,\cdots,x_n] \in \mathcal{P}^{M-n-1}$.

  如果选择x_i是$n+1$次正交多项式（相对于ρ）的零点，则$\omega_{n+1}(x)$是$n+1$次正交多项式，满足：

$$
\omega_{n+1} \perp_\rho \mathcal{P}^n
$$

令$M-n-1=n$解得$M=2n+1$，所以这时候对于$f\in\mathcal{P}^{2n+1}$，我们都有$E_n(f)=0$!

Slogan：选择节点为$n+1$次正交多项式的零点，可得至少$2n+1$阶代数精度

- 固定节点Gauss型公式：变更权函数

  如果$n+1$个节点中共有m个固定节点，则有$n-m+1$个可调整节点，选择其为次数$n-m+1$正交多项式的零点，则可得$n+1+n-m=2n+1-m$阶代数精度，例如下面的例题，3个节点中固定1个节点，可得$2\times 2+1-1=4$阶代数精度

  【例题】请确定以下求积公式：

$$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x \approx A_1 f(x_1)+A_2 f(x_2)+A_3 f(1),$$

  中的参数A_1,A_2,A_3,x_1,x_2，使得其具有尽可能高的代数精度，并给出代数精度和求积余项公式.

  【解答】

  因为要求求积公式有尽可能高的代数精度，因此是插值型的求积公式. 计算积分余项可得：

$$E(f)=\int_0^1 x^2[f(x)-L(x)]\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2 f[x,x_1,x_2,1](x-1)(x-x_1)(x-x_2)\rho(x)\mathrm{d}x.$$

  定义$\rho(x)=x^2(x-1)$，则：

$$E(f)=\int_0^1 f[x,x_1,x_2,1](x-x_1)(x-x_2)\rho(x)\mathrm{d}x=(f[x,x_1,x_2,1],(x-x_1)(x-x_2))_\rho.$$

  若f是次数为M的多项式，则均差$f[x,x_1,x_2,1]$为次数是$M-3$的多项式. 如果我们选择x_1,x_2为$[0,1]$上关于带权内积$(\cdot,\cdot)_\rho$的正交多项式的零点，则根据正交多项式的性质可知，当$M-3\le 1$，即$M\le 4$时，$(x-x_1)(x-x_2)\perp f[x,x_1,x_2,1]$，即$E(f)=0$. 也即此时该求积公式有4**阶代数精度.**

  下面计算$[0,1]$上的二次正交多项式. 注意到：

$$(x,1)_\rho=\int_0^1 x^3(x-1)\mathrm{d}x=-\frac{1}{20},\quad (x,x)_\rho=\int_0^1 x^4(x-1)\mathrm{d}x=-\frac{1}{30},\quad (1,1)_\rho=\int_0^1 x^2(x-1)\mathrm{d}x=-\frac{1}{12},$$

$$(x^2,x)_\rho=\int_0^1 x^5(x-1)\mathrm{d}x=-\frac{1}{42},\quad (x^2,1)_\rho=\int_0^1 x^4(x-1)\mathrm{d}x=-\frac{1}{30},$$

$$p_1(x)=x-\frac{(x,1)_\rho}{(1,1)_\rho}=x-\frac{3}{5},$$

$$(x^2,p_1)_\rho=(x^2,x)_\rho-\frac{3}{5}\cdot(x^2,1)=-\frac{2}{525},\quad (p_1,p_1)_\rho=-\frac{1}{300}$$

  所以

$$p_2(x)=x^2-\frac{(x^2,p_1)_\rho}{(p_1,p_1)_\rho}p_1-\frac{(x^2,1)_\rho}{(1,1)_\rho}=x^2-\frac{8}{7}x+\frac{2}{7}.$$

  解方程$p_2(x)=0$可得$x_1=\frac{4-\sqrt{2}}{7}$，$x_2=\frac{4+\sqrt{2}}{7}$.

  所以求积系数

$$A_1=\int_0^1 x^2\frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}\mathrm{d}x=\frac{1}{240}[32-13\sqrt{2}],$$

$$A_2=\int_0^1 x^2\frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}\mathrm{d}x=\frac{1}{240}[32+13\sqrt{2}],$$

$$A_3=\int_0^1 x^2\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{15}.$$

  积分余项表达式即为：

$$E(f)=\int_0^1 f[x,x_1,x_2,1](x-x_1)(x-x_2)\rho(x)\mathrm{d}x=(f[x,x_1,x_2,1],(x-x_1)(x-x_2))_\rho.$$

- Gauss 求积公式的求积系数 A_k 总是大于零.

  【证明】计算$E_n(l_j(x)^2)=0$可得$0<I(l_j(x)^2)=A_j$.

  【推论】Gauss 求积公式总是稳定的

- Gauss 求积公式满足$\lim_{n\to\infty} I_n(f)=I(f)$

  【证明】Weierstrass引理

- 数值微分

$$f(x_{k+1}) = f(x_{k-1}) + \int_{x_{k-1}}^{x_{k+1}} f'(x)\mathrm{d}x$$

用数值积分公式：

$$f_{k+1} = f_{k-1} + \frac{h}{3}(\varphi_{k-1} + 4\varphi_k + \varphi_{k+1}) \Rightarrow \varphi_{k-1} + 4\varphi_k + \varphi_{k+1} = 6f[x_{k-1}, x_{k+1}].$$

φ_0和φ_n可以用两点或三点格式计算，然后求解三对角方程组

- 奇异积分
  - 区间截断、变量替换
  - 奇点分离

$$\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} + \int_0^1 \frac{\cos x - 1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = 2 + \int_0^1 \frac{\cos x - 1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$$

  - Gauss型求积公式（将奇异部分放在权函数中考虑）

插值法与函数逼近

多项式插值、Runge现象与分段低次插值

- Lagrange插值基函数$l_k(x) = \prod_{i=0, i\neq k}^{n} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$，满足$l_k(x_m) = \delta_{km}$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i l_i(x).$$

- 均差

  $f[x_j] = f(x_j)$，$f[x_j, x_{j+1}, \cdots, x_{j+k}] := \frac{f[x_{j+1}, \cdots, x_{j+k}] - f[x_j, \cdots, x_{j+k-1}]}{x_{j+k} - x_j}$.

  性质：
  - $f[x_j, \cdots, x_{j+k}] = \sum_{\ell=j}^{j+k} \frac{f(x_\ell)}{\omega'_{jk}(x_\ell)}$

    其中$\omega_{jk}(x) = \prod_{m=j}^{j+k}(x - x_m)$
  - $f[x_{\sigma(j)}, \cdots, x_{\sigma(j+k)}] = f[x_j, \cdots, x_k]$（对称性）
  - $f[x, x_0, \cdots, x_k]$是x的m次多项式$\Rightarrow f[x, x_0, \cdots, x_{k+1}]$是$x$的$m+1$次多项式
  - 如果$f \in C^n[a, b]$，而且x_0，$\cdots$，x_n为$[a, b]$上互异的$n+1$个点，则存在$\xi \in (\min x_i, \max x_i)$，使得：$f[x_0, \cdots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$

- Newton型插值公式：

$$p_n^N(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, \cdots, x_n]\prod_{j=0}^{n-1}(x - x_j)$$

  可以证明$L_n(x) = p_n^N(x)$

- 插值余项估计：

$$R_n(f)(x) = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

- Hermite型插值公式

  Hermite插值基函数：$\alpha_j(x) = (1 + 2l'_j(x_j)(x_j - x))l_j^2(x)$；$\beta_j(x) = (x - x_j)l_j^2(x)$

  满足的条件是：$\alpha_j(x_k) = \delta_{jk}$，$\alpha'_j(x_k) = 0$，$\beta_j(x_k) = 0$，$\beta_j(x_k)' = \delta_{jk}$

- 重节点的均差：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f[x, x_0, \cdots, x_n] = f[x, x, x_0, \cdots, x_n]$（可用于构造Newton型的一般Hermite插值）

- **一般Hermite插值（密切插值法）**

  把导数看成重节点的误差，有Newton型插值多项式：

  $p^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$，$k = 0, 1, 2$，$p(x_1) = f(x_1)$，$p(x_2) = f(x_2)$，$p'(x_2) = f'(x_2)$

$$\begin{aligned} p_5(x) = {} & f[x_0] + f[x_0, x_0](x - x_0) + f[x_0, x_0, x_0](x - x_0)^2 + f[x_0, x_0, x_0, x_1](x - x_0)^3 \\ & + f[x_0, x_0, x_0, x_1, x_2](x - x_0)^3(x - x_1) + f[x_0, x_0, x_0, x_1, x_2, x_2](x - x_0)^3(x - x_1)(x - x_2) \\ & + f[x_0, x_0, x_0, x_1, x_2, x_2](x - x_0)^3(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

$R_5(x)=f(x)-p_5(x)=f[x,x_0,x_0,x_0,x_1,x_2,x_2](x-x_0)^3(x-x_1)(x-x_2)^2$

【例题】函数$f(x)$在点$x_0=0$，$x_1=1$上的值分别是$f(x_0)=0$，$f(x_1)=1$，以及在x_1点处的导数值为$f'(x_1)=0$，二阶导数值$f''(x_1)=1$.

可用待定系数法求出一个三次多项式$P_3(x)$，满足：

$$\begin{cases}P_3(x_i)=f(x_i), & i=0,1\\ P_3'(x_1)=f'(x_1), & P_3''(x_1)=f''(x_1).\end{cases}$$

其插值余项表达式为：

$$R_3(x)=f(x)-P_3(x)=f[x,0,1,1,1]x(x-1)^3$$

- 分段低次插值
  - 分段线性插值基函数（帽子函数）：

$$\phi_0(x)=\begin{cases}0, & x_1\le x;\\ \frac{x-x_1}{x_0-x_1}, & x_0\le x\le x_1;\end{cases}\quad \phi_n(x)=\begin{cases}0, & x\le x_{n-1};\\ \frac{x-x_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}, & x_{n-1}\le x\le x_n;\end{cases}$$

$$\phi_j(x)=\begin{cases}0, & x\le x_{j-1}\text{ or }x\ge x_{j-1};\\ \frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}, & x_{j-1}\le x\le x_j;\\ \frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}, & x_j\le x\le x_{j+1};\end{cases}\quad j=1,2,\cdots,n-1.$$

    性质：$\sum_{j=0}^n\phi_j(x)=\mathbb{1}_{[a,b]}$

    由这些基函数的线性组合可以构造出在每个$[x_k,x_{k+1}]$上的限制都是线性函数的函数（分段线性插值函数）：

$$I_h(x)=\sum_{j=0}^n f_j\phi_j(x)$$

    【收敛性】$f\in C[a,b]$，当$h=\max h_i=\max(x_i-x_{i-1})\to 0$时，$I_h$一致收敛到$f$

    【证明】当$x\in[x_{k-1},x_k]$时，根据$1=\phi_{k-1}(x)+\phi_k(x)$可得

    $|f(x)-I_h(x)|=|[f(x)-f(x_{k-1})]\phi_{k-1}(x)+[f(x)-f(x_k)]\phi_k(x)|\le\phi_{k-1}(x)\omega(f;h_k)+\phi_k(x)\omega(f;h_k)\le\omega(f;h)$,

    对所有$x\in[a,b]$都成立，所以$\|f-I_h\|_\infty\le\omega(f;h)\to 0$

    （连续模的定义：$\omega(f;h)=\sup_{|t|\le h,x,x+t\in[a,b]}|f(x+t)-f(x)|$

  - 分段Hermite插值基函数：相当于在每个小区间上做三次Hermite插值（用到端点的函数值和端点的导数值），也就是：

$$I_h|_{[x_k,x_{k+1}]}=f_k\alpha_k+f_{k+1}\alpha_{k+1}+m_k\beta_k+m_{k+1}\beta_{k+1}.$$

    其中$f_j=f(x_j)$，$m_j=f'(x_j)$

    由此可知α_j和β_j都是帽子函数的形式，例如α_j只在$[x_{j-1},x_j]$和$[x_j,x_{j+1}]$上不得0，表达式为：

$$\alpha_j|_{[x_{j-1},x_j]}=(1+2(x_j-x)l_j'(x))l_j^2(x)=\left(1+\frac{2(x_j-x)}{x_j-x_{j-1}}\right)\left(\frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}\right)^2,$$
$$\alpha_j|_{[x_j,x_{j+1}]}(1+2(x_j-x)l_j'(x))l_j^2(x)=\left(1+\frac{2(x_j-x)}{x_j-x_{j+1}}\right)\left(\frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}\right)^2,$$

    这样：

$$I_h(x)=\sum_{j=0}^n[f_j\alpha_j(x)+m_j\beta_j(x)].$$

  - 分段样条插值

    以三次为例：共有n个小区间，每个小区间上确定4个自由度，有$4n$自由度

    约束条件：每个节点处满足插值条件——$n+1$限制；每个内部节点处要求二阶连续可微，也就是函数值、一阶导、二阶导都要相等，$3(n-1)$限制

    还剩下$4n-n-1-3n+3=2$个自由度，因此还需要两个边界条件. 可以选择：

    - I型边界条件（端点一阶导数）
    - II型边界条件（端点二阶导数）
    - 周期边界条件（一阶导、二阶导分别相等）

    求解方法：由于三次样条是分段三次多项式，根据前面求出的线性空间：

$$\mathfrak{S}=\{\sum_{j=0}^{n}[f_j\alpha_j+m_j\beta_j]:f_j\in\mathbb{R},m_j\in\mathbb{R}\}$$

由插值条件可以给出f_j，如何求出m_j？要用到二阶连续可微性. 回忆基函数支集性质：

$$S|_{[x_k,x_{k+1}]}=f_k\alpha_k+f_{k+1}\alpha_{k+1}+m_k\beta_k+m_{k+1}\beta_{k+1}.$$

代入二阶导数连续性条件+边界条件可得——转角方程

代入一阶导数连续性条件+边界条件可得——三弯矩方程

函数逼近和数据拟合

- 最佳一致逼近
  - 定义：称

$$p_n^*=\mathrm{argmin}_{p_n\in\mathcal{P}_n}\Delta(f,p_n).$$

其中

$$\Delta(f,p_n):=\|f-p_n\|_\infty$$

为f在$[a,b]$上的最佳一致逼近n次多项式

（存在性由$\mathbb{R}^{n+1}$中闭球的紧性保证）

  - Tchebyshev定理：$p^*\in\mathcal{P}_n$，则p^*是最佳一致逼近当且仅当它“至少”有$n+2$个轮流为正负的偏差点

推论——必要条件：若为最佳一致逼近，则必然同时有正的和负的偏差点

推论——存在唯一性：最佳一致逼近多项式是唯一的

（如果不唯一，考虑$\frac{p+q}{2}$，则通过计算可得必有$p(x_k)=q(x_k)$对所有偏差点都成立，因此$p-q$有$n+2$个不同的零点，所以$p=q$）

【例题】设$f\in C[-a,a]$，$p_n(x)\in\mathcal{P}_n$是f的最佳一致逼近多项式，证明当f是偶（奇）函数时，p_n也是偶（奇）函数.

【证明】考虑$q(x)=\frac{1}{2}(p(x)+p(-x))$，则对任何$x\in[-a,a]$我们有：

$$|f(x)-q(x)|=\left|\frac{f(x)+f(-x)}{2}-\frac{p(x)+p(-x)}{2}\right|\le\sup_{x\in[-a,a]}\left|\frac{f(x)-p(x)}{2}\right|+\sup\left|\frac{f(-x)-p(-x)}{2}\right|\le\|f-p\|_\infty$$

所以q也是f的最佳一致逼近多项式，根据最佳一直逼近多项式的唯一性可知$p=q$，因此p是偶函数.

对于奇函数，考虑$q(x)=\frac{1}{2}(p(x)-p(-x))$即可.

- 最佳平方逼近
  - 最佳平方逼近存在唯一。事实上，我们需要求解的是：

$$f^*=P_{\mathfrak{S}_n}f=\mathrm{argmin}_{g\in\mathfrak{S}_n}\|f-g\|_2$$

其中二范数由带权内积$(\cdot,\cdot)_\rho$诱导

根据Hilbert空间$L_\rho^2[a,b]$中的投影定理可知，这等价于求解法方程：

$$(f-f^*,\varphi_k)_\rho=0,\quad\text{i.e.}\quad(f,\varphi_k)=\sum_{\ell=1}^{n}a_\ell(\varphi_\ell,\varphi_k)=\sum_{\ell=1}^{n}a_\ell(\varphi_k,\varphi_\ell),\quad\forall k$$

写成矩阵方程的形式为

$$\mathbf{G}\mathbf{a}^*=\mathbf{f}.$$

其中$\mathbf{G}$是Gram矩阵，如果使用正交多项式，则$\mathbf{G}$是对角矩阵！

  - 正交多项式：由$(1,x,x^2,\cdots)$经过G-S正交化得到的一组向量

基本性质：

    - $\{\varphi_j\}_{j=0}^n$是$\mathcal{P}_n$一组基
    - $\varphi_n\perp\mathcal{P}_{n-1}$
    - 令$\varphi_{-1}(x)\equiv0$，则有递推关系：

$$\varphi_{n+1}(x)=(\alpha_nx+\beta_n)\varphi_n(x)+\gamma_{n-1}\varphi_{n-1}(x).$$

其中$\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$是一些常数，可以通过做内积确定（可以用来推导一些递推关系）

- j次正交多项式必然恰好有j个单根
- Christoffel-Darboux恒等式：

  $\{\varphi_j\}_{j=0}^{\infty}$正交多项式，$a_n$为$\varphi_n$首项系数，$(\varphi_j, \varphi_k) = \delta_{jk}$（标准正交），令$\alpha_n = a_{n+1}/a_n$，则：

$$(x-y)\sum_{k=0}^{n}\varphi_k(x)\varphi_k(y) = \frac{1}{\alpha_n}[\varphi_{n+1}(x)\varphi_n(y) - \varphi_{n+1}(y)\varphi_n(x)]$$

- Legendre多项式：$[-1,1]$上关于权函数1的正交多项式

  Tchebyshev多项式：$[-1,1]$上关于权函数$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$的正交多项式

  Laguerre多项式：$[0,+\infty)$上关于权函数e^{-x}的正交多项式

  Hermite多项式：$(-\infty,+\infty)$上关于e^{-x^2}的正交多项式

- 广义Fourier级数
  - Fourier级数，Bessel不等式，Parseval等式
  - 【定理】首项系数为1的Legendre多项式是所有n次首1多项式中二范数最小的

    【证明】任取$q_n(x) = x^n + q_{n-1}(x) \in \mathcal{P}_n$是首一多项式，可以重新写成$q_n(x) = p_n(x) + \tilde{q}_{n-1}(x)$，其中$p_n(x)$是$n$次首一Legendre多项式，$\tilde{q}_{n-1} = x^n - p_n + q_{n-1} \in \mathcal{P}_{n-1}$，根据$p_n \perp \mathcal{P}_{n-1}$可知$\|q_n\| \geq \|p_n\|$.
  - 插值余项最小化：由于带权二范数意义下用截断Tchebyshev级数可以近似对函数**一致逼近**，所以选择差值节点为Tchebyshev多项式的零点时，可以使$\|\omega\|_\infty$近似最小
- 有理逼近

$$R_{nm}(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{\sum_{k=0}^{n} a_k x^k}{\sum_{k=0}^{m} b_k x^k}$$

计算方法：

例题：

写出 $f(x) = \log(1+x)$ 在零点附近的 Taylor 展式：

$$f(x) = -\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-x)^k}{k},$$

所以：

$$c_0 = 0, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = -\frac{1}{2}, \quad c_3 = \frac{1}{3},$$
$$c_4 = -\frac{1}{4}, \quad c_5 = \frac{1}{5}, \quad c_6 = -\frac{1}{6},$$

求解 $(3,3)$Pade 逼近，也就是要求解线性方程组 $H\mathbf{b} = \mathbf{c}$，其中：

$$H = \begin{pmatrix} c_3 & c_2 & c_1 \\ c_4 & c_3 & c_2 \\ c_5 & c_4 & c_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = -\begin{pmatrix} c_4 \\ c_5 \\ c_6 \end{pmatrix}.$$

解得：

$$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ \frac{3}{5}\\ \frac{1}{20}\end{pmatrix}.$$

所以：

$$a_0=c_0=0,$$

$$a_1=c_1=1,$$

$$a_2=c_2+\sum_{j=0}^{1}c_jb_{2-j}=c_2+c_0b_2+c_1b_1=1,$$

$$a_3=c_3+\sum_{j=0}^{2}c_jb_{3-j}=c_3+c_0b_3+c_1b_2+c_2b_1=\frac{11}{60}.$$

根据定义，$(3,3)$Pade 逼近的表达式为：

$$R_{33}(x)=\frac{\sum_{k=0}^{3}a_kx^k}{\sum_{k=0}^{3}b_kx^k}=\frac{0+x+x^2+\frac{11}{60}x^3}{1+\frac{3}{2}x+\frac{3}{5}x^2+\frac{1}{20}x^3}=\frac{11x^3+60x^2+60x}{3x^3+36x^2+90x+60}.$$

- 最小二乘法：求解正则方程$A^TAx=b$
- 周期函数的最佳平方逼近：Fourier展开

  离散情形：离散Fourier变换和快速Fourier变换

  - $\{e^{2\pi inx}\}$是$\mathcal{C}[0,1]$上的标准正交向量组
  - 离散化：$\mathcal{C}[0,1]\sim S=\{\frac{0}{n},\cdots,\frac{n-1}{n}\}$.
  - $\mathbb{C}^S\simeq\mathbb{C}^n$.
  - 离散内积：$\langle f,g\rangle=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\overline{f(\frac{k}{n})}g(\frac{k}{n})$，其中$f,g\in\mathbb{C}^S$.
  - 离散指数函数：$e^{2\pi inx}\sim e^{2\pi i\frac{k}{n}}$，记$n$次本源单位根$\omega_n=e^{\frac{2\pi i}{n}}$，则满足

    $\omega_n^n=1,\omega_n^k\neq1,\forall k=0,1,2,\cdots,n-1.$

    这时候$e^{2\pi i\frac{k}{n}}$看成是$\mathbb{C}^S$中的向量，它等同于$\left(1,\omega_n^k,\omega_n^{2k},\cdots,\omega_n^{(n-1)k}\right)^T$.

    Fourier矩阵$\mathcal{F}_n=\begin{pmatrix}1&1&1&1&\cdots&1\\1&\omega&\omega^2&\omega^3&\cdots&\omega^{n-1}\\1&\omega^2&\omega^4&\omega^6&\cdots&\omega^{2(n-1)}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&\omega^{n-1}&\omega^{2(n-1)}&\omega^{3(n-1)}&\cdots&\omega^{(n-1)^2}\end{pmatrix}$

    $\mathcal{F}_n$尚非单位正交，而是满足$\overline{\mathcal{F}}_n^T\mathcal{F}_n=n\mathrm{I}_n$.
  - 离散Fourier变换（DFT）

    $f=\hat{f}(0)\mathbf{e}_0+\cdots+\hat{f}(n-1)\mathbf{e}_{n-1}$，$f\in\mathbb{C}^S$.

    因为$\hat{f}(k)=\langle\mathbf{e}_k,f\rangle_{\mathbb{C}^S}=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\overline{\omega_n^{jk}}f_j$

    $$\begin{pmatrix}\hat{f}(0)\\ \vdots\\ \hat{f}(n-1)\end{pmatrix}=\frac{1}{n}\overline{\mathcal{F}}_n\begin{pmatrix}f(0)\\ \vdots\\ f(n-1)\end{pmatrix}$$
  - 快速Fourier变换（FFT）

    DFT：$\mathcal{O}(n^2)$.

    FFT：考虑矩阵分解，时间复杂度为$\mathcal{O}(n\log n)$.

求解非线性方程

- 二分迭代法
- 不动点迭代法：

  【定理】

  压缩映射：设$\varphi:D\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，如果存在$C\in(0,1)$使得$\forall x,y\in D$都有$\|\varphi(x)-\varphi(y)\|\leq C\|x-y\|$，则称$\varphi$为压缩映射

如果φ在闭集D上是压缩映射，且$\varphi(D)\subset D$，则φ在D上有唯一不动点. 而且，任取$x_0\in D$，迭代生成$\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$，则$x_n\to x^*$，其中x^*是φ的唯一不动点

- 高阶格式的构造：
  - 在$\alpha=\mathcal{F}(0)$处对f的反函数$\mathcal{F}$Taylor展开，截断可得

    $$\varphi_p(x)=x+\sum_{j=1}^{p-1}\frac{[-f(x)]^j}{j!}\mathcal{F}^{(j)}(f(x))$$

    于是有：

    $$\varepsilon_{k+1}=x_{k+1}-\alpha=\varphi_P(x_k)-\alpha=-\frac{\mathcal{F}^{(p)}(\xi)}{p!}[-f(x_k)]^p.$$

    而$f(x_k)=f(x_k-\alpha+\alpha)=f(\alpha)+f'(\eta)(x_k-\alpha)=f'(\eta)(x_k-\alpha)$，所以：

    $$|\varepsilon_{k+1}|\le\frac{\left\|\mathcal{F}^{(p)}\right\|_\infty\|f'\|_\infty}{p!}|\varepsilon_k|^p$$

    也就是具有p阶格式
  - 注：对$x=\mathcal{F}(f(x))$两边求导可得每个$\mathcal{F}^{(j)}(f(x))$，例如：

    $$1=\mathcal{F}'(f(x))f'(x)$$

    所以：

    $$\mathcal{F}'(f(x))=\frac{1}{f'(x)},\quad \varphi_1(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$$

    此即Newton迭代格式
- Aitken加速：设有一个迭代格式$\varphi(x)$，初值x_0，产生的序列为$\{x_k\}$，在计算完x_1,x_2之后，按照：

  $$\widetilde{x}_0=x_0-\frac{(x_1-x_0)^2}{x_2-2x_1+x_0}.$$

  由此可以利用x_1和x_2修正x_0
- **Steffensen加速**：将Aitken加速与不动点迭代相结合可以得到Steffensen加速格式：

  $$\psi(x)=x-\frac{(\varphi(x)-x)^2}{\varphi(\varphi(x))-2\varphi(x)+x}$$

  【定理】设$\varphi'(\alpha)\ne1$，则Steffensen加速格式至少是二阶收敛的（如果$\varphi'(\alpha)=1$，则为一阶收敛的）

  【例题】$\varphi(x)=x+x^5$，有一个不动点$\varphi(0)=0$. 如果用它本身进行迭代，设初值$x_0\ne0$，则

  $$|\varepsilon_{k+1}|=|x_{k+1}-0|=|x_k+x_k^5|>|x_k|+|x_k|^5>|x_k|=|\varepsilon_k|,\quad k=0,1,\cdots$$

  因为$|\varepsilon_0|=|x_0-0|>0$，所以$\lim_{k\to\infty}\varepsilon_k\ne0$，所以本身不收敛.

  但是，如果做Steffensen加速：

  $$\psi(x)=x-\frac{x^{10}}{(x^5+1)^5+x^5+1-2x^5-2+x}=x-\frac{x^9}{x^{24}+5x^{19}+10x^{14}+10x^9+4x^4+1}$$

  设$x_n>0$，则容易看出$x_{n+1}=\psi(x_n)<x_n$且$x_{n+1}>0$；设$x_n<0$，则容易看出$x_{n+1}=\psi(x_n)>x_n$，且$x_{n+1}<0$；所以$\{x_n\}$是单调下降且有下界或单调上升且有上界的序列，所以$\{x_n\}$必然有极限，对$x_{n+1}=\psi(x_n)$两边同时取极限立刻得到$\lim_n x_n=0$.
- Newton迭代法

  根据【高阶迭代格式构造】的讨论，Newton迭代法是二阶格式

  【定理】设$f\in C^2[a,b]$，且$f'\ne0$，$f''(x)$不变号，且满足：

  令c是a或b中满足$|f'(c)|=\min(|f'(a)|,|f'(b)|)$的值，且满足$\frac{|f(c)|}{b-a}\le|f'(c)|$

  则任取$x_0\in[a,b]$，Newton迭代法二阶收敛到f的根α

  【例题】设$f\in C^2[a,b]$，$f'(x)>0$，$f''(x)<0$，$\forall x\in[a,b]$. 且$f(\alpha)=0$，$\alpha\in(a,b)$. 试证明：使用Newton迭代，任取$x_0\in[a,\alpha]$，都有迭代序列$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$收敛到α.

  【解答】

- 因为$f'(x)>0$，$\forall x\in[a,b]$，所以f在$[a,b]$上严格单调递增，所以$f(a)<0$，$f(b)>0$，而且α是f在$[a,b]$上的唯一零点.
- $x_{k+1}=x_k-[f'(x_k)]^{-1}f(x_k)$. 如果$x_k\in[a,\alpha]$，则$f(x_k)\le 0$，$f'(x_k)>0$，所以$x_{k+1}\ge x_k$，因此$\{x_k\}$是单调递增的序列. 另一方面，令$\varphi(x)=x-[f'(x)]^{-1}f(x)$，则$\varphi'(x)=\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$. 所以$\varphi'(x)\ge 0$在$[a,\alpha]$上成立，所以$x_{k+1}=\varphi(x_k)\le\varphi(\alpha)=\alpha$，所以$x_{k+1}\in[a,\alpha]$. 根据归纳法可知，如果$x_0\in[a,\alpha]$，则$x_k\in[a,\alpha]$对所有$k$都成立，而且这还说明$x_k$是单调递增有上界的序列，因此必然收敛到某个$x^*$.
- 对$x_{k+1}=x_k-[f'(x_k)]^{-1}f(x_k)$两边同时取极限可得$x^*=x^*-[f'(x^*)]^{-1}f(x^*)$，根据$f'(x)>0$恒成立可知$f(x^*)=0$，再根据$\alpha$是$(a,b)$上唯一的零点可知$x^*=\alpha$，也即$x_k$收敛到$\alpha$.

- 重根迭代法：考虑$\mu(x)=\frac{f(x)}{f'(x)}$，则$\alpha$必是$\mu$的单根

  对μNewton迭代：$\varphi(x)=x-\frac{\mu(x)}{\mu'(x)}=x-\frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2-f(x)f''(x)}$.

  渐进二阶格式：$\varphi(x)=x-h(x)\frac{f(x)}{f'(x)}=\varphi(x)=x-h(x)\frac{f(x)}{f'(x)}\equiv x-\frac{f(x)\ln|f(x)|}{f'(x)(\ln|f(x)|-\ln|f'(x)|)}$

  这里$h(x)=\frac{|\ln f|}{|\ln\mu|}$，它渐进收敛到$m$（重数）

###