数值分析 整理：常微分方程数值解，数值积分，插值法和函数逼近，非线性方程

数值分析 整理：常微分方程数值解，数值积分，插值法和函数逼近，非线性方程
- 常微分方程数值解
  - 差分方法
  - 线性多步法
  - 绝对稳定性和相对稳定性
- 数值积分
  - 代数精度、插值型求积公式
  - Newton-Cotes型公式、复合公式、Romberg算法、Gauss型公式、数值微分和奇异积分
- 插值法与函数逼近
  - 多项式插值、Runge现象与分段低次插值
  - 函数逼近和数据拟合
- 求解非线性方程

常微分方程数值解

差分方法

- Euler单步法 $y_{n+1}=y_n+hf_n$（Taylor展开，或者用左矩公式计算数值积分$y_{n+1}=y_n+\int_{t_n}^{t_n+h}f(s,y(s))\mathrm{d}s$）
- 隐式Euler法 $y_{n+1}=y_n+hf_{n+1}$. 由于f_{n+1}的计算实际上要用到y_{n+1}，所以需要用Picard迭代法求解
- 梯形法 $y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(f_n+f_{n+1})$
- Runge-Kutta法 用数值积分公式推导

  $y_{n+1}=y_n+h\sum_{j=1}^m c_jK_j$

  其中$K_j=f(s_j,y(s_j))$，$y(s_j)$同样用数值积分$y(s_j)=y_n+h\sum_{l=1}^{j-1}b_{jl}K_l$来代替

  最终得到**显式Runge-Kutta形式**：

  $$y_{n+1}=y_n+h\sum_{j=1}^m c_jK_j,\quad K_j=f\left(x_n+a_jh,y_n+h\sum_{l=1}^{j-1}b_{jl}K_l\right)$$

  这里a,b,c系数的确定可以通过Taylor展开待定系数法.

  在$y(s_j)$的数值积分中也可以考虑率所有$s_1,\cdots,s_m$上的插值：$y(s_j)=y_n+h\sum_{l=1}^m b_{jl}K_l$

  此时得到**隐式Runge-Kutta形式**：

  $$y_{n+1}=y_n+h\sum_{j=1}^m c_jK_j,\quad K_j=f\left(x_n+a_jh,y_n+h\sum_{l=1}^{m}b_{jl}K_l\right).$$

  这时K_j需要通过求解方程来确定.
- **差分法的局部截断误差**

  我们考虑单步、显式的差分格式：

  $$y_{n+1}=y_n+h\phi(t_n,y_n;h).$$

  定义**局部截断误差**为：

  $$L(t_n,y(t_n);h):=y(t_{n+1})-[y(t_n)+h\phi(t_n,y(t_n);h)]$$

  它的含义是：如果认为第n步计算出来的函数值是准确的，那么再向后计算一步（得到y_{n+1}）与真实值的误差

  整体截断误差：

  $$\varepsilon_n:=y(t_n)-y_n.$$

  一般来说，整体截断误差很难分析（只能对一些简单的方法，例如Euler法来分析，而且通常需要对f提一些额外要求，例如满足Lipschitz条件等），但是局部截断误差的阶数往往都是可以分析的（Taylor展开即可）
- 适定性：“真解存在唯一”

Picard-Lindelof定理 对于初值问题$y'(t)=f(t,y)$，$y(t_0)=y_0$，如果f关于y满足Lipschitz条件，则初值问题存在唯一解，也成为该问题是适定的

- 相容性：对于一个适定问题，如果$\frac{1}{h}L(t,y(t);h)\to 0$对所有$t$都成立，i.e.：

$$\lim_{h\to 0}\left[\frac{y(t+h)-y(t)}{h}-\phi(t,y(t);h)\right]=0.$$

  则称该差分格式和原问题是相容的.

  例如，如果$L(t,y(t);h)=O(h^2)$（局部截断误差为2阶），则该差分问题是所谓一阶相容的

  单步法是相容的当且仅当$\lim_{h\to 0}\phi(t,y,h)=f(t,y)$对所有$t$成立

- 收敛性：令$E(h)=\max_{0\le n\le N}|\varepsilon_n|=\max|y(t_n)-y_n|$，若$E(h)\to 0$，则称该单步、显式差分格式是收敛的

  若$\phi(t,y,h)$是连续函数且关于y是Lipschitz的，则该格式是收敛的当且仅当其是相容的（从而把收敛性的分析转化成了对ϕ本身性质的分析）（证明思路：利用$L(t_n,y(t_n);h)=o(h)$计算化简）

线性多步法

- 单步法

$$y_{n+1}=y_n+h\phi(t_n,y_n;h).$$

  线性k步法

$$\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j}=h\sum_{j=0}^{k-1}\beta_j f_{n+j}+h\beta_k f_{n+k}$$

  $\beta_k=0$为显式多步法，$\beta_k\neq 0$为隐式多步法

- 线性多步法的局部截断误差：

$$L(t_n,y(t_n);h)=\sum_{j=0}^{k}[\alpha_j y(t_{n+j})-h\beta_j f(t_{n+j},y(t_{n+j}))]$$

- 相容性：

  如果$\frac{1}{h}L(t,y(t);h)\to 0$，则称多步法和原问题相容.

  特别地，设局部截断误差$L(t,y(t);h)=O(h^{p+1})$，则该多步法和原IVP是p阶相容的

  线性多步法是相容的当且仅当$\rho(1)=0$且$\rho'(1)=\sigma(1)$，其中ρ和σ分别是第一和第二特征多项式：

$$\rho(\lambda)=\sum_{j=0}^{k}\alpha_j\lambda^j,\quad \sigma(\lambda)=\sum_{j=0}^{k}\beta_j\lambda^j.$$

  例如在多步法$y_{n+2}-(1+a)y_{n+1}+ay_n=\frac{h}{4}[(3-b)f_{n+2}+(1-3b)f_n]$取$a=0$，$b=1$，则：

$$\rho(\lambda)=\lambda^2-\lambda,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda^2-1).$$

  于是$\rho(1)=0$，$\rho'(1)=1$，但$\sigma(1)=0$，所以该格式不是相容的. 而如果取$a=b=1$，则为：

$$\rho(\lambda)=\lambda^2-2\lambda+1,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda^2-1),$$

  此时$\rho(1)=0$，$\rho'(1)=0$，$\sigma(1)=0$，此时相容.

- 多步法对**初值的稳定性**：

  定义：称多步法对初值是稳定的，如果存在常数C、h_0，对任何$\varepsilon>0$，只要$h<h_0$，如果两组初值$\{u_j\}_{j=0}^{k-1}$和$\{v_j\}_{j=0}^{k-1}$满足$\max_{0\le j\le k-1}|u_j-v_j|<\varepsilon$，则对于这两组初值算出来的解$\{u_n\}_{n=0}^{N}$和$\{v_n\}_{n=0}^{N}$满足必然有：

$$\max_{nh\le T}|u_n-v_n|\le C\max_{0\le j\le k-1}|u_j-v_j|.$$

  对于单步法$y_{n+1}=y_n+h\phi(t_n,y_n;h)$，如果$\phi$关于$y$满足Lipschitz条件，则单步法一定是稳定的（从前面证明ϕ满足Lipschitz条件$\Rightarrow$相容性蕴含收敛性的证明即可看出这一点，特别地，在那个证明过程中我们并没有考虑舍入误差，因此初值的误差$|\varepsilon_0|=0$，由此证明出$E(h)\to 0$也就是单步法收敛）

  多步法对初值稳定当且仅当$\rho(\lambda)$的所有根都在闭单位圆盘中，而且单位圆周上的所有根都是单根

  仍然举上面的例子，取$a=b=1$，则$\rho(\lambda)$有二重根1，所以对初值不稳定.

绝对稳定性和相对稳定性

- Setting：要估计舍入误差的影响. 对于多步法取一个模型问题$f=\mu y$（即线性增长），则要想保证误差有界，必须满足：

$$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=0$$

  的根模都小于1（这里的$\overline{h}=\mu h$）
- 绝对稳定：$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=0$**的根都在单位（开）圆盘内**，则多步法对于$\overline{h}$绝对稳定（必要条件：本身指数衰减，即$\mathrm{Re}\mu<0$）

  仍然举上面的例子：

$$\rho(\lambda)=\lambda^2-\lambda,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda^2-1)$$

  为了简单起见，我们只考虑$\mu\in\mathbb{R}$的情形，此时：

$$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=(1-\overline{h}/2)\lambda^2-\lambda+\overline{h}/2=0$$

  可见两个根分别是1和$\frac{\overline{h}}{2-\overline{h}}$，注意恒有一个根不在单位开圆盘内，所以对于所有$\mu\in\mathbb{R}$，该方法对$\overline{h}$都不是绝对稳定的！
- 相对稳定：$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=0$**的模最大根**$\lambda_1$**满足**$\lambda_1=e^{\overline{h}}+O(h^{p+1})$**，且其他根**$\lambda_j$**满足**$|\lambda_j|<|\lambda_1|$，则是相对稳定的.

  对于上面的例子：

$$\rho(\lambda)=(\lambda-1)^2,\quad \sigma(\lambda)=\frac{1}{2}(\lambda-1)(\lambda+1)$$

  此时：

$$\rho(\lambda)-\overline{h}\sigma(\lambda)=(\lambda-1)\left(\lambda-1-\frac{\overline{h}}{2}\lambda-\frac{\overline{h}}{2}\right)=0$$

  的两个根分别是1和$\frac{1+\overline{h}/2}{1-\overline{h}/2}$. 其中$\frac{1+\overline{h}/2}{1-\overline{h}/2}=1+\overline{h}+O(\overline{h}^2)=e^{\overline{h}}+O(\overline{h}^2)$.

  另一方面，

$$\left|\frac{1+\overline{h}/2}{1-\overline{h}/2}\right|=\sqrt{1+\frac{\mathrm{Re}\overline{h}}{|1-\overline{h}/2|^2}},$$

  如果$\mathrm{Re}\overline{h}>0$，则$\lambda_1$满足$\lambda_1=e^{\overline{h}}+O(\overline{h}^2)$且$|\lambda_1|>|\lambda_2|=1$，为相对稳定的；

  如果$\mathrm{Re}\overline{h}<0$，则$\lambda_1=1=e^{\overline{h}}+O(\overline{h})$，且$|\lambda_2|=\sqrt{1+\frac{\mathrm{Re}\overline{h}}{|1-\overline{h}/2|^2}}<1=|\lambda_1|=1$，也是相对稳定的，因此相对稳定域就是整个复平面（无条件相对稳定）.

数值积分

代数精度、插值型求积公式

- 求积公式：$\int_a^b\rho(x)f(x)\mathrm{d}x\approx\sum_{i=0}^n A_if(x_i)$，$\{x_i\}\subset[a,b]$是求积节点

  定义误差$E_n(f)=\int_a^b\rho(x)f(x)\mathrm{d}x-\sum_{i=0}^n A_if(x_i)$
- 代数精度：如果$E_n(x^m)=0$对$m=0,\cdots,M$都成立，则称求积公式至少具有M阶代数精度。如果$E_n(x^{M+1})\neq 0$，则代数精度为M
- 插值型求积公式：对于f以及求积节点$\{x_i\}_{i=0}^n$，考虑Lagrange插值多项式：

$$L_n(x)=\sum_{i=0}^n f(x_i)l_i(x),\quad l_i(x)=\prod_{i\neq j=0}^n\frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}.$$

  （注意$l_i(x_j)=\delta_{ij}$）

  则求积公式为：

$$\int_a^b\rho(x)f(x)\mathrm{d}x\approx\int_a^b\rho(x)L_n(x)\mathrm{d}x=\sum_{i=0}^n A_if(x_i),\quad \text{其中}A_i=\int_a^b\rho(x)l_i(x)\mathrm{d}x$$

  误差公式为：

$$E_n(f)=\int_a^b \rho(x)R_n(x)\mathrm{d}x,\quad \text{其中}R_n(x)=f(x)-L_n(x)=f[x,x_0,\cdots,x_n]\omega_{n+1}(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

很显然，当f是次数不超过n的多项式，那么$R_n(x)\equiv 0$，此时$E_n(f)=0$，插值积分准确，因此插值型的求积公式至少具有n阶代数精度

- **【命题】如果求积公式$\int_a^b \rho(x)f(x)\mathrm{d}x\approx\sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$至少具有$n$阶代数精度，则它必然是插值型的**

  【证明】分别计算$E_n(l_i)$即可

- 收敛性：记步长$h=\max_{1\le k\le n}(x_k-x_{k-1})$，如果有$\lim_{h\to 0}\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)=\int_a^b \rho(x)f(x)\mathrm{d}x$
- 稳定性：如果$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得$\max_k\left|f(x_k)-\widehat{f_k}\right|\le\delta$时（节点处的函数值误差），有$\left|I_n(f)-\widehat{I_n}(f)\right|\le\varepsilon$，则称该求积公式是稳定的
- 相容性：如果公式对$f\equiv 1$是准确成立的，则称其是相容的（可以认为具有0阶代数精度），也就是：

$$\int_a^b \rho(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^n A_k.$$

- **【命题】如果公式是相容的，而且每个$A_k>0$，则它必是稳定的**

  【证明】直接计算，然后利用$A_k>0$去掉绝对值

Newton-Cotes型公式、复合公式、Romberg算法、Gauss型公式、数值微分和奇异积分

- Newton-Cotes型公式：用等距节点构造的插值积分公式

  $n=1$：梯形公式：

$$I_1(f)=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$$

  $n=2$：Simpson公式：

$$I_2(f)=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$$

- 【命题】n阶Newton-Cotes型公式至少具有n阶代数精度，如果n是偶数，则代数精度为$n+1$

  【证明】对Simpson（$n=2$）进行推导，更高阶的格式完全类似：

  令：

$$\begin{aligned}
q(x)&=\int_a^x \omega_3(x)\mathrm{d}x=\frac{(x-a)^2(x-b)^2}{4},\\
E_2(f)&=\int_a^b f[x,x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\mathrm{d}x\\
&=\int_a^b f[x,x_0,x_1,x_2]q'(x)\mathrm{d}x\\
&=f[x,x_0,x_1,x_2]q(x)|_a^b-\int_a^b q(x)f[x,x,x_0,x_1,x_2]\mathrm{d}x\\
&=-\int_a^b q(x)f[x,x,x_0,x_1,x_2]\mathrm{d}x\\
&=(\text{积分中值定理})f[\eta,\eta,x_0,x_1,x_2]\int_a^b q(x)\mathrm{d}x\\
&=-\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi).
\end{aligned}$$

- 复合公式：采用分段低次插值来近似计算积分
  - 复合梯形公式

$$\begin{aligned}
I(f)&=\sum_{j=1}^n\int_{x_j-1}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x\approx\sum_{j=1}^n\frac{h}{2}[f(x_{j-1})+f(x_j)]\\
&=\frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_j)\right]\equiv T_n
\end{aligned}$$

    【命题】复合梯形公式是稳定的. 求积系数>0

    【命题】复合梯形公式是二阶收敛的

FACT：对于梯形公式，有误差估计式：

$$
\begin{aligned}
E_1(f) &= \int_a^b f[x,a,b](x-a)(x-b)\mathrm{d}x = f[\eta,a,b]\int_a^b (x-a)(x-b)\mathrm{d}x \\
&= \frac{f^{(2)}(\xi)}{2!}(-(b-a)^3/6) = -\frac{(b-a)^3}{12}f^{(2)}(\xi).
\end{aligned}
$$

$$
\int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = \frac{h}{2}[f(x_{j-1})+f(x_j)] - \frac{h^3}{12}f''(\xi_j), \quad \xi_j \in (x_{j-1},x_j)
$$

$$
\Rightarrow I(f) = \sum_{j=1}^n \int_{x_j-1}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = T_n - \frac{h^3}{12}\sum_{j=1}^n f''(\xi_j),
$$

其中

$$
\left|\frac{h^3}{12}\sum_{j=1}^n f''(\xi_j)\right| \le \frac{1}{12}h^3 n\|f''\|_\infty = \frac{b-a}{12}h^2\|f''\|_\infty.
$$

缩小步长的复合梯形公式：

$$
T_{2n} = \frac{1}{2}(T_n+H_n), \quad H_n = \frac{h}{2}\sum_{i=1}^n f(x_{i-\frac{1}{2}}), \quad x_{i-\frac{1}{2}} = x_i - \frac{1}{2}h = a+(i-1/2)h.
$$

- 复合Simpson公式：

$$
S_n = \frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}H_n.
$$

【命题】复合Simpson公式是四阶收敛的

FACT：对于Simpson公式，$E_2(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi)$，$\xi \in (a,b)$

$$
\int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = \frac{h}{6}[f(x_{j-1})+4f(x_{j-1/2})+f(x_j)] - \frac{h^5}{2880}f^{(4)}(\xi_j),
$$

$$
\Rightarrow I(f) = \sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)\mathrm{d}x = S_n - \frac{h^5}{2880}\sum_{j=1}^n f^{(4)}(\xi_j),
$$

$$
\Rightarrow \left|\frac{h^5}{2880}\sum_{j=1}^n f^{(4)}(\xi_j)\right| \le \frac{h^4}{2880}\left\|f^{(4)}\right\|_\infty.
$$

- 复合Hermite公式：

  Hermite插值积分：

$$
\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)] + \frac{(b-a)^2}{12}[f'(a)-f'(b)] + E(f)
$$

  这里：

$$
E(f) = \int_a^b R(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f[x,a,a,b,b](x-a)^2(x-b)^2\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^5}{720}f^{(4)}(\eta).
$$

  所以，如果用复合公式：

$$
U_n = \frac{h}{2}[f(a)+f(b)+\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)] + \frac{h^2}{12}[f'(a)-f'(b)]
$$

  则

$$
|E_n(f)| = \left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - U_n(f)\right| \le \frac{(b-a)\left\|f^{(4)}\right\|_\infty}{720}h^4.
$$

  Rmk：复合Hermite公式只比复合梯形公式T_n多了两端点的导数项，精度却直接提高到了四阶

- Romberg算法：原理为Euler-Maclaurin公式+Richardson外推
  - Euler-Maclaurin公式
    - Bernoulli多项式

      递推定义：$B_0(x)=1$，$B_k(x) = A_k + k\int_0^x B_{k-1}(t)\mathrm{d}t$，其中$x \in [0,1]$

      这里

$$A_k = -k\int_0^1\int_0^x B_{k-1}(t)\mathrm{d}t\mathrm{d}x.$$

Bernoulli数：$B_k := B_k(0)$

- Euler-Maclaurin公式：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - T_n(f) = -\sum_{l=1}^m \frac{B_{2l}}{(2l)!}[f^{(2l-1)}(b) - f^{(2l-1)}(a)]h^{2l} + r_{m+1},$$

这里$T_n(f) = \frac{h}{2}[f(a) + f(b) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)]$

$r_{m+1} = \frac{h^{2m+2}}{(2m+2)!}\int_a^b[\overline{B}_{2m+2}(x-a/h) - B_{m+2}]f^{(2m+2)}(x)\mathrm{d}x$

这里$\overline{B}$指的是Bernoulli多项式从$[0,1]$周期延拓后得到的$\mathbb{R}$上的函数

- Richardson外推
  - 我们把Euler-Maclaurin公式重写，看看能不能将T_{2n}和T_n做某种线性组合来获得更高精度：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - T_n(f) = \alpha_2 h^2 + \alpha_4 h^4 + \cdots + \alpha_{2m}h^{2m} + O(h^{2m+2})$$

加细节点：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - T_{2n}(f) = \alpha_2\left(\frac{h}{2}\right)^2 + \alpha_4\left(\frac{h}{2}\right)^4 + \cdots + \alpha_{2m}\left(\frac{h}{2}\right)^{2m} + O(h^{2m+2}).$$

观察到：

$$\widetilde{T}_{2n} := \frac{4T_{2n}(f) - T_n(f)}{3},$$

则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \widetilde{T}_{2n}(f) = \widetilde{\alpha}_4 h^4 + \cdots + \widetilde{\alpha}_{2m}h^{2m} + P(h^{2m+2}).$$

显然，如果将减半加密节点之后所得的求积格式T_{2n}和加密之前的格式T_n做某种线性组合，这样收敛得就更快了（类似于迭代法中的Aitken加速法）

进一步地，如果再外推一步：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - T_{4n}(x) = \widetilde{\alpha}_4(h/2)^4 + \cdots + \widetilde{\alpha}_{2m}(h/2)^{2m} + O(h^{2m+2})$$

可以进一步用$\widetilde{T}_{4n} = \frac{4^2T_{4n}(f) - \widetilde{T}_{2n}(f)}{4^2-1}$进行加速.

  - 一般表述：Richardson外推。写$T_n(f) = F(h)$（步长的函数），如果：

$$F(h) - F^* = \sum_{k=1}^\infty a_k h^{p_k},$$

则可以通过“加细+组合”的方法构造快速收敛序列：

$$F_{m+1}(h) = \frac{F_m(qh) - q^{p_m}F_m(h)}{1 - q^{p_m}}$$

我们看到上面的减半加密节点就是Richardson外推的一个很好的例子，这实际上就是Romberg求积算法

  - Romberg求积算法
    - 首先利用梯形公式（减半加密节点）计算：

$$T_1^{(0)} = T_{2^0},\quad T_1^{(1)} = T_{2^1},\quad \cdots,\quad T_1^{(k)} = T_{2^k},$$

    - 然后进行Richardson外推：

$$T_2^{(0)} = \frac{4T_1^{(1)} - T_1^{(0)}}{3},\quad T_2^{(1)} = \frac{4T_1^{(2)} - T_1^{(1)}}{3},\quad T_2^{(2)} = \cdots,$$
$$T_3^{(1)} = \frac{4^2T_2^{(2)} - T_2^{(1)}}{4^2-1},\quad T_3^{(2)} = \cdots,$$

一般通式为：

$$T_{j+1}^{(k-1)}=\frac{4^jT_j^{(k)}-T_j^{(k-1)}}{4^j-1}.$$

- Gauss型公式：不采用等距节点，而是采用最优化的节点选择，使得代数精度尽可能高
  - 误差项：

    $$E_n(f)=I(f)-I_n(f)=(f[x,x_0,\cdots,x_n],\omega_{n+1})_\rho$$

    其中$\omega_{n+1}(x)=\prod_{i=0}^n(x-x_i)$。

    假设f是M次多项式，则$f[x,x_0,\cdots,x_n]$是次数为$M-(n+1)$的多项式，即$f[x,x_0,\cdots,x_n]\in\mathcal{P}^{M-n-1}$.

    如果选择x_i是$n+1$次正交多项式（相对于ρ）的零点，则$\omega_{n+1}(x)$是$n+1$次正交多项式，满足：

    $$\omega_{n+1}\perp_\rho\mathcal{P}^n$$

    令$M-n-1=n$解得$M=2n+1$，所以这时候对于$f\in\mathcal{P}^{2n+1}$，我们都有$E_n(f)=0$!

    Slogan：选择节点为$n+1$次正交多项式的零点，可得至少$2n+1$阶代数精度
  - **固定节点Gauss型公式**：变更权函数

    如果$n+1$个节点中共有m个固定节点，则有$n-m+1$个可调整节点，选择其为次数$n-m+1$正交多项式的零点，则可得$n+1+n-m=2n+1-m$阶代数精度，例如下面的例题，3个节点中固定1个节点，可得$2\times2+1-1=4$阶代数精度

    【例题】

    请确定以下求积公式：

    $$\int_0^1x^2f(x)\mathrm{d}x\approx A_1f(x_1)+A_2f(x_2)+A_3f(1),$$

    中的参数A_1,A_2,A_3,x_1,x_2，使得其具有尽可能高的代数精度，并给出代数精度和求积余项公式.

    【解答】

    因为要求求积公式有尽可能高的代数精度，因此是插值型的求积公式. 计算积分余项可得：

    $$E(f)=\int_0^1x^2[f(x)-L(x)]\mathrm{d}x=\int_0^1x^2f[x,x_1,x_2,1](x-1)(x-x_1)(x-x_2)\rho(x)\mathrm{d}x.$$

    定义$\rho(x)=x^2(x-1)$，则：

    $$E(f)=\int_0^1f[x,x_1,x_2,1](x-x_1)(x-x_2)\rho(x)\mathrm{d}x=(f[x,x_1,x_2,1],(x-x_1)(x-x_2))_\rho.$$

    若f是次数为M的多项式，则均差$f[x,x_1,x_2,1]$为次数是$M-3$的多项式. 如果我们选择x_1,x_2为$[0,1]$上关于带权内积$(\cdot,\cdot)_\rho$的正交多项式的零点，则根据正交多项式的性质可知，当$M-3\le1$，即$M\le4$时，$(x-x_1)(x-x_2)\perp f[x,x_1,x_2,1]$，即$E(f)=0$. 也即此时该求积公式有4阶代数精度.

    下面计算$[0,1]$上的二次正交多项式，也就是让$p_2(x)=x^2+ax+b$在带权内积下与1和x都正交，也就是：

    $$(p_2,1)_\rho=0\Leftrightarrow\int_0^1(x^2+ax+b)x^2(x-1)\mathrm{d}x=0\Leftrightarrow-\frac{1}{20}a-\frac{1}{12}b=\frac{1}{30},$$
    $$(p_2,x)_\rho=0\Leftrightarrow\int_0^1(x^2+ax+b)x^3(x-1)\mathrm{d}x=0\Leftrightarrow-\frac{1}{30}-\frac{1}{20}b=\frac{1}{42},$$

    解得$a=-\frac{8}{7}$，$b=\frac{2}{7}$，由此可知p_2的表达式为：

    $$p_2(x)=x^2-\frac{8}{7}x+\frac{2}{7}.$$

    解方程$p_2(x)=0$可得$x_1=\frac{4-\sqrt{2}}{7}$，$x_2=\frac{4+\sqrt{2}}{7}$.

    根据代数精度的概念可得：

    $$A_1+A_2+A_3=\int_0^1x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3},$$
    $$A_1x_1+A_2x_2+A_3x_3=\int_0^1x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$
    $$A_2x_1^2+A_2x_2^2+A_3x_3^2=\int_0^1x^4\mathrm{d}x=\frac{1}{5},$$

    解方程可得：

$$A_1=\frac{1}{240}[32-13\sqrt{2}],\quad A_2=\frac{1}{240}[32+13\sqrt{2}],\quad A_3=\frac{1}{15}.$$

余项公式即为

$$E(f)=\int_0^1 f[x,x_1,x_2,1](x-x_1)(x-x_2)\rho(x)\mathrm{d}x$$

- **Gauss 求积公式的求积系数 A_k 总是大于零.**

  【证明】因为Gauss求积公式至少有$2n+1$次代数精度，所以计算$E_n(l_j(x)^2)=0$可得$0<I(l_j(x)^2)=A_j$.（注意到$l_j(x_k)^2=\delta_{jk}$）

  【推论】Gauss 求积公式总是稳定的（相容+系数>0推出稳定）

- **Gauss 求积公式满足$\lim_{n\to\infty}I_n(f)=I(f)$**

  【证明】设$\int_a^b\rho(x)\mathrm{d}x=\sum_{j=1}^n A_j=C>0.\forall\varepsilon>0$，根据Weierstrass定理可知，存在某个多项式q（不妨$\deg q=m$），使得：

$$\|f-q\|_\infty<\frac{\varepsilon}{2c},$$

  于是：

$$|I_n(f)-I(f)|\le|I_n(f)-I_n(q)|+|I_n(q)-I(q)|+|I(q)-I(f)|,$$

  对于第二项，取n使得$2n+1>m$，则根据I_n的代数精度为$2n+1$可知$I_n(q)-I(q)=0$;

  对于第一项，$|I_n(f)-I_n(q)|=\sum_{j=1}^n A_j|f(x_i)-q(x_i)|\le\|f-q\|_\infty\cdot\int_a^b\rho(x)\mathrm{d}x<\varepsilon/2$

  对于最后一项，$|I(q)-I(f)|\le\|f-q\|_\infty\int_a^b\rho(x)\mathrm{d}x<\varepsilon/2$

  由此可知$|I_n(f)-I_n(q)|<\varepsilon/2$，对$n$足够大，从而收敛.

- **Gauss求积公式的余项可估计为：**

$$E_n(f)=\frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!}\int_a^b\rho(x)[\omega_{n+1}(x)]^2\mathrm{d}x.$$

  【证明】只需要用到$I_n(f)$代数精度为$2n+1$. 我们写$f(x)$的Newton型Hermite插值：

$$f(x)=H_{2n+1}(x)+f[x,x_0,x_0,x_1,x_1,\cdots,x_n,x_n]\omega_{n+1}^2(x).$$

  做带权积分，并根据I_n是$2n+1$阶代数精度，可得

$$\int_a^b\rho(x)H_{2n+1}(x)\mathrm{d}x=I_n(H_{2n+1})=\sum_{k=0}^n A_kH_{2n+1}(x_k)=\sum_{k=0}^n A_nf(x_k).$$

  所以：

$$E_n(f)=\int_a^b\rho(x)f(x)\mathrm{d}x-\int_a^b\rho(x)H_{2n+1}(x)\mathrm{d}x$$
$$=\int_a^b\rho f[x,x_0,x_0,\cdots,x_n,x_n]\omega_{n+1}^2\mathrm{d}x=f[\eta,x_0,x_0,\cdots,x_n,x_n]\int_a^b\rho\omega_{n+1}^2\mathrm{d}x$$
$$=\frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!}\int_a^b\rho\omega_{n+1}^2\mathrm{d}x.$$

- 数值微分

$$f(x_{k+1})=f(x_{k-1})+\int_{x_{k-1}}^{x_{k+1}}f'(x)\mathrm{d}x$$

  用数值积分公式：

$$f_{k+1}=f_{k-1}+\frac{h}{3}(\varphi_{k-1}+4\varphi_k+\varphi_{k+1})\Rightarrow\varphi_{k-1}+4\varphi_k+\varphi_{k+1}=6f[x_{k-1},x_{k+1}].$$

  φ_0和φ_n可以用两点或三点格式计算，然后求解三对角方程组

- 奇异积分
  - 区间截断、变量替换
  - 奇点分离

$$\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}+\int_0^1\frac{\cos x-1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2+\int_0^1\frac{\cos x-1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$$

- Gauss型求积公式（将奇异部分放在权函数中考虑）

插值法与函数逼近

多项式插值、Runge现象与分段低次插值

- Lagrange插值基函数$l_k(x)=\prod_{i=0,i\neq k}^{n}\frac{x-x_i}{x_k-x_i}$，满足$l_k(x_m)=\delta_{km}$

$$L_n(x)=\sum_{i=0}^{n}y_il_i(x).$$

- 均差

  $f[x_j]=f(x_j)$，$f[x_j,x_{j+1},\cdots,x_{j+k}]:=\frac{f[x_{j+1},\cdots,x_{j+k}]-f[x_j,\cdots,x_{j+k-1}]}{x_{j+k}-x_j}$.（递推定义式）

  性质：

  - $f[x_j,\cdots,x_{j+k}]=\sum_{\ell=j}^{j+k}\frac{f(x_\ell)}{\omega'_{jk}(x_\ell)}$

    其中$\omega_{jk}(x)=\prod_{m=j}^{j+k}(x-x_m)$
  - $f[x_{\sigma(j)},\cdots,x_{\sigma(j+k)}]=f[x_j,\cdots,x_k]$（对称性）
  - $f[x,x_0,\cdots,x_k]$是x的m次多项式$\Rightarrow f[x,x_0,\cdots,x_{k+1}]$是$x$的$m-1$次多项式
  - 如果$f\in C^n[a,b]$，而且x_0，$\cdots$，x_n为$[a,b]$上互异的$n+1$个点，则存在$\xi\in(\min x_i,\max x_i)$，使得：$f[x_0,\cdots,x_n]=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$

  【几个例题】

  - 【例1】

    题目 1. 设 x_j，$j=0,1,\cdots,n$ 为互异节点，求证

    1. $\sum_{j=0}^{n}x_j^kl_j(x)\equiv x^k$，$k=0,1,\cdots,n$;
    2. $\sum_{j=0}^{n}(x_j-x)^kl_j(x)\equiv 0$，$k=1,\cdots,n$.

    其中 $l_j(x)=\frac{w_{n+1}(x)}{(x-x_j)w'_{n+1}(x_j)}$ 为 Lagrange 插值基函数，$w_{n+1}(x)=\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)$.

    1. 令$p_k(x)=x^k$，注意到左边就是p_k的Lagrange插值多项式，所以右-左$=R(x)=\frac{p_k^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$，根据$k\leq n$可知右-左恒等于0
    2. 根据二项式展开以及第一问结论：

$$\sum_{j=0}^{n}(x_j-x)^k\ell_j(x)=\sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}x_j^k(-x)^{k-i}\ell_j(x)$$
$$=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-x)^{k-i}\left(\sum_{j=0}^{n}x_j^k\ell_j(x)\right)=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-x)^{k-i}x^k=(x-x)^k\equiv 0.$$

  - 【例2】

    题目 2. 设 $f(x)=\frac{1}{a-x}$，试证明

    1. $f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\prod_{j=0}^{n}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)$;
    2. $\frac{1}{a-x}=\frac{1}{a-x_0}+\frac{x-x_0}{(a-x_0)(a-x_1)}+\cdots+\frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})}{(a-x_0)\cdots(a-x_n)}+\frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(a-x_0)\cdots(a-x_n)(a-x)}$.

    1. 用数学归纳法直接计算

当 $n=1$ 时,$f\left[x_0, x_1\right]=\frac{\frac{1}{a-x_1}-\frac{1}{a-x_0}}{x_1-x_0}=\frac{1}{(a-x_0)(a-x_1)}$. 假设对 $k=n-1$ 成立，则

$$
\begin{aligned}
f\left[x_0, x_1, \ldots, x_n\right] &= \frac{f\left[x_1, \ldots, x_n\right]-f\left[x_0, \ldots, x_{n-1}\right]}{x_n-x_0} \\
&= \frac{\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)-\prod_{j=0}^{n-1}\left(\frac{1}{a-x_j}\right)}{x_n-x_0} \\
&= \prod_{j=0}^{n}\left(\frac{1}{a-x_j}\right).
\end{aligned}
$$

由数学归纳法可知等式对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都成立.

2. 用Newton型插值公式

- 【例3】设$f(x)=x^7+x^4+3x+1$，求$f[2^0,2^1,\cdots,2^7]=1$，$f[2^0,\cdots,2^8]=0$

  【注】$f[2^0,\cdots,2^7]=\frac{f^{(7)}(\xi)}{7!}$，并注意到$f^{(7)}(x)\equiv 7!$；$f[2^0,\cdots,2^8]=\frac{f^{(8)}(\xi)}{8!}$，所以$f[2^0,\cdots,2^8]=0$.

- Newton型插值公式：

$$p_n^N(x)=f[x_0]+f[x_0,x_1](x-x_0)+\cdots+f[x_0,\cdots,x_n]\prod_{j=0}^{n-1}(x-x_j)$$

  可以证明$L_n(x)=p_n^N(x)$

  Newton型插值余项：

$$R_n(f)(x)=f[x,x_0,\cdots,x_n]\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)=f[x,x_0,\cdots,x_n]\omega_{n+1}(x).$$

  插值余项估计：

$$R_n(f)(x)=\frac{f^{(n+1)}(\eta_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

  （用均差性质的第五条可得$f[x,x_0,\cdots,x_n]=\frac{f^{(n+1)}(\eta_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$）

- Hermite型插值公式

  Hermite插值基函数：$\alpha_j(x)=(1+2l_j'(x_j)(x_j-x))l_j^2(x)$；$\beta_j(x)=(x-x_j)l_j^2(x)$

  满足的条件是：$\alpha_j(x_k)=\delta_{jk}$，$\alpha_j'(x_k)=0$，$\beta_j(x_k)=0$，$\beta_j(x_k)'=\delta_{jk}$

- 问：每一次都用插值基函数构造Hermite插值过于麻烦，是否有类似的Newton型插值公式？

  这需要引入重节点的均差：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f[x,x_0,\cdots,x_n]=f[x,x,x_0,\cdots,x_n]$（可用于构造Newton型的一般Hermite插值）

  特别地，$f'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f[x]=f[x,x]$，另外重节点均差也满足：

$$f[x_0,\cdots,x_n]=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!},\quad f[x_0,\cdots,x_n]=\frac{f[x_0,\cdots,x_{n-1}]-f[x_1,\cdots,x_n]}{x_0-x_n},$$

  以上$x_0,\cdots,x_n$都可以有相同的，$\xi\in(\min\xi_i,\max\xi_i)$

- **一般Hermite插值（密切插值法）**

  把导数看成重节点的误差，有**Newton型**插值多项式：

  $p^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)$，$k=0,1,2$，$p(x_1)=f(x_1)$，$p(x_2)=f(x_2)$，$p'(x_2)=f'(x_2)$

$$
\begin{aligned}
p_5(x)=&f[x_0]+f[x_0,x_0](x-x_0)+f[x_0,x_0,x_0](x-x_0)^2+f[x_0,x_0,x_0,x_1](x-x_0)^3\\
&+f[x_0,x_0,x_0,x_1,x_2](x-x_0)^3(x-x_1)+f[x_0,x_0,x_0,x_1,x_2,x_2](x-x_0)^3(x-x_1)(x-x_2)\\
&+f[x_0,x_0,x_0,x_1,x_2,x_2](x-x_0)^3(x-x_1)(x-x_2)
\end{aligned}
$$

  $R_5(x)=f(x)-p_5(x)=f[x,x_0,x_0,x_0,x_1,x_2,x_2](x-x_0)^3(x-x_1)(x-x_2)^2$

  其中，**重节点均差表**可以用递推公式一步一步地计算，并注意$f[x,x]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f[x]=f'(x)$

  【例题】函数$f(x)$在点$x_0=0$，$x_1=1$上的值分别是$f(x_0)=0$，$f(x_1)=1$，以及在x_1点处的导数值为$f'(x_1)=0$，二阶导数值$f''(x_1)=1$.

  可用待定系数法求出一个三次多项式$P_3(x)$，满足：

$$\begin{cases}P_3(x_i)=f(x_i), & i=0,1\\ P_3'(x_1)=f'(x_1), & P_3''(x_1)=f''(x_1).\end{cases}$$

  其插值余项表达式为：

$$R_3(x)=f(x)-P_3(x)=f[x,0,1,1,1]x(x-1)^3$$

- 分段低次插值
  - 分段线性插值基函数（帽子函数）：

$$\phi_0(x)=\begin{cases}0, & x_1\le x;\\ \frac{x-x_1}{x_0-x_1}, & x_0\le x\le x_1;\end{cases}\quad \phi_n(x)=\begin{cases}0, & x\le x_{n-1};\\ \frac{x-x_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}, & x_{n-1}\le x\le x_n;\end{cases}$$

$$\phi_j(x)=\begin{cases}0, & x\le x_{j-1}\text{ or }x\ge x_{j-1};\\ \frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}, & x_{j-1}\le x\le x_j;\\ \frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}, & x_j\le x\le x_{j+1};\end{cases}\quad j=1,2,\cdots,n-1.$$

    性质：$\sum_{j=0}^n\phi_j(x)=\mathbb{1}_{[a,b]}$

    由这些基函数的线性组合可以构造出在每个$[x_k,x_{k+1}]$上的限制都是线性函数的函数（分段线性插值函数）：

$$I_h(x)=\sum_{j=0}^n f_j\phi_j(x)$$

    【收敛性】$f\in C[a,b]$，当$h=\max h_i=\max(x_i-x_{i-1})\to 0$时，$I_h$一致收敛到$f$

    【证明】当$x\in[x_{k-1},x_k]$时，根据$1=\phi_{k-1}(x)+\phi_k(x)$可得

$$|f(x)-I_h(x)|=|[f(x)-f(x_{k-1})]\phi_{k-1}(x)+[f(x)-f(x_k)]\phi_k(x)|\le\phi_{k-1}(x)\omega(f;h_k)+\phi_k(x)\omega(f;h_k)\le\omega(f;h),$$

    对所有$x\in[a,b]$都成立，所以$\|f-I_h\|_\infty\le\omega(f;h)\to 0$

    （连续模的定义：$\omega(f;h)=\sup_{|t|\le h,x,x+t\in[a,b]}|f(x+t)-f(x)|$

  - 分段Hermite插值基函数：相当于在每个小区间上做三次Hermite插值（用到端点的函数值和端点的导数值），也就是：

$$I_h|_{[x_k,x_{k+1}]}=f_k\alpha_k+f_{k+1}\alpha_{k+1}+m_k\beta_k+m_{k+1}\beta_{k+1}.$$

    其中$f_j=f(x_j)$，$m_j=f'(x_j)$

    由此可知α_j和β_j都是帽子函数的形式，例如α_j只在$[x_{j-1},x_j]$和$[x_j,x_{j+1}]$上不得0，表达式为：

$$\alpha_j|_{[x_{j-1},x_j]}=(1+2(x_j-x)l_j'(x))l_j^2(x)=\left(1+\frac{2(x_j-x)}{x_j-x_{j-1}}\right)\left(\frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}\right)^2,$$
$$\alpha_j|_{[x_j,x_{j+1}]}(1+2(x_j-x)l_j'(x))l_j^2(x)=\left(1+\frac{2(x_j-x)}{x_j-x_{j+1}}\right)\left(\frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}\right)^2,$$

    这样：

$$I_h(x)=\sum_{j=0}^n[f_j\alpha_j(x)+m_j\beta_j(x)].$$

  - 分段样条插值

    以三次为例：共有n个小区间，每个小区间上确定4个自由度，有$4n$自由度

    约束条件：每个节点处满足插值条件——$n+1$限制；每个内部节点处要求**二阶连续可微**，也就是函数值、一阶导、二阶导都要相等，$3(n-1)$限制

    还剩下$4n-n-1-3n+3=2$个自由度，因此还需要两个边界条件. 可以选择：

    - I型边界条件（端点一阶导数）
    - II型边界条件（端点二阶导数）
    - 周期边界条件（一阶导、二阶导分别相等）

    求解方法：由于三次样条是分段三次多项式，根据前面求出的线性空间：

$$\mathfrak{S}=\{\sum_{j=0}^n[f_j\alpha_j+m_j\beta_j]:f_j\in\mathbb{R},m_j\in\mathbb{R}\}$$

    由插值条件可以给出f_j，如何求出m_j？要用到二阶连续可微性. 回忆基函数支集性质：

$$S|_{[x_k,x_{k+1}]}=f_k\alpha_k+f_{k+1}\alpha_{k+1}+m_k\beta_k+m_{k+1}\beta_{k+1}.$$

    代入二阶导数连续性条件+边界条件可得——转角方程

    代入一阶导数连续性条件+边界条件可得——三弯矩方程

函数逼近和数据拟合

- 最佳一致逼近
  - 定义：称

    $$p_n^* = \mathrm{argmin}_{p_n \in \mathcal{P}_n} \Delta(f, p_n).$$

    其中

    $$\Delta(f, p_n) := \|f - p_n\|_\infty$$

    为f在$[a,b]$上的最佳一致逼近n次多项式

    （存在性由$\mathbb{R}^{n+1}$中闭球的紧性保证）
  - Tchebyshev定理：$p^* \in \mathcal{P}_n$，则p^*是最佳一致逼近当且仅当它“至少”有$n+2$个轮流为正负的偏差点

    推论——必要条件：若为最佳一致逼近，则必然同时有正的和负的偏差点

    推论——存在唯一性：**最佳一致逼近多项式是唯一的**

    （如果不唯一，考虑$\frac{p+q}{2}$，则通过计算可得必有$p(x_k) = q(x_k)$对所有偏差点都成立，因此$p-q$有$n+2$个不同的零点，所以$p=q$）

    【例题】设$f \in C[-a,a]$，$p_n(x) \in \mathcal{P}_n$是f的最佳一致逼近多项式，证明当f是偶（奇）函数时，p_n也是偶（奇）函数.

    【证明】考虑$q(x) = \frac{1}{2}(p(x) + p(-x))$，则对任何$x \in [-a,a]$我们有：

    $$|f(x) - q(x)| = \left| \frac{f(x) + f(-x)}{2} - \frac{p(x) + p(-x)}{2} \right| \le \sup_{x \in [-a,a]} \left| \frac{f(x) - p(x)}{2} \right| + \sup \left| \frac{f(-x) - p(-x)}{2} \right| \le \|f - p\|_\infty$$

    所以q也是f的最佳一致逼近多项式，根据最佳一直逼近多项式的唯一性可知$p = q$，因此p是偶函数.

    对于奇函数，考虑$q(x) = \frac{1}{2}(p(x) - p(-x))$即可.
- 最佳平方逼近
  - 最佳平方逼近存在唯一。事实上，我们需要求解的是：

    $$f^* = P_{\mathfrak{S}_n} f = \mathrm{argmin}_{g \in \mathfrak{S}_n} \|f - g\|_2$$

    其中二范数由带权内积$(\cdot,\cdot)_\rho$诱导

    根据Hilbert空间$L_\rho^2[a,b]$中的**投影定理**可知，这等价于求解法方程（f^*在$\mathfrak{S}_n$中极小化均方误差当且仅当$f - f^*$垂直于每一个$\mathfrak{S}_n$中的基向量）：

    $$(f - f^*, \varphi_k)_\rho = 0, \quad \text{i.e.} \quad (f, \varphi_k) = \sum_{\ell=1}^n a_\ell (\varphi_\ell, \varphi_k) = \sum_{\ell=1}^n a_\ell (\varphi_k, \varphi_\ell), \quad \forall k$$

    写成矩阵方程的形式为

    $$\mathbf{G}\mathbf{a}^* = \mathbf{f}.$$

    其中$\mathbf{G}$是Gram矩阵，如果使用正交多项式，则$\mathbf{G}$是对角矩阵！
  - 正交多项式：由$(1, x, x^2, \cdots)$经过G-S正交化得到的一组向量

    基本性质：
    - $\{\varphi_j\}_{j=0}^n$是$\mathcal{P}_n$一组基
    - $\varphi_n \perp \mathcal{P}_{n-1}$
    - 令$\varphi_{-1}(x) \equiv 0$，则有递推关系：

      $$\varphi_{n+1}(x) = (\alpha_n x + \beta_n)\varphi_n(x) + \gamma_{n-1}\varphi_{n-1}(x).$$

      其中$\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$是一些常数，可以通过做内积确定（可以用来推导一些递推关系）

      （即：第$n+1$个正交多项式总是可以用$x\varphi_n(x)$，$\varphi_n(x)$和$\varphi_{n-1}(x)$的线性组合生成）
    - j次正交多项式必然恰好有j个单根
    - Christoffel-Darboux恒等式：

      $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty$正交多项式，$a_n$为$\varphi_n$首项系数，$(\varphi_j, \varphi_k) = \delta_{jk}$（标准正交），令$\alpha_n = a_{n+1}/a_n$，则：

$$(x-y)\sum_{k=0}^{n}\varphi_k(x)\varphi_k(y)=\frac{1}{\alpha_n}[\varphi_{n+1}(x)\varphi_n(y)-\varphi_{n+1}(y)\varphi_n(x)]$$

- Legendre多项式：$[-1,1]$上关于权函数1的正交多项式 $\propto \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^n]$

  Tchebyshev多项式：$[-1,1]$上关于权函数$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$的正交多项式 **可以表示成**$T_n(x)=\cos(n\arccos x)$（用$\cos n\theta$的形式可以推出很多关于Tchebyshev多项式的递推式）

  Tchebyshev多项式的首项系数为2^{n-1}

  【证明】$T_{n+1}(x)=\cos(n+1)\theta=\cos n\theta$，$T_{n-1}(x)=\cos(n-1)\theta$，所以$T_{n+1}(x)+T_{n-1}(x)=2\cos\theta\cos n\theta=2xT_n(x)$

  因为$T_0=1$，所以T_n的首项系数为2^{n-1}

  Laguerre多项式：$[0,+\infty)$上关于权函数e^{-x}的正交多项式

  Hermite多项式：$(-\infty,+\infty)$上关于e^{-x^2}的正交多项式

- 广义Fourier级数
  - Fourier级数，Bessel不等式，Parseval等式
  - 【定理】首项系数为1的Legendre多项式是所有n次首1多项式中二范数最小的

    【证明】任取$q_n(x)=x^n+q_{n-1}(x)\in\mathcal{P}_n$是首一多项式，可以重新写成$q_n(x)=p_n(x)+\tilde{q}_{n-1}(x)$，其中$p_n(x)$是$n$次首一Legendre多项式，$\tilde{q}_{n-1}=x^n-p_n+q_{n-1}\in\mathcal{P}_{n-1}$，根据$p_n\perp\mathcal{P}_{n-1}$可知$\|q_n\|\geq\|p_n\|$.
  - 插值余项最小化：由于带权二范数意义下用截断Tchebyshev级数可以近似对函数**一致逼近**，所以选择差值节点为Tchebyshev多项式的零点时，可以使$\|\omega\|_\infty$近似最小
- 有理逼近

$$R_{nm}(x)=\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}=\frac{\sum_{k=0}^{n}a_kx^k}{\sum_{k=0}^{m}b_kx^k}$$

计算方法：

首先求Taylor展式，确定前$n+m$个系数；求解线性方程组$Hb=c$，其中：

$$H=\begin{pmatrix}c_n & \cdots & c_{n-m+1}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ c_{n+m-1} & \cdots & c_n\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_m\end{pmatrix},\quad c=-\begin{pmatrix}c_{n+1}\\ \vdots\\ c_{n+m}\end{pmatrix}$$

其中c_j就是第i个Taylor展开的系数，然后再按照公式：

$$a_k=c_k+b_1c_{k-1}+b_2c_{k-2}+\cdots+b_kc_0$$

计算每个a_k

例题：

写出 $f(x)=\log(1+x)$ 在零点附近的 Taylor 展式：

$$f(x)=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-x)^k}{k},$$

所以：

$$c_0=0,\quad c_1=1,\quad c_2=-\frac{1}{2},\quad c_3=\frac{1}{3},$$
$$c_4=-\frac{1}{4},\quad c_5=\frac{1}{5},\quad c_6=-\frac{1}{6},$$

求解 $(3,3)$Pade 逼近，也就是要求解线性方程组 $H\mathbf{b}=\mathbf{c}$，其中：

$$H=\begin{pmatrix}c_3 & c_2 & c_1\\ c_4 & c_3 & c_2\\ c_5 & c_4 & c_3\end{pmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix},\quad \mathbf{c}=-\begin{pmatrix}c_4\\ c_5\\ c_6\end{pmatrix}.$$

解得：

$$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ \frac{3}{5}\\ \frac{1}{20}\end{pmatrix}.$$

所以：

$$a_0=c_0=0,$$

$$a_1=c_1=1,$$

$$a_2=c_2+\sum_{j=0}^{1}c_jb_{2-j}=c_2+c_0b_2+c_1b_1=1,$$

$$a_3=c_3+\sum_{j=0}^{2}c_jb_{3-j}=c_3+c_0b_3+c_1b_2+c_2b_1=\frac{11}{60}.$$

根据定义，$(3,3)$Pade 逼近的表达式为：

$$R_{33}(x)=\frac{\sum_{k=0}^{3}a_kx^k}{\sum_{k=0}^{3}b_kx^k}=\frac{0+x+x^2+\frac{11}{60}x^3}{1+\frac{3}{2}x+\frac{3}{5}x^2+\frac{1}{20}x^3}=\frac{11x^3+60x^2+60x}{3x^3+36x^2+90x+60}.$$

- 最小二乘法：求解正则方程$A^TAx=b$

  均方误差（MSE）：$MSE=\frac{1}{n}\|b-Ax\|_2^2$
- 周期函数的最佳平方逼近：Fourier展开

  离散情形：离散Fourier变换和快速Fourier变换

  - $\{e^{2\pi inx}\}$是$\mathcal{C}[0,1]$上的标准正交向量组
  - 离散化：$\mathcal{C}[0,1]\sim S=\{\frac{0}{n},\cdots,\frac{n-1}{n}\}$.
  - $\mathbb{C}^S\simeq\mathbb{C}^n$.
  - 离散内积：$\langle f,g\rangle=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\overline{f(\frac{k}{n})}g(\frac{k}{n})$，其中$f,g\in\mathbb{C}^S$.
  - 离散指数函数：$e^{2\pi inx}\sim e^{2\pi i\frac{k}{n}}$，记$n$次本源单位根$\omega_n=e^{\frac{2\pi i}{n}}$，则满足

    $\omega_n^n=1,\omega_n^k\neq1,\forall k=0,1,2,\cdots,n-1.$

    这时候$e^{2\pi i\frac{k}{n}}$看成是$\mathbb{C}^S$中的向量，它等同于$\left(1,\omega_n^k,\omega_n^{2k},\cdots,\omega_n^{(n-1)k}\right)^T$.

    Fourier矩阵$\mathcal{F}_n=\begin{pmatrix}1&1&1&1&\cdots&1\\1&\omega&\omega^2&\omega^3&\cdots&\omega^{n-1}\\1&\omega^2&\omega^4&\omega^6&\cdots&\omega^{2(n-1)}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&\omega^{n-1}&\omega^{2(n-1)}&\omega^{3(n-1)}&\cdots&\omega^{(n-1)^2}\end{pmatrix}$

    $\mathcal{F}_n$尚非单位正交，而是满足$\overline{\mathcal{F}}_n^T\mathcal{F}_n=n\mathbf{I}_n$.
  - 离散Fourier变换（DFT）

    $f=\hat{f}(0)\mathbf{e}_0+\cdots+\hat{f}(n-1)\mathbf{e}_{n-1}$，$f\in\mathbb{C}^S$.

    因为$\hat{f}(k)=\langle\mathbf{e}_k,f\rangle_{\mathbb{C}^S}=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\overline{\omega_n^{jk}}f_j$

    $$\begin{pmatrix}\hat{f}(0)\\ \vdots\\ \hat{f}(n-1)\end{pmatrix}=\frac{1}{n}\overline{\mathcal{F}}_n\begin{pmatrix}f(0)\\ \vdots\\ f(n-1)\end{pmatrix}$$
  - 快速Fourier变换（FFT）

    DFT：$\mathcal{O}(n^2)$.

    FFT：考虑矩阵分解，时间复杂度为$\mathcal{O}(n\log n)$.

求解非线性方程

- 二分迭代法
- 不动点迭代法：

  【定理】

压缩映射：设$\varphi: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，如果存在$C \in (0,1)$使得$\forall x, y \in D$都有$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \le C\|x - y\|$，则称$\varphi$为压缩映射

如果φ在闭集D上是压缩映射，且$\varphi(D) \subset D$，则φ在D上有唯一不动点. 而且，任取$x_0 \in D$，迭代生成$\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$，则$x_n \to x^*$，其中x^*是φ的唯一不动点

- 高阶格式的构造：
  - 在$\alpha = \mathcal{F}(0)$处对f的反函数$\mathcal{F}$Taylor展开，截断可得

$$\varphi_p(x) = x + \sum_{j=1}^{p-1} \frac{[-f(x)]^j}{j!} \mathcal{F}^{(j)}(f(x))$$

于是有：

$$\varepsilon_{k+1} = x_{k+1} - \alpha = \varphi_P(x_k) - \alpha = -\frac{\mathcal{F}^{(p)}(\xi)}{p!}[-f(x_k)]^p.$$

而$f(x_k) = f(x_k - \alpha + \alpha) = f(\alpha) + f'(\eta)(x_k - \alpha) = f'(\eta)(x_k - \alpha)$，所以：

$$|\varepsilon_{k+1}| \le \frac{\left\|\mathcal{F}^{(p)}\right\|_\infty \|f'\|_\infty}{p!} |\varepsilon_k|^p$$

也就是具有p阶格式

  - 注：对$x = \mathcal{F}(f(x))$两边求导可得每个$\mathcal{F}^{(j)}(f(x))$，例如：

$$1 = \mathcal{F}'(f(x))f'(x)$$

所以：

$$\mathcal{F}'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}, \quad \varphi_1(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

此即Newton迭代格式

- Aitken加速：设有一个迭代格式$\varphi(x)$，初值x_0，产生的序列为$\{x_k\}$，在计算完x_1, x_2之后，按照：

$$\widetilde{x}_0 = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0}.$$

由此可以利用x_1和x_2修正x_0

- **Steffensen加速**：将Aitken加速与不动点迭代相结合可以得到Steffensen加速格式：

$$\psi(x) = x - \frac{(\varphi(x) - x)^2}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x}$$

【定理】设$\varphi'(\alpha) \ne 1$，则Steffensen加速格式至少是二阶收敛的（如果$\varphi'(\alpha) = 1$，则为一阶收敛的）

【例题】$\varphi(x) = x + x^5$，有一个不动点$\varphi(0) = 0$. 如果用它本身进行迭代，设初值$x_0 \ne 0$，则

$$|\varepsilon_{k+1}| = |x_{k+1} - 0| = |x_k + x_k^5| > |x_k| + |x_k|^5 > |x_k| = |\varepsilon_k|, \quad k = 0, 1, \cdots$$

因为$|\varepsilon_0| = |x_0 - 0| > 0$，所以$\lim_{k\to\infty} \varepsilon_k \ne 0$，所以本身不收敛.

但是，如果做Steffensen加速：

$$\psi(x) = x - \frac{x^{10}}{(x^5+1)^5 + x^5 + 1 - 2x^5 - 2 + x} = x - \frac{x^9}{x^{24} + 5x^{19} + 10x^{14} + 10x^9 + 4x^4 + 1}$$

设$x_n > 0$，则容易看出$x_{n+1} = \psi(x_n) < x_n$且$x_{n+1} > 0$；设$x_n < 0$，则容易看出$x_{n+1} = \psi(x_n) > x_n$，且$x_{n+1} < 0$；所以$\{x_n\}$是单调下降且有下界或单调上升且有上界的序列，所以$\{x_n\}$必然有极限，对$x_{n+1} = \psi(x_n)$两边同时取极限立刻得到$\lim_n x_n = 0$.

- Newton迭代法

根据【高阶迭代格式构造】的讨论，Newton迭代法是二阶格式

【定理】设$f \in C^2[a,b]$，且$f' \ne 0$，$f''(x)$不变号，且满足：

令c是a或b中满足$|f'(c)| = \min(|f'(a)|, |f'(b)|)$的值，且满足$\frac{|f(c)|}{b-a} \le |f'(c)|$

则任取$x_0 \in [a,b]$，Newton迭代法二阶收敛到f的根α

【例题】设$f \in C^2[a,b]$，$f'(x) > 0$，$f''(x) < 0$，$\forall x \in [a,b]$. 且$f(\alpha) = 0$，$\alpha \in (a,b)$. 试证明：使用Newton迭代，任取$x_0 \in [a, \alpha]$，都有迭代序列$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$收敛到α.

【解答】

- 因为$f'(x)>0$，$\forall x\in[a,b]$，所以f在$[a,b]$上严格单调递增，所以$f(a)<0$，$f(b)>0$，而且α是f在$[a,b]$上的唯一零点.
- $x_{k+1}=x_k-[f'(x_k)]^{-1}f(x_k)$. 如果$x_k\in[a,\alpha]$，则$f(x_k)\le 0$，$f'(x_k)>0$，所以$x_{k+1}\ge x_k$，因此$\{x_k\}$是单调递增的序列. 另一方面，令$\varphi(x)=x-[f'(x)]^{-1}f(x)$，则$\varphi'(x)=\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$. 所以$\varphi'(x)\ge 0$在$[a,\alpha]$上成立，所以$x_{k+1}=\varphi(x_k)\le\varphi(\alpha)=\alpha$，所以$x_{k+1}\in[a,\alpha]$. 根据归纳法可知，如果$x_0\in[a,\alpha]$，则$x_k\in[a,\alpha]$对所有$k$都成立，而且这还说明$x_k$是单调递增有上界的序列，因此必然收敛到某个$x^*$.
- 对$x_{k+1}=x_k-[f'(x_k)]^{-1}f(x_k)$两边同时取极限可得$x^*=x^*-[f'(x^*)]^{-1}f(x^*)$，根据$f'(x)>0$恒成立可知$f(x^*)=0$，再根据$\alpha$是$(a,b)$上唯一的零点可知$x^*=\alpha$，也即$x_k$收敛到$\alpha$.

- 重根迭代法：考虑$\mu(x)=\frac{f(x)}{f'(x)}$，则$\alpha$必是$\mu$的单根

  对μNewton迭代：$\varphi(x)=x-\frac{\mu(x)}{\mu'(x)}=x-\frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2-f(x)f''(x)}$.

  渐进二阶格式：$\varphi(x)=x-h(x)\frac{f(x)}{f'(x)}=\varphi(x)=x-h(x)\frac{f(x)}{f'(x)}\equiv x-\frac{f(x)\ln|f(x)|}{f'(x)(\ln|f(x)|-\ln|f'(x)|)}$

  这里$h(x)=\frac{|\ln f|}{|\ln\mu|}$，它渐进收敛到$m$（重数）