# MAGATARTÁS PROBLÉMÁK KÉRDŐíV (BPI) Johannes Rojahn Ph.D.

A beteg neve ( ha ne	em egy	ezik bel	e,akkor röv	vidités va	gy jelige)	):					
1.A kérdőív felvétel	ének da	átuma:	é	v	hó	nap					
2.Hely: melyik hely	ségben	milyen,	intézmény	ben törté	nt a felvé	ítel:					
3.Ez adik fo 4.A beteg szül.:	elvett k	érdőív a	z adott hel év	yen:	hó		nap				
5.Nem	1	fiú	2	lán	у						
6.Nemzetiség: 8roma	1mag	gyar	2német/s 9 n			3szlovák (a megfel	4 szlovén előt kérjük beka	5romarikázni)		7horvát	
7.Intellektus (IQ):	1 4		(80-130) besen súlyc	2 os MR (3:			os MR (20-34)	-	e MR (50-69)		
IQ:számszer	ű érték	ét kérjül	k ideírni			(orvosi vag	y gyógyped.dol	kumentá	ció alapján)		
Elvégzett legmagasa	abb isk	olai vég	zettség:								
_	VAGY FNO s		GYPEDAC	SÓGIAI I	OOKUM	ENTÁCIÓBA	N FELTÜNTE	TETT ös	sszes diagnózisai (A b	etegség neve+ BN	10
		,						5	pszichológus		
AZ INFORMÁLÓ/	VÁLAS	SZADÓ						6	gyógypedagógus		
9.Milyen viszonyba	n van a	betegge	el? 1	bio	lógiai sz	ülő		7	szociális munkás,es	setmenedzser	
			2		ám/nevel	őszülő		8	szakápoló		
			3	ner	n szülő d	le rokon		9	más		
			4	g01	ndozóinte	ézeti tanár/nev	elő				

10. Mennyi időt tölt naponta a válaszadó a beteggel?

11. Mióta ismeri a beteget a válaszadó?

BPI eredmény összegzés		
Alskálák	Gyakorisági	Súlyossági pontszám
	pontszám	
Önsértő skála (SIB)		
Sztereotyp magatartás		
Agresszív/destruktív magatartás		

12. Viselkedészavara van a gyereknek? (agressziv másokkal, vagy tárgyakkal,engedetlen) igen 2 nem 1

#### INSTRUKCIÓK

A következő két lapon általános definíciókat fog találni,amit a magatartásproblémák három típusának leírása követ: őnsértő magatartás (1-15),sztereotyp-ismétlődő magatartás (16-40) és agresszív/destruktív magatartás (41-52).Jelölje be,hogy ennél az egyénnél melyik magatartást észlelte **az utóbbi 2 hónapban** úgy,hogy karikázza be a megfelelő számot a) milyen gyakran fordul elő általában a leírt magatartás (gyakoriság) és milyen nagyságú problémát jelent a magatartás (súlyosság).Ha a magatartás az utóbbi két hónapban soha nem volt észlelhető,a 0 számot kell beirni.

#### **PONTOZÁS**

Alább talál 3 kérdést,hogyan kell pontozni egy Jane nevű személy magatartását.

- 1. Soha nem látták,hogy Jane megharapná magát (húzza be a "Soha"-t vagy a 0-át az egyes kérdésre)
- 2. Jane viszont üti,pofozza a saját arcát. Ha nem figyelik, szinte állandóan csinálja (húzza be az "Óránként" vagy a 4-es számot a gyakorisági skálán a kettes kérdésnél). Ez a magatartás súlyos sérülést okoz neki és Jane-nak vastag hegei vannak az arcán (húzza be a "súlyos" vagy 3-as minősítést a súlyossági skálán).
- 3.Jane-ről azt is tudni,hogy üti a combjait is,ez ritkábban fordul elő,kb. minden ötödik-tizedik napon (húzza be a "heti" vagy 2-est a gyakorisági skálán a hármas kérdésnél).Ugyanakkor ez a magatartás nagy problémát jelent,mert jelentős zúzódásokat okoz (húzza be a "súlyos" vagy 3-as fokozatot a súlyossági skálán)
- 4. Az alskálák pontjait úgy kapjuk meg,hogy összeadjuk a jelölt cellákban a számokat külön a gyakorisági és a súlyossági skálán.

**PÉLDA A PONTOZÁSRA.**A BETEGRE JELLEMZŐ SZÁMOT BEKARIKÁZZUK VAGY BEIKSZELJÜK,ÉS ALUL AZ ÖSSZEADOTT SZÁMOT BEIRJUK.

	,	G	KO	RI	SÁG		SÚ	LYOS	SÁG
		Y							
		A				,			
		So	Ha-	He-	Na-	Órán-	Eny-	Köze-	Sú-
		ha	von	ten	pon	ként	he	pes	lyos
			ta	te	ta				
1	Önharapás (olyan	0	1	2	3	4	1	2	3
	erős,hogy egy ideig								
	lehet látni a fog	X							
	benyomatát,								
	vérömleny vagy a bőr								
	felhasadása fordulhat								
	elő)								
2	A fejét üti kézzel vagy	0	1	2	3	4	1	2	3
	más testrészé-vel								
	(pofozza					X			X
	magát,térdével üti az								
	arcát) vagy más								
	tárggyal (falhoz csapja								
	a fejét,játékkal üti a								
2	fejét stb.)	0	1	12	2	4	1	2	2
3	Fejen kivüli testrészt üt	0	1	2	3	4	1	2	3
	saját kezével vagy más								
	testrészével (boxolja magát,karját vagy			X					X
	combjait üti,csapkodja)								
	A gyakorisági és					6			6
	A gyakorisági és súlyossági					U			O
	összpontszám								
	USSZPUHISZAIII					_			]

## ÖNSÉRTŐ MAGATARTÁS

Az önsértő magatartás károsodást okoz a személy saját testén: pl. vagy megtörtént,vagy várható,ha

kezeletlen marad. Az önsértés (SIB) ismételten ugyanúgy futhat le és jellemző a személyre

	Ciction marad.7 12 onserte		GYA	KO	RI	SÁG	SÚ	LYOS	SÁG
		soha	havonta	hetente	naponta	óránként	enyhe	mérsékelt	Súlyos
1	Önharapás (olyan erős,hogy egy ideig lehet látni a fog benyomatát,	0	1	2	3	4	1	2	3
2	A fejét üti kézzel vagy más testrészé-vel (pofozza magát,térdével üti az arcát) vagy más tárggyal (falhoz csapja a fejét,játékkal üti a fejét stb.)	0	1	2	3	4	1	2	3
3	Fejen kivüli testrészt üt saját kezével vagy más testrészével vagy tárggyal (boxolja magát,karját vagy combjait üti, csapkodja),bottal,ütővel üti magát,falat boxolja	0	1	2	3	4	1	2	3
4	Bőr karmolás olyan erősen,hogy a bőr vörössé válik,ami látható,vagy felhasad	0	1	2	3	4	1	2	3
5	Hányás,kérődzés (akaratlagos vissza- kérődzése a lenyelt ételnek)	0	1	2	3	4	1	2	3

6	Ön-csípés (olyan erősen,hogy a bőr vörössé válik és felhasadhat a bőr)	0	1	2	3	4	1	2	3
7	Pica: szájába vesz vagy lenyel olyan dolgokat,amiket egészségügyi vagy higiénikus okból nem teszünk: széklet, fű,papír,szemét,haj	0	1	2	3	4	1	2	3
8	Tárgyakat tesz testnyilásba (orr,fül,végbél stb.)	0	1	2	3	4	1	2	3
9	Kihúz,kitép körmöt (kéz,láb)	0	1	2	3	4	1	2	3
10	Testnyilásokba teszi ujját ()	0	1	2	3	4	1	2	3
11	Annyi levegőt nyel,hogy megnő a hasa	0	1	2	3	4	1	2	3
12	Hajtépkedés (hajcsomókat tép ki)	0	1	2	3	4	1	2	3
13	Túl sokat iszik (több mint 3 litert naponta)	0	1	2	3	4	1	2	3
14	Fogcsikorgatás	0	1	2	3	4	1	2	3
15	Más	0	1	2	3	4	1	2	3
	Pontszám összesen	gya	ko	ri	ság:		súlyos	ság:	

A két oldal (4-5) gyakorisági és súlyossági pontjait kell összeadni

## SZEREOTIP MAGATARTÁS

A sztereotip magatartás szokatlannak,furcsának vagy célszerűtlennek tűnik az átlagember számára. Akaratlagosak,ismételten ugyanúgy folynak le és jellemzőek a személyre, de NEM okoznak fizikai károsodást

		soha	havonta	hetente	naponta	óránként	enyhe	mérsékelt	súlyos
16	Hintázik	0	1	2	3	4	1	2	3
	előre/hátra								
17	Tárgyakat	0	1	2	3	4	1	2	3
	szimatol								
18	Forgatja testét	0	1	2	3	4	1	2	3
19	Lengeti,rázza	0	1	2	3	4	1	2	3
	karjait								
20	Fejét forgatja	0	1	2	3	4	1	2	3
21	Pörög,forog	0	1	2	3	4	1	2	3
	egy hely körül								
22	Ismételt	0	1	2	3	4	1	2	3
	testmozgatással								
	van elfoglalva								
23	lépeget	0	1	2	3	4	1	2	3
24	Pörget dolgokat	0	1	2	3	4	1	2	3
25	Ismétlő	0	1	2	3	4	1	2	3
	kézmozdulatai								
	vannak								
26	Sikit, üvölt	0	1	2	3	4	1	2	3
27	Saját testét	0	1	2	3	4	1	2	3
	szagolgatja								
28	Ugrándozás	0	1	2	3	4	1	2	3

29	Pörget dolgokat	0	1	2	3	4	1	2	3
30	Rohangálási	0	1	2	3	4	1	2	3
	rohamok								
31	Bonyolult kéz	0	1	2	3	4	1	2	3
	és ujjmozgá-								
	sokba merül								
32	Dolgokkal	0	1	2	3	4	1	2	3
	ismételten								
	foglalkozik	_			_				
33	Hosszantartó	0	1	2	3	4	1	2	3
	ujjmozgások	_			_			_	_
34	Magát	0	1	2	3	4	1	2	3
	dörgöli,dörzsöli	_		_	_			_	_
35	Hosszan	0	1	2	3	4	1	2	3
	bámulja kezét								
	vagy tárgyakat								
36	Bizarr	0	1	2	3	4	1	2	3
	testtartásokat								
	tart fenn	0				4	4		2
37	Tapsol a	0	1	2	3	4	1	2	3
	kezeivel	0				4	4		2
38	Grimaszol	0	1	2	3	4	1	2	3
39	Kezét lengeti	0	1	2	3	4	1	2	3
40	Más	0	1	2	3	4	1	2	3
	Pontszám	gya	ko	ri	ság		súlyos	Ság	
	össz.								

A két oldal (6-7) gyakorisági és súlyossági pontjait kell összeadni

## AGRESSZIV MAGATARTÁS

Az agresszív és destruktív magatartás nyilt akciók vagy olyan nyilt támadások melyek más személyek vagy tárgyak ellen irányulnak. Ismételten ugyanolyan módon zajlanak le és jellemzőek a személyre

		soha	havonta	hetente	naponta	óránként	enyhe	mérsékelt	súlyos
41	Üt másokat	0	1	2	3	4	1	2	3
42	Rúg másokat	0	1	2	3	4	1	2	3
43	Lökdös másokat	0	1	2	3	4	1	2	3
44	Harap másokat	0	1	2	3	4	1	2	3
45	Markol,húz másokat	0	1	2	3	4	1	2	3
46	Karmol másokat	0	1	2	3	4	1	2	3
47	Belecsíp másokba	0	1	2	3	4	1	2	3
48	Köpköd másokra	0	1	2	3	4	1	2	3
49	Szóban bántalmaz másokat	0	1	2	3	4	1	2	3
50	Rongál dolgokat (ruhát tép,székeket dobál,asztalt összezúz)	0	1	2	3	4	1	2	3
51	Aljas,kegyetlen (elveszi más játékát,ételét, verekszik)	0	1	2	3	4	1	2	3
52	Más	0	1	2	3	4	1	2	3
	Összesen		Gyako	riság	Összp.		súlyos	ság:	