

# PHY5410 FA22 HW11

Haoran Sun (haoransun@link.cuhk.edu.cn)

**Problem 1** (1.1). Denote

$$|i_1, \dots, i_N\rangle = \varphi_{i_1}(x_1) \cdots \varphi_{i_N}(x_N)$$

Assume this basis is complete

$$\sum_{i_1, \dots, i_N} |i_1, \dots, i_N\rangle \langle i_1, \dots, i_N| = 1$$

Then  $\forall \psi_{s/a}$ , we have

$$\begin{aligned} \sum_{i_1, \dots, i_N} |i_1, \dots, i_N\rangle \langle i_1, \dots, i_N| \psi_{s/a} &= \psi_{s/a} \\ \sum_{i_1, \dots, i_N} \frac{1}{\sqrt{N!}} S_{\pm} |i_1, \dots, i_N\rangle \langle i_1, \dots, i_N| \psi_{s/a} &= \frac{1}{\sqrt{N!}} S_{\pm} \psi_{s/a} \\ \sum_{i_1, \dots, i_N} \frac{1}{\sqrt{N!}} S_{\pm} |i_1, \dots, i_N\rangle \langle i_1, \dots, i_N| \frac{1}{N!} S_{\pm}^{\dagger} S_{\pm} \psi_{s/a} &= \psi_{s/a} \\ \sum_{i_1, \dots, i_N} \frac{1}{N!} S_{\pm} |i_1, \dots, i_N\rangle \langle i_1, \dots, i_N| S_{\pm}^{\dagger} \psi_{s/a} &= \psi_{s/a} \end{aligned}$$

Thus  $S_{\pm} |i_1, \dots, i_N\rangle$  complete  $\forall \psi_{s/a}$ .

$$\sum_{i_1, \dots, i_N} \frac{1}{N!} S_{\pm} |i_1, \dots, i_N\rangle \langle i_1, \dots, i_N| S_{\pm}^{\dagger} = 1$$

**Problem 2** (1.3).

(a) Since  $[a, (a^{\dagger})^m] = m(a^{\dagger})^{m-1}$

$$ae^{\alpha a^{\dagger}} = a \sum_n \frac{1}{n!} (\alpha a^{\dagger})^n = \frac{\alpha^n}{n!} a (a^{\dagger})^n = \sum_n \frac{\alpha^n}{n!} [n(a^{\dagger})^{n-1} + (a^{\dagger})^n a] = \alpha e^{\alpha a^{\dagger}} + e^{\alpha a^{\dagger}} a \Rightarrow [a, e^{\alpha a^{\dagger}}] = \alpha e^{\alpha a^{\dagger}}$$

(b) Note that

$$e^{-\alpha a^{\dagger}} a e^{\alpha a^{\dagger}} = e^{-\alpha a^{\dagger}} [e^{\alpha a^{\dagger}} a + \alpha e^{\alpha a^{\dagger}}] = a + \alpha$$

(c) Note that

$$e^{-\alpha a^{\dagger}} \beta a e^{\alpha a^{\dagger}} = \beta a + \beta \alpha \Rightarrow e^{-\alpha a^{\dagger}} (\beta a) e^{\alpha a^{\dagger}} = (\beta a + \beta \alpha)^n$$

Hence

$$e^{-\alpha a^{\dagger}} e^{\beta \alpha} e^{\alpha a^{\dagger}} = \sum_n \frac{1}{n!} (\beta a + \beta \alpha)^n = e^{\beta a + \beta \alpha} = e^{\beta a} e^{\beta \alpha}$$

(d) Since

$$e^{\alpha a^{\dagger}} a = \sum_n \frac{1}{n!} \alpha^n (a^{\dagger} a)^n a = \sum_n \frac{1}{n!} \alpha^n (a^{\dagger} a)^{n-1} a (a^{\dagger} a - 1) = \sum_n \frac{1}{n!} \alpha^n a (a^{\dagger} a - 1)^n = a e^{\alpha (a^{\dagger} a - 1)}$$

Hence

$$e^{\alpha a^{\dagger}} a e^{-\alpha a^{\dagger}} = a e^{\alpha a^{\dagger}} e^{-\alpha} a e^{-\alpha a^{\dagger}} = a e^{-\alpha}$$

**Problem 3** (1.4). There are two methods to solve the problem

(i) Using the differential relation

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}a_i(t) &= \frac{iHt}{\hbar}e^{iHt/\hbar}a_i e^{-iHt/\hbar} - e^{iHt/\hbar}a_i \frac{iHt}{\hbar}e^{-iHt/\hbar} \\
 &= \frac{iHt}{\hbar}e^{iHt/\hbar}a_i e^{-iHt/\hbar} - \frac{iHt}{\hbar}e^{iHt/\hbar}a_i e^{-iHt/\hbar} - \frac{iHt}{\hbar}e^{iHt/\hbar}\frac{i\epsilon_i t}{\hbar}a_i e^{-iHt/\hbar} \\
 &= -\frac{i\epsilon_i t}{\hbar}a_i \\
 \Rightarrow a_i(t) &= a_i(0)e^{-i\epsilon_i t/\hbar} = a_i e^{-i\epsilon_i t/\hbar}
 \end{aligned}$$

(ii) Using the Bose commutation relation  $[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$  and the equation from Problem 2, we have

$$a_i(t) = e^{i\epsilon_i t a_i^\dagger a_i / \hbar} a_i e^{-i\epsilon_i t a_i^\dagger a_i / \hbar} = a_i e^{-i\epsilon_i t / \hbar}$$