

ภญ.นิลกมล ภูมิภมร, พญ.พัชต์เพ็ญ สิริคุตต์ และ พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี



นอกจากนี้ยังเคยมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายการยาที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพิษต่อไตและแนวทางการติดตามผลระหว่างการทำงานของไทย และผู้ที่รับผิดชอบในการรายงานอาจเป็นระบบซึ่งการพัฒนาคอความรู้นำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขยប់กั้นความเสี่ยงและวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันได้ในระยะแรกที่ยังสามารถรักษาแก้ไขให้การทำงานของไตคืนกลับดังเดิมได้ (reversible)






- วิธีดำเนินงาน

- ชุดความรู้การติดตามค่าการทำงานของไต
- ชุดความรู้เรื่องการปรับขนาดยาในผู้ป่วยไตบกพร่อง

- output : ข้อมูลยา 9 รายการได้แก่ acyclovir, amikacin, vancomycin B, ciprofloxacin, colistin, gentamicin, amphotericin, liposomal amphotericin B, Trimethoprim/sulfamethoxazole

[illegible]

- อัตราการเกิด AKI ลดลง และไม่เกิด AKI stage 3
- ความถูกต้องของการปรับขนาดยาในผู้ป่วยไตบกพร่อง ร้อยละ 100
- จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการติดตามค่าการทำงานของไต ลดลง



- การได้รู้เชี่ยวชาญรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันให้เป็นผู้นำทางปฏิบัติเดียวกันในองค์กร ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้สำหรับผู้ส่งยา แก่สักรและพยาบาลที่ต้องการทำการตรวจสอบเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการใช้ยาให้กับผู้ป่วย

-การติดตามค่าการทำงานของไตยังเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อไป

-การหาวิธีแจ้งเตือนเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อไปซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีและมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป เช่นการใช้ระบบ HIS ขึ้น alert เมื่อมีการใช้ยาเหล่านี้ และให้ข้อมูลแสดงค่าเลือดครีอะตินิน (Scr) ที่ปกติตามอายุ



ติดต่อทีมงาน : neelanoi@gmail.com