Study	SMD	SE(SMD)	Standardised Mean Difference	SMD	95%–CI	Weight
Suvarna et al.	−0.5272	0.2700		−0.53	[−1.06; 0.00]	10.0%
Spick et al.	−0.3905	0.2893		−0.39	[−0.96; 0.18]	9.6%
Byeon et al.	−0.1192	0.3089		−0.12	[−0.72; 0.49]	9.3%
Sullivan et al.	−0.1152	0.2154		−0.12	[−0.54; 0.31]	11.0%
Shu−Discovery et al.	−0.0192	0.4129		−0.02	[−0.83; 0.79]	7.4%
Di et al.	0.0854	0.3933		0.09	[−0.69; 0.86]	7.8%
Shen et al.	0.7627	0.2479		0.76	[0.28; 1.25]	10.4%
Ciccosanti et al.	0.7871	0.4011		0.79	[0.00; 1.57]	7.6%
Feng et al.	0.8323	0.6060		0.83	[−0.36; 2.02]	4.9%
Overmyer et al.	0.8338	0.2226		0.83	[0.40; 1.27]	10.9%
Babacic et al.	0.8917	0.4566		0.89	[−0.00; 1.79]	6.8%
Sahin et al.	1.0270	0.6755		1.03	[−0.30; 2.35]	4.2%
Random effects model				**0.27**	**[−0.06; 0.60]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−0.82; 1.35]**	

Heterogeneity: $I^2 = 69\%$, $p < 0.01$