Study	SMD	SE(SMD)	Standardised Mean Difference	SMD	95%−CI	Weight
Babacic et al.	−0.3693	0.4422		−0.37	[−1.24; 0.50]	8.0%
Shen et al.	−0.2933	0.2405		−0.29	[−0.76; 0.18]	10.5%
Di et al.	−0.2452	0.3944		−0.25	[−1.02; 0.53]	8.6%
Sullivan et al.	−0.2081	0.2172		−0.21	[−0.63; 0.22]	10.8%
Suvarna et al.	−0.1568	0.2731		−0.16	[−0.69; 0.38]	10.1%
Spick et al.	0.1123	0.2889		0.11	[−0.45; 0.68]	9.9%
Overmyer et al.	0.1566	0.2166		0.16	[−0.27; 0.58]	10.8%
Byeon et al.	0.6421	0.4029		0.64	[−0.15; 1.43]	8.5%
Tepasse et al.	0.8037	0.4469		0.80	[−0.07; 1.68]	7.9%
Ciccosanti et al.	1.1126	0.4145		1.11	[0.30; 1.92]	8.3%
Shu−Discovery et al.	2.4121	0.5552		2.41	[1.32; 3.50]	6.6%
Random effects model				**0.28**	**[−0.14; 0.70]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−1.18; 1.74]**	

−3 −2 −1 0 1 2 3

Heterogeneity: $I^2 = 72\%$, $p < 0.01$