| Study | SMD | SE(SMD) | Standardised Mean Difference | SMD | 95%–CI | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepasse et al. | −0.9244 | 0.4220 | | −0.92 | [−1.75; −0.10] | 6.3% |
| Geyer et al. | −0.1477 | 0.1900 | | −0.15 | [−0.52; 0.22] | 31.0% |
| Shen et al. | −0.0406 | 0.2392 | | −0.04 | [−0.51; 0.43] | 19.6% |
| Di et al. | −0.0247 | 0.3788 | | −0.02 | [−0.77; 0.72] | 7.8% |
| Zhang et al. | 0.0069 | 0.2065 | | 0.01 | [−0.40; 0.41] | 26.3% |
| Feng et al. | 0.1525 | 0.5783 | | 0.15 | [−0.98; 1.29] | 3.3% |
| Babacic et al. | 0.4748 | 0.4442 | | 0.47 | [−0.40; 1.35] | 5.7% |
| **Random effects model** | | | | **−0.08** | **[−0.29; 0.13]** | **100.0%** |
| **Prediction interval** | | | | | **[−0.35; 0.19]** | |



−1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5

Heterogeneity: $I^2 = 1\%$, $p = 0.41$