

AA274A Section 1

```
In [1]: import numpy as np
import math

from scipy.integrate import quad
from scipy.optimize import minimize
import matplotlib.pyplot as plt
```

Define a sin from numpy

```
In [2]: # Define a sin function using NumPy
def sin_f(x):
    return np.sin(x)
```

Find the minimum of the sin using SciPy

```
In [3]: # Find the minimum of the function using SciPy
x0 = 0.5 #np.array([1.3, 0.7, 0.8, 1.9, 1.2])
res = minimize(sin_f, x0, method='nelder-mead', options={'xtol': 1e-8, 'disp':
True})
print("\n The minimum of sin(x) is: {}".format(res))
```

```
Optimization terminated successfully.
    Current function value: -1.000000
    Iterations: 34
    Function evaluations: 69
```

```
The minimum of sin(x) is: final_simplex: (array([[ -1.57079632],
[ -1.57079633]]), array([-1., -1.]))
    fun: -1.0
    message: 'Optimization terminated successfully.'
    nfev: 69
    nit: 34
    status: 0
    success: True
    x: array([ -1.57079632])
```

Integrate the function from [0, 1]

```
In [4]: # Integrate the function from [0; 1] using SciPy
I = quad(sin_f, 0, 1)
print("\n Integral of sin(x) from x=0..1: {}".format(I[0]))
```

```
Integral of sin(x) from x=0..1: 0.459697694132
```

Plot it

```
In [5]: # Plot the function from 0-2pi
x = np.arange(100)*math.pi / 50
y = sin_f(x)
plt.plot(x,y)
plt.title("Line plot")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("sin(x)")
plt.show()
```

