



66.5 EXFOLIATING CREAM

CB22-S11-05 | 2025 | Tẩy tế bào chết | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	-	Water/Aqua	-	55.24
A	-	EDTA-2Na	Chất càn hóa	0.05
A	-	Glycerin	Dưỡng ẩm	1.5
A	-	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	Chất HDBM Anionic	10
B	EMULIUM® DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Nhũ hóa O/W	2.5
B	-	C18 fatty acid	Làm mềm, tạo cấu trúc	4
B	-	Beeswax	Làm mềm, tạo cấu trúc	1
B	-	Cetyl alcohol	Tạo độ nhót, hỗ trợ nhũ hóa	1.5
B	-	Ethylene glycol distearate	Chất tạo ánh ngọc trai	1.5
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglyceride	Wax butter tạo cảm giác tan chảy trên da	2
C	-	Talc	Làm dày	0.7
D	NaOH 20%	Sodium hydroxide, Water	điều chỉnh pH	0.35
E	Cytobiol™ Iris A2	Propanediol (and) Aqua (and) Alcohol (and) Iris Florentina Root Extract (and) Zinc Sulfate (and) Retinyl Palmitate	Hỗ trợ trị mụn, giảm nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông	0.5
E	Bioyouth™ -Brice	Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate	Chống oxy hóa, làm trắng và phục hồi da	0.2
F	Roasted rice WS	Fragrance/Perfume rice	-	0.5
F	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.8
G1	PONCEAU 4R	Màu PONCEAU 4R 0.1%	Màu đỏ	1.8
G1	BRILLIANT BLUE FCF	Màu BRILLIANT BLUE FCF 0.1%	Màu xanh	0.36

G2	CAPB-35	Cocamidopropylbetain	Boost bột	5
H	-	Water/Aqua	-	5
H	-	Natri chloride	Điều chỉnh độ nhớt	1
K	Syloid EXP 350	Hydrated Silica 350 µm	Scrub	4
K	PUENSOMES YELLOW 02 30/39	Lactose, Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Jojoba Esters, CI 77492(Iron Oxides), Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate	Scrub tạo màu	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | 25 ± 3°C | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Water/Aqua, EDTA-2Na, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua của pha A vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | 70-80°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu B: phối hợp EMULIUM® DELTA MB, Lipocire A SG, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | 25-45°C | 2.500-3.500 rpm, 3-5 phút

Premix Talc với phần chất mang phù hợp của pha C; phân tán từ từ và đồng hóa đến khi không còn hạt vón hoặc vệt màu.

Điểm kiểm soát: Phân tán mịn, màu đồng nhất, không vón.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | 70-75°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha D: cho lần lượt NaOH 20%, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Cytobiol™ Iris A2, Bioyouth™-Brice của pha E vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha F gồm Roasted rice WS, Phenoxyethanol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

08 Chuẩn bị pha G1

Pha G1 | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha G1: cho lần lượt PONCEAU 4R, BRILLIANT BLUE FCF, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

09 Chuẩn bị pha G2

Pha G2 | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha G2: cho lần lượt CAPB-35, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

10 Chuẩn bị pha H

Pha H | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha H: cho lần lượt Water/Aqua, Natri chloride, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

11 Chuẩn bị pha K

Pha K | $70-80^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu K: phối hợp Syloid EXP 350, PUENSOMES YELLOW 02 30/39, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sập hoặc chất rắn chưa tan.

12 Nhũ hóa

Pha chính | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

13 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.