



Anti-Stretchmark Lotion

CB23-S12-03 | 2023 | Chống lão hóa & săn chắc | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water/Aqua	Demineralized Water	Dung môi	75.75
A	Disodium EDTA	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A	Vivapur COS 8	Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum	Chất tạo gel	0.5
A	-	Xanthan gum	Chất tạo gel	0.1
A	-	Glycerin	Dưỡng ẩm	2
B	Emulium® Dermolea MB	Polyglyceryl-6 Distearate (and) Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters	Chất nhũ hóa O/W	3.5
B	-	Cetyl Alcohol	-	1
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	3
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	3
B	-	Tamanu oil	Dầu dưỡng, phục hồi da	3
B	Andisil D56	Cyclopentasiloxane (and) Cyclohexasiloxane	Silicone tạo mượt	2
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Tạo độ tan chảy	1
C	Vegetol Horsetail MCF860 Hydro	Propylene Glycol & Water & Equisetum Arvense Extract	Dưỡng ẩm, làm dịu da	2
D	GATULINE® RC BIO	Aqua (and) Fagus Sylvatica Bud Extract	Phục hồi da, tăng sinh collagen	2
E	Antimol Green	Butylene Glycol, Scutellaria Baicalensis Root Extract, 1,2 Hexanediol, Star Anise extract	Chất bảo quản	1
F	Citric Acid 30% Sol	Citric acid, Water	Chất bảo quản	0.1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Water/Aqua, Disodium EDTA, Vivapur COS 8, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $70-80^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu B: phối hợp Emulium® Dermolea MB, Labrafac CC MB, DPPG, Andisil D56, Lipocire A SG, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha C gồm Vegetol Horsetail MCF860 Hydro. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm GATULINE® RC BIO. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha E gồm Antimol Green. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha F gồm Citric Acid 30% Sol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

08 Nhũ hóa

Pha chính | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.