



CUSHION

CB24-S08-02-01 | 2024 | Môi & trang điểm | Hệ phối chế đa dụng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	9
A	DPPG CG	Propylene Glycol Dipelargonate	Skin feel tựa Silicone	7.5
A	MOD MB	Octyldodecyl Myristate	Giàu dưỡng	5
A	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Sáp tạo cấu trúc	1
A	Magnesium Stearate	Magnesium Stearate	Hỗ trợ ổn định	1.5
B	Emulium® Illustro	Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-6 Polyricinoleate	Chất nhũ hóa W/O	5
C	IS Discover Titan	Titanium Dioxide, Isostearic Acid	Titan Powder	8
C	A Microtitan 100	Titanium Dioxide, Alkyl silane	Titan Powder	5
C	ITT IOY	Iron Oxide (CI 77492), Isopropyl Titanium Triisostearate	-	2.1
C	ITT IOR	Iron Oxide (CI 77491), Isopropyl Titanium Triisostearate	-	0.5
C	ITT IOB	Iron Oxide (CI 77499), Isopropyl Titanium Triisostearate	-	0.25
C	Cocoate BG MB	Butylene Glycol Cocoate	Dầu phân tán	3
C	Emulium® Illustro	Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-6 Polyricinoleate	Chất nhũ hóa W/O	1
C	Uvinul MC80	Ethylhexyl Methoxycinnamate	Chống nắng hóa học	4
D	ISODODECANE	ISODODECANE	-	8
D	Airy Skin Powder S	Silica	Thấm hút dầu thừa	1
E	Demineralized Water	-	-	32.5
E	Magnesium Sulfate	-	Ổn định nhũ	1
E	Sodium Chloride	-	Ổn định nhũ	1

F	Nanosol NPU-80(N)	BIS-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone/IPDI Copolymer Ethyl Carbamate & Isododecane	Tăng matte	1.5
F	Citric Acid (30%)	-	Điều chỉnh pH	0.05
F	Perfume/Fragrance	-	-	0.1
F	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Labrafac CC MB, DPPG CG, MOD MB, Lipocire A SG, Magnesium Stearate, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt Emulium® Illustrro, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-45^{\circ}\text{C}$ | 2.500-3.500 rpm, 3-5 phút

Premix IS Discover Titan, A Microtitan 100, ITT IOY, ITT IOR, ITT IOB và 3 thành phần khác với phần chất mang phù hợp của pha C; phân tán từ từ và đồng hóa đến khi không còn hạt vón hoặc vệt màu.

Điểm kiểm soát: Phân tán mịn, màu đồng nhất, không vón.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha D: cho lần lượt ISODODECANE, Airy Skin Powder S, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha E: cho lần lượt Demineralized Water, Magnesium Sulfate, Sodium Chloride, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha F gồm Nanosol NPU-80(N), Citric Acid (30%), Perfume/Fragrance. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.