Experiment to understand array function in Data science.

In [1]:
```
import numpy as np
array=np.random.randint(1,100,9)
array
```

Out[1]:
```
array([36, 40, 21, 76, 78, 71, 71, 70, 81])
```

In [2]:
```
np.sqrt(array)
```

Out[2]:
```
array([6.        , 6.32455532, 4.58257569, 8.71779789, 8.83176087,
       8.42614977, 8.42614977, 8.36660027, 9.        ])
```

In [3]:
```
array.ndim
```

Out[3]:
```
1
```

In [5]:
```
new_array=array.reshape(3,3)
new_array
```

Out[5]:
```
array([[36, 40, 21],
       [76, 78, 71],
       [71, 70, 81]])
```

In [6]:
```
new_array.ndim
```

Out[6]:
```
2
```

In [7]:
```
new_array.ravel()
```

Out[7]:
```
array([36, 40, 21, 76, 78, 71, 71, 70, 81])
```

In [8]:
```
newm=new_array.reshape(3,3)
newm
```

Out[8]:
```
array([[36, 40, 21],
       [76, 78, 71],
       [71, 70, 81]])
```

In [9]:
```
newm[2,1:3]
```

Out[9]:
```
array([70, 81])
```

In [10]:
```
newm[1:2,1:3]
```

Out[10]:
```
array([[78, 71]])
```

In [11]:
```
new_array[0:3,0:0]
```

Out[11]:
```
array([], shape=(3, 0), dtype=int64)
```

In [12]:
```
new_array[0:2,0:1]
```

Out[12]:
```
array([[36],
       [76]])
```

In [13]:
```
new_array[0:3,0:1]
```

Out[13]:
```
array([[36],
       [76],
       [71]])
```

In [14]:
```
new_array[1:3]
```

Out[14]:
```
array([[76, 78, 71],
       [71, 70, 81]])
```

In [ ]:
```

```