

Name - Harshvir Singh

Roll no. - 102117056 (3052)

Assignment - 6

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$x_1, x_2, \dots, x_n \Rightarrow$ sample size n

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \dots \cdot f(x_n)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_2-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \cdot \dots$$

taking \ln on both sides

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \sum_{i=1}^n \left(-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2} \right)$$

taking partial derivative w.r.t. μ :-

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \mu} = 0 + \sum_{i=1}^n -\left(\frac{2(x_i-\mu)}{2\sigma^2} \right) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$$

$$n\bar{x} - n\mu = 0$$

$$\bar{x} = \mu$$

Hence $\theta_1 = \bar{x}$ is therefore sample mean

Taking derivative w.r.t. σ^2

$$\frac{\partial \ln(L)}{\partial \sigma^2} = \frac{-n}{2\sigma^2} + \sum_{i=1}^n -\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^4} = 0$$

$$\Rightarrow -n + \sum_{i=1}^n -\frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} = 0$$

$$n = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right)$$

$$\text{Hence } \theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

- Parameter $\theta_1 = \bar{x}$ $\theta_2 = s^2$

#2

Binomial distribution $\Rightarrow {}^n C_{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{n-x_i}$

$$L = \prod_{i=1}^n {}^n C_{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{n-x_i}$$

log on both sides

$$\ln L = \sum_{i=1}^n (\ln({}^n C_{x_i}) + \ln \theta^{x_i} + \ln (1-\theta)^{n-x_i})$$

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \ln({}^n C_{x_i}) + x \ln \theta + \ln (1-\theta) \sum_{i=1}^n (n-x_i)$$

differentiate w.r.t. θ

$$\frac{d \ln(L)}{d\theta} = 0$$

$$\frac{1}{\theta} \sum x_i - \frac{1}{1-\theta} \sum (n - x_i) = 0$$

$$\frac{1}{\theta} \sum x_i - \frac{n^2}{1-\theta} + \frac{1}{1-\theta} \sum x_i = 0$$

$$\frac{1}{\theta(1-\theta)} \sum x_i = \frac{n^2}{1-\theta}$$

$$\theta = \frac{\sum x_i}{n^2}$$