1 Výroky

V následujících příkladech uvažujeme množinu států:

$$M = \{ Francie, Německo, Česko, Slovensko \}$$

a nechť V(x,y) je zkratka pro výrok: "Stát x vyváží víno do státu y.". Vztah V je znázorněn na diagramu vpravo.



Příklad 1 (Překládání).

Vyjádřete výroky v přirozeném jazyce matematickými symboly a naopak:

- (a) Slovensko vyváží víno do Francie.
- (b) $\exists y \in M : V(N\check{e}mecko, y)$

Příklad 2 (Pořadí kvantifikátorů).

Vyjádřete následující výroky slovy a následně určete, zda jsou pravdivé či lživé:

- (a) $\forall x \in M \ \exists y \in M : V(x,y)$
- (b) $\forall x \in M \ \exists y \in M : V(y, x)$
- (c) $\exists x \in M \ \forall y \in M : V(x,y)$
- (d) $\exists x \in M \ \forall y \in M : V(y, x)$

Příklad 3 (Důkazy).

O jisté množině států E jsme zjistili, že splňujě:

- 1. $\forall x \in E \ \forall y \in E : V(x,y) \Rightarrow \neg V(y,x)$
- 2. $\forall x \in E \ \forall y \in E \ \forall z \in E : V(x,y) \land V(y,z) \Rightarrow V(x,z)$
- (a) Zkuste formulovat podmínky vlastními slovy. Splňuje tyto podmínky i množina M zmíněná výše?
- (b) Dokažte, že v E neexistuje stát, který vyváží víno sám sobě.
- (c) * Dokažte, že v E neexistuje posloupnost států x_0, \ldots, x_n t.ž. $V(x_0, x_1) \wedge V(x_1, x_2) \wedge \ldots \wedge V(x_{n-1}, x_n)$ kde $x_0 = x_n$.

2 Množiny

Definice. Symetrický rozdíl $A \triangle B$ definujeme jako množinu prvků, které jsou buď v A, anebo v B (ale ne v A i B zároveň).

Příklad 4 (Symetrický rozdíl pomocí ostatních operací).

Zapište množinu $A \triangle B$ pomocí množinových operací \cup, \cap, \setminus . Nemusíte využít všechny uvedené operace. Zkuste najít aspoň dva způsoby.

Příklad 5 (Dvouprvkové podmnožiny).

Mějme libovolnou množinu K. Uvažme všechny její podmnožiny obsahující právě dva prvky. Jaké množiny jsme z nich schopni vytvořit pomocí operace \triangle ? Jsme takto schopni zkonstruovat libovolnou podmnožinu množiny K?

Příklad 6 (Operace na množinách).

Určete maximální počet různých množin, které můžeme získat z množin A, B aplikováním operací \cup, \cap, \setminus . Operace můžete opakovat i kombinovat. Stejně tak můžete libovolnou z množin použít vícekrát.

3 Hádanky

Příklad 7 (Topinky).

Jakožto chudý student nemající dost peněz na topinkovač si smažíme topinky na pánvi. Opéci jednu stranu topinky trvá 2 minuty. Na pánev se vejdou současně nejvýš dva krajíce. Jak dlouho bude trvat opečení 3 krajíců chleba? Jak dlouho bude trvat opéct n krajíců chleba?

Příklad 8 (Rovnoramenná váha).

Máme k dispozici rovnoramennou váhu a 9 mincí. Jedna z mincí je ovšem falešná, což se pozná tak, že je lehčí než ostatní mince, které váží všechny stejně. Na kolik nejméně vážení dokážeme zjistit, která z mincí je falešná?


Příklad 9 (Hazard).

V casinu ti nabídli následující hru: Nejprve zaplatíš 1 euro za vstup do hry. Dále je před tebe položeno 6 přihrádek, kde v každé leží jeden cent. Můžeš ve kterémkoliv tahu vyjmout obsah všech přihrádek, takto získanou částku si ponechat a odejít ze hry. Dále můžeš zahodit jeden cent z nějaké přihrádky a vložit dva centy do přihrády bezprostředně napravo od ní.

- (a) Vyplatí se ti přijmout nabídku a hrát?
- (b) Máš k dispozici navíc akci: Zahodit cent z nějaké přihrádky a prohodit obsah dvou přihrádek bezprostředně vpravo od této přihrádky. Kolik peněz zvládneš vydělat nyní?



Počáteční rozložení přihrádek



Základní pravidlo

