

早稲田大学一社会科学部一過去問演習と良問演習

大島 遙斗

2025 年 12 月 23 日

はじめに

長い長い受験勉強もとうとう終わりが見えてきました。今これを書いているのは12月の14日の深夜です。今から、2ヶ月後の理瀬さんはもう大学入試を終えています。さて、どんな景色が見えているのでしょうか。

今から志望校の合格にできることは、たくさん問題をといてパターンをたくさん身につけるのではなく、

出会った問題から何を学ぶか？

です。

1日1日を大切に頑張っていきましょう。

また、勉強の相談やメンタル的にしんどいなどあれば気軽に電話なり、直接僕に話しかけたりして教えてください！いつでも相談にのります！最終局面に向けて一緒に頑張りましょう。

大島 遙斗

本書の使い方

まず、このテキストは **早稲田の三年分の過去問と僕が選んだ良問** の二部から構成されています。

それぞれ1週間のうちに解いてきてください。

・過去問について

言わずもがなよく復習してください。何がダメで次はどうすれば解けるようになるのか、どのような発想があったら解くことができていたのか、を考えながら復習しましょう。

・良問について

立教が一応のところの第一志望だと思うので掲載する問題は、**標準**～**難**の問題を集めます。また、以下の記号を用います。

A→ 基本的な問題。教科書レベル。

B→ 標準的な問題。ぜひ解き切って欲しい問題。

C→ 難問。この問題が解けなくても、周りの受験生とはあまり差がつかない。

例えば、次のように問題の横に書いたら次のように捉えてください。

[B15]= 標準的な問題で目標解答時間は、15分

また、本題の他に **▶ 類題演習 ◀** というものを掲載します。必ずしも解いてくる必要はありません。自分の実力向上に役立ててください。

目次

1	早稲田大学過去問題編	5
1.1	2023 年実施	5
1.2	2024 年度実施	12
1.3	2025 年度実施	19
2	良問集問題編	26
2.1	第 1 回	26
2.2	第 2 回	28
2.3	第 3 回	30
2.4	第 4 回	32
3	早稲田大学過去問解答編	33
3.1	2023 年度実施	33
4	良問集解答編	41
4.1	第 1 回	41
4.2	第 2 回	47

1 早稲田大学過去問題編

1.1 2023 年実施

2023 年度：数学

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで，問題冊子及び記述解答用紙には手を触れないこと。
2. 問題は **10～11 ページ** に記載されている。試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚損等に気づいた場合は，手を挙げて試験員に知らせること。
3. 解答はすべて，HB の黒鉛筆または HB のシャープペンシルで記入すること。
4. 記述解答用紙記入上の注意
 - (1) 試験開始後，記述解答用紙の所定欄(2箇所)に，氏名及び受験番号を正確に記入すること。
 - (2) 所定欄以外に受験番号・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合はある。
 - (3) 受験番号の記入にあたっては，次の数字見本にしたがい，読みやすいように，正確に記入すること。
 - (4) 受験番号は右詰めで記入し，余白が生じる場合でも受験番号の前に「0」を記入すること。
 - (5) 計算の途中過程を記述すること。記述されていない答案は採点の対象外になる場合がある。
 - (6) 定規，コンパスを使用してもよい。
5. あとは
6. なんだかんだ
7. 色々と
8. 注意事項が
9. 書いてあります。

計算用紙

計算用紙

計算用紙

計算用紙

1.

曲線 $y = ax^2 + b$ 上に x 座標が p である点 P をとり、点 P における接線を ℓ とする.

ただし、定数 a, b は $a > 0, b > 0$ を満たすとする. 次の問に答えよ.

(1) 接線 ℓ の方程式を a, b, p を用いて表せ.

(2) 接線 ℓ と $y = ax^2$ で囲まれた部分の面積 S を a, b を用いて表せ.

(3) 接線 ℓ と曲線 $y = ax^2 + \frac{b}{2}$ で囲まれた図形の面積を S' としたとき, S' を S を用いて表せ.

(4) 接線 ℓ と曲線 $y = ax^2 + c$ で囲まれた部分の面積 S'' とする. $S'' = \frac{S}{2}$ のとき, c を a, b を用いて表せ. ただし, $b > c$ とする.

2.

定数 m に対して x, y, z の方程式

$$xyz + x + y + z = xy + yz + zx + m \quad \cdots \textcircled{1}$$

を考える. 次の問に答えよ.

(1) $m = 1$ のとき ① 式をみたす実数 x, y, z の組をすべて求めよ.

(2) $m = 5$ のとき ① 式を満たす実数 x, y, z の組をすべて求めよ. ただし, $x \leq y \leq z$ とする.

(3) $xyz = x + y + z$ を満たす整数 x, y, z の組をすべて求めよ. ただし, $0 < x \leq y \leq z$ とする.

3.

$a = \sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$ とする. 次の問に答えよ.

- (1) a^3 を a の 1 次式で表せ.
- (2) a は整数であることを示せ.
- (3) $b = \sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} + \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$ とするとき, b を超えない最大の整数を求めよ.

〔以 下 余 白〕

1.2 2024 年度実施

2024 年度：数学

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び記述解答用紙には手を触れないこと。
2. 問題は **17～18 ページ** に記載されている。試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚損等気づいた場合は、手を挙げて試験員に知らせること。
3. 解答はすべて、HB の黒鉛筆または HB のシャープペンシルで記入すること。
4. 記述解答用紙記入上の注意
 - (1) 試験開始後、記述解答用紙の所定欄(2 箇所)に、氏名及び受験番号を正確に記入すること。
 - (2) 所定欄以外に受験番号・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合はある。
 - (3) 受験番号の記入にあたっては、次の数字見本にしたがい、読みやすいように、正確に記入すること。
 - (4) 受験番号は右詰めで記入し、余白が生じる場合でも受験番号の前に「0」を記入すること。
 - (5) 計算の途中過程を記述すること。記述されていない答案は採点の対象外になる場合がある。
 - (6) 定規、コンパスを使用してもよい。
5. あとは
6. なんだかんだ
7. 色々と
8. 注意事項が
9. 書いてあります。

計算用紙

計算用紙

計算用紙

計算用紙

1.

連立不等式

$$y \leq -\frac{2}{3}x + 4, \quad y \geq x - 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

の表す領域を D とする. 点 (x, y) が D を動くとき, 次の問に答えよ.

- (1) 領域 D を座標平面上に図示せよ.
- (2) $-2x + y$ の最大値と, そのときの x, y の値を求めよ.
- (3) $2x + y$ の最大値と, そのときの x, y の値を求めよ.
- (4) a がすべての実数を動くとき, $ax + y$ の最大値を a で分類せよ.

2.

$OA = 6, OB = 5, AB = 7$ である $\triangle OAB$ について, $\vec{a} = \vec{OA}, \vec{b} = \vec{OB}$ とおく. 次の問に答えよ.

- (1) $\triangle OAB$ の内心を I , 辺 AB と直線 OI の交点を C とする. \vec{OC} を \vec{a}, \vec{b} で表せ.
- (2) \vec{OI} を \vec{a}, \vec{b} で表せ.
- (3) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の値を求めよ.
- (4) $\triangle OAB$ の垂心を $H, \vec{OH} = s\vec{a} + t\vec{b}$ とするとき, \vec{AH}, \vec{BH} を \vec{a}, \vec{b}, s, t で表せ.
- (5) s, t の値を求めよ.

3.

n を $n \geq 3$ である自然数とする. 相異なる n 個の正の数を小さい順に並べた集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ を考える. $a_1 = k$ とするとき, 次の問に答えよ.

- (1) $a_i - a_1 (i = 2, 3, \dots, n)$ がすべて S の要素となるとき, a_2 を求めよ.
- (2) (1) のとき, a_n を n で表せ.
- (3) $\frac{a_i}{a_1} (i = 2, 3, \dots, n)$ がすべて S の要素となるとき, a_n を n の式で表せ.

〔以 下 余 白〕

1.3 2025 年度実施

2025 年度：数学

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで，問題冊子及び記述解答用紙には手を触れないこと．
2. 問題は **24～25 ページ** に記載されている．試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚損等気づいた場合は，手を挙げて試験員に知らせること．
3. 解答はすべて，HB の黒鉛筆または HB のシャープペンシルで記入すること．
4. 記述解答用紙記入上の注意
 - (1) 試験開始後，記述解答用紙の所定欄（2 箇所）に，氏名及び受験番号を正確に記入すること．
 - (2) 所定欄以外に受験番号・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合はある．
 - (3) 受験番号の記入にあたっては，次の数字見本にしたがい，読みやすいように，正確に記入すること．
 - (4) 受験番号は右詰めで記入し，余白が生じる場合でも受験番号の前に「0」を記入すること．
 - (5) 計算の途中過程を記述すること．記述されていない答案は採点の対象外になる場合がある．
 - (6) 定規，コンパスを使用してもよい．
5. あとは
6. なんだかんだ
7. 色々と
8. 注意事項が
9. 書いてあります．

計算用紙

計算用紙

計算用紙

計算用紙

1.

自然数 n, p に対して, n^p の 1 の位の数 を $f_p(n)$ で表す. 次の問に答えよ.

- (1) $f_2(n)$ の取りうる値をすべて求めよ.
- (2) $f_5(n) - f_1(n)$ の値をすべて求めよ.
- (3) $f_{100}(n)$ の取りうる値をすべて求めよ.

2.

数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{B_n\}$, すなわち,

$$b_n = a_{n+1} - a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とする. 次の問に答えよ.

- (1) $a_n = -\frac{1}{n}$ のとき, b_n を n の式で表せ.
- (2) $b_n = \frac{1}{n(n+1)}$ のとき, a_n を n の式で表せ.
- (3) 数列 $\{b_n\}$ が以下を満たすとき a_n を n の式で表せ. ただし, $a_1 = 1$ とする.

$$\begin{cases} b_1 = 1 \\ b_n = n(n+1) \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

3.

θ の関数

$$f(\theta) = \cos 2\theta - \sqrt{3} \sin 2\theta + 4 \cos \frac{\theta}{2} \left(\sin \frac{\theta}{2} - \sqrt{3} \cos \frac{\theta}{2} + 2\sqrt{3} \right)$$

を考える. ただし, $0 \leq \theta < 2\pi$ とする. 次の問に答えよ.

- (1) $k = \sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta$ とおくとき, $f(\theta)$ を k の関数で表せ.
- (2) $f(\theta)$ の最大値, 最小値をも求めよ. また, そのときの θ の値を求めよ.
- (3) (1) の k に対して, θ の方程式 $f(\theta) = ak$ の解の個数を求めよ. ただし, 定数 a は $0 < a \leq 3$ とする.

〔以 下 余 白〕

2 良問集問題編

2.1 第1回

まずは、単純な計算問題で肩慣らしといきましょう. おっとその前に公式の確認です.

公式

$$1^\circ \quad |X| = k \iff X = \pm k \text{ かつ } k \geq 0$$

$$2^\circ \quad |X| < k \iff -k < X < k$$

$$3^\circ \quad |X| > k \iff X > k \text{ または } X < -k$$

1.0.[絶対値と不等式(A10)]

以下の不等式をそれぞれ解け.

$$(1) \quad |x+3| \geq |x-2| \quad (25 \text{ 宮崎大・教, 農})$$

$$(2) \quad |4x-1| < |x+3| \quad (25 \text{ 福島大})$$

▶ 類題演習 1.1 ◀

$$(1) \quad \text{不等式 } |2x-3| \leq 2 \text{ の解を求めよ. さらに, 不等式 } |2x-3| \leq 2 \leq \frac{1-3a}{3}x-1 \text{ の解が } 1 \leq x \leq \frac{5}{2} \text{ となるような定数 } a \text{ の値を求めよ.} \quad (25 \text{ 同志社女子大})$$

$$(2) \quad |x| + |x-3| < 4 \text{ を解け.} \quad (25 \text{ 大東文化大})$$

続いて、座標平面と幾何の絡んだ問題です。立教の過去問演習を見ている感じ、苦手そうだったので特集します。

1.2.0〔座標平面と幾何 1〕(B20)

座標平面上の点 $Q(3, 5)$ と放物線 $C: y = x^2$ 上を動く点 $P(t, t^2)$ について、以下の間に答えよ。

- (1) 点 Q から放物線 C へ引いた 2 本の接線の方程式とそれぞれの接点の座標を求めよ。
- (2) 点 P が点 $(2, 4)$ から点 $(-3, 9)$ まで動くとき、線分 PQ が通過する領域の面積を求めよ。

(25 福岡大・理)

1.2.1〔座標平面と幾何 2〕(B15)

座標平面上に $A(25, 0)$, $B(0, 20)$, $C(10, 0)$ がある。点 P が点 C を中心とする半径 6 の円周上を動くとき、 $\triangle ABP$ の面積の最小値を求めなさい。

(25 福島大)

▶ 類題演習 1.2.2 ◀

座標平面において、原点を中心とする半径 3 の円 O_1 に点 $A(3, 0)$ において内接する半径 2 の円を O_2 とする。 O_2 上の点 $B(2, \sqrt{3})$ において O_2 に外接し、 O_1 と内接する円 O_3 の中心を P とするとき、

- (1) O_2 の中心を C とする $\overrightarrow{CP} = t\overrightarrow{CB}$ とするとき、 P の座標を t で表せ。
- (2) P の座標と O_3 の半径 r を求めよ。

(愛知医大・医学部)

2.2 第2回

先週解説することが叶わなかった、第2回目の良問演習です。こちらは、解答をつけておきます。

2.1.0〔軌跡と領域の雑台〕(B30)

- (1) m が $m > 0$ の範囲を動くとき、直線 $y = mx - m^2$ が通りうる範囲を求め、図示せよ。
- (2) 点 $P(x, y)$ が原点を中心とする半径 1 の内部を動くとき、点 $Q(x + y, xy)$ の動く範囲を図示せよ。
- (3) m が $m > 0$ の範囲を動くとき、2 直線 $(m-1)x - y + 1 = 0 \cdots \textcircled{1}$, $mx + (m-2)y + 2 = 0 \cdots \textcircled{2}$ の交点の軌跡を求め、図示せよ。
- (4) t が $-1 \leq t \leq 1$ の範囲を動くとき、 $x = 2t - 1 \cdots \textcircled{1}$, $y = t^2 + t \cdots \textcircled{2}$ を座標とする点 (x, y) の軌跡を求め、図示せよ。

2.1.1〔軌跡と領域の図示〕(B25)

xy 平面において、実数 t に対し、2 点 $P(-4, 2t^2 - 4t - 1)$, $Q(4, 2t^2 + 4t - 1)$ をとる。

- (1) 2 点 P, Q を通る直線 ℓ の方程式を求めよ。
- (2) t が $-1 \leq t \leq 1$ の範囲を動くとき、線分 PQ が通過する部分を D とする。ただし、その境界（境界線）も含むとする。
 - (i) 2 点 $A(0, -2)$, $B(1, 3)$ はそれぞれ D に含まれないことを示せ。
 - (ii) D を図示し、その面積を求めよ。

(お茶の水女子・理)

▶ 類題演習 2.1.2 ◀

不等式 $2x^2 + xy - y^2 - 4x + 5y - 6 > 0$ の表す領域を D とおき、不等式 $x^2 + y^2 - 2kx - y + k^2 < 0$ の表す領域を E とおく。ただし、 k は実数の定数とする。

- (1) $2x^2 + xy - y^2 - 4x + 5y - 6$ を因数分解せよ。
- (2) 領域 D を図示せよ。
- (3) 領域 D と領域 E の共通部分が空集合となるような k の値の範囲を求めよ。

(法政大)

次の話題は方程式です．もう結構お腹いっぱいかもしれませんがデザートにどうぞ．

2.2.0〔不等式の色々〕(B40)

- (1) $A = \alpha + \beta$, $B = 2\sqrt{\alpha + \beta}$, $C = \sqrt{2\alpha} + \sqrt{2\beta}$ の大小関係を不等号を用いて表せ．
- (2) $x > 0$, $y > 0$, $x + 7y = 1$ のとき, $\frac{1}{7x} + \frac{1}{y}$ の最小値を求めよ．
- (3) $x > 0$ のとき, $\frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 5}{x^2 + 2x + 1}$ の最小値を求めよ．
- (4) x, y, z を正の実数とする． $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)(x + y + z)$ の取りうる値の最小値を求めよ．また最小値をとるときの x, y, z の条件を求めよ．

(上智大・茨城大・横浜市立大・鹿児島大)

▶ 類題演習 2.2.1 ◀

- (1) $x > 0$, $y > 0$ のとき, $\left(x + \frac{1}{y}\right)\left(y + \frac{4}{x}\right)$ の最小値を求めよ．
- (2) $x > 0$ のとき, $\frac{x+2}{x^2+2x+16}$ の最大値を求めよ．
- (3) すべての正の実数 x に対して, $\left(x + \frac{2}{x}\right)^6 \geq y$ を満たす y の最大値を求めよ．

(同志社女子大学・岩手県立大・中京大)

2.3 第3回

なにをしようかなあと思いましたが、やはり解析分野(関数)と幾何学分野(図形)あたりを演習することにした。

3.1.0〔座標平面と幾何3〕(B15)

r, a, b を実数とし, $r > 0, a \neq 0$ とする. 座標平面上において, 中心が点 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ で半径が r の円を K , 放物線 $y = ax^2 + b$ を C とする. 円 K と放物線 C はともに点 $A\left(\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ で同じ直線 ℓ に接しているとする. このとき次に問に答えよ.

- (1) r, a, b の値を求めよ.
- (2) 直線 ℓ の方程式を求めよ.
- (3) $\int_{-2}^{\sqrt{3}} (ax^2 + b)dx$ の値を求めよ.
- (4) 連立不等式

$$\begin{cases} x \leq \sqrt{3}, & y \leq 0, & y \geq ax^2 + b \\ \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + y^2 \geq r^2 \end{cases}$$

の表す領域の面積 S を求めよ.

(関西学院大学・文系)

3.1.1〔軌跡は簡単〕(B10)

a を実数とし, 2つの放物線 $y = x^2$ と $y = -x^2 + 2ax - a$ が異なる2点 A, B で交わっているとする. このとき, 次の問に答えよ.

- (1) 実数 a の取りうる値の範囲を求めよ.
- (2) a が(1)で求めた範囲を動くとき, 線分 AB の中点の軌跡を求め, 図示せよ.

(小樽商科大)

▶ 類題演習 3.1.2 ◀

m がすべての実数の値を取りながら変わるとき, 2つの直線 $mx - y = 1$ と $x + my = m + 2$ の交点の軌跡を求めよ.

(東京女子大)

次は早稲田大学(社会学部)で頻出の整数問題の演習です. かなり難しいですが頑張ってみましょう. それでは参ります.

4.1.0[多項式と整数](B25)

多項式

$$P(x) = (x^6 - 3x^4 + 3x^2 - 1)x^3(x^2 + 1)(x^2 + 2)(x^2 + 3)$$

を考える. 次の問に答えよ.

- (1) 多項式 $P(x)$ が 2 次式 $x^2 - 1$ で割り切れることを示せ.
- (2) 6480 を素因数分解せよ.
- (3) n が 2 以上の整数のとき $P(n)$ は 6480 の倍数であることを示せ.

(富山大・理, 医, 薬)

4.1.1[漸化式と整数](C30)

数列 $\{a_n\}$ を次で定める.

$$a_1 = 8, a_{n+1} = 2a_n^2 + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

さらに, a_n を 5 で割った商を b_n , 余りを r_n とする.

自然数 n に対して, 以下の問に答えよ.

- (1) r_n を求めよ.
- (2) b_n を 5 で割った余りを求めよ.
- (3) a_n を 50 で割った余りを求めよ.

(中央大・理工)

▶ 類題演習 ◀

n を自然数とする. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ を

$$a_n = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n!},$$
$$b_n = a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n$$

とおく. a_n の値が整数となる n の値の最大値は ア, b_n の値が最大となる n の値は イ である.

(同志社大・文, 経)

2.4 第4回

4回目の話題は数列です．数学的帰納法や難しい漸化式などの論述を必要とする問題を中心に取り上げたいと思います．

3 早稲田大学過去問解答編

3.1 2023 年度実施

1.

考え方

標準的な微積分の問題です。

二次関数と ℓ の共有点の x 座標が厄介な形になるので、文字で置き換えてから積分するのが計算ミスを減らすコツです。

また積分で面積を求めるときに、項別に積分すると代入計算が大変面倒くさいです。共有点を求める過程で、因数分解ができるので $\frac{1}{6}$ 公式を使いましょう。そうすると大変キレイに面積を求めることができます。

解

(1) s 接線 ℓ の方程式は、 $y' = 2ax$ より、

$$\ell: y = 2ap(x - p) + ap^2 + b$$

$$\therefore y = 2apx - ap^2 + b \dots\dots (\text{答え})$$

(2) $y = ax^2$ と ℓ の共有点の x 座標は、

$$\begin{aligned} ax^2 = 2apx - ap^2 + b &\iff x^2 = 2px - p^2 + \frac{b}{a} \\ &\iff x^2 - 2px + p^2 - \frac{b}{a} = 0 \\ &\iff x = p \pm \sqrt{p^2 - p^2 + \frac{b}{a}} = p \pm \sqrt{\frac{b}{a}} \end{aligned}$$

ここで、 $y = ax^2$ と ℓ の共有点の x 座標の小さい方から、 $x = \alpha$, $x = \beta$ とおくと、

$\alpha = p - \sqrt{\frac{b}{a}}$, $\beta = p + \sqrt{\frac{b}{a}}$ であり、直線 ℓ は $y = ax^2$ よりも常に上側なので求める面積 S は、

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} -(x - \alpha)(x - \beta) dx \\ &= \frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 \\ &= \frac{1}{6}(2\sqrt{\frac{b}{a}})^3 \\ &= \frac{4}{3}\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \dots\dots (\text{答え}) \end{aligned}$$

(3) ℓ と $y = ax^2 + \frac{b}{2}$ の共有点の x 座標を小さい方から, α', β' とおくと,

$$\begin{aligned} 2apx - ap^2 + b &= ax^2 + \frac{b}{2} \\ \Leftrightarrow x^2 - 2px + p^2 - \frac{b}{2a} &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= p \pm \sqrt{\frac{b}{2a}} \end{aligned}$$

$\therefore \alpha' = p - \sqrt{\frac{b}{2a}}, \beta' = p + \sqrt{\frac{b}{2a}}$ 従って, 求める面積 S' は,

$$\begin{aligned} S' &= \int_{\alpha'}^{\beta'} -(x - \alpha')(x - \beta') dx \\ &= \frac{1}{6} (\beta' - \alpha')^3 \\ &= \frac{1}{6} \left(2 \cdot \sqrt{\frac{b}{2a}} \right)^3 \\ &= \frac{4}{3} \left(\frac{b}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ \therefore S' &= \frac{1}{2\sqrt{2}} S \dots\dots (\text{答え}) \end{aligned}$$

(4) ℓ と $y = ax^2 + c$ の共有点の x 座標を小さい方から γ, δ とおくと,

$$\begin{aligned} ax^2 + c &= 2apx - ap^2 + b \Leftrightarrow x^2 - 2px + p^2 + \frac{c-b}{a} = 0 \\ \Leftrightarrow x &= p \pm \sqrt{\frac{b-c}{a}} \end{aligned}$$

$\therefore \gamma = p - \sqrt{\frac{b-c}{a}}, \delta = p + \sqrt{\frac{b-c}{a}}$ とおけるので, 求める面積 S'' は,

$$\begin{aligned} S'' &= \int_{\gamma}^{\delta} -(x - \gamma)(x - \delta) dx \\ &= \frac{1}{6} (\delta - \gamma)^3 \\ &= \frac{1}{6} \left(2 \cdot \sqrt{\frac{b-c}{a}} \right)^3 \\ &= \frac{4}{3} \left(\frac{b-c}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

よって, $S'' = \frac{S}{2}$ なので,

$$\begin{aligned} S'' = \frac{S}{2} &\iff \frac{4}{3} \left(\frac{b-c}{a} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \left(\frac{b-c}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \\ &\iff 2 \left(\frac{b-c}{a} \right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{b}{a} \right)^{\frac{3}{2}} \\ &\iff 2^{\frac{2}{3}} \left(\frac{b-c}{a} \right) = \frac{b}{a} \quad (\text{両辺} \frac{2}{3} \text{乗した.}) \\ &\iff b-c = 2^{-\frac{2}{3}} \cdot b \\ &\iff c = b(1 - 2^{-\frac{2}{3}}) = b \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\} = b \left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \right) \end{aligned}$$

$$\therefore c = b \left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \right) \dots\dots (\text{答え})$$

2.

考え方

整数問題です. 整数問題でまずやることは, **実験** ですが, 本問はそれ以前にすることがあります.

①が x, y, z の交代式なので, 因数分解ができます. なので, 因数分解することが先です. そこから, 因数分解された式を満たす x, y, z の組を求めましょう.

$$xyz + x + y + z = xy + yz + zx + m \quad \dots \textcircled{1}$$

解

(1)

$m = 1$ のとき,

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &\iff xyz + x + y + z = xy + yz + zx + 1 \\ &\iff x(yz + 1 - y - z) + y + z - yz - 1 = 0 \\ &\iff x\{y(z-1) - (z-1)\} + (z-1) - y(z-1) = 0 \\ &\iff x(z-1)(y-1) + (z-1)(1-y) = 0 \\ &\iff (x-1)(y-1)(z-1) = 0 \end{aligned}$$

\therefore これを満たす x, y, z は, $x = 1$ または $y = 1$ または $z = 1$ ……(答え)

(2)

$m = 5$ のとき

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &\iff xyz + x + y + z = xy + yz + zx + 5 \\ &\iff xyz + x + y + z = xy + yz + zx + 1 + 4 \\ &\iff (x-1)(y-1)(z-1) = 4 \dots\dots\dots \textcircled{1}' \end{aligned}$$

①'を $x \leq y \leq z$ なので, $x-1 \leq y-1 \leq z-1$ であるから, ①'を満たす $(x-1, y-1, z-1)$ の組は,

$$(x-1, y-1, z-1) = (1, 1, 4), (1, 2, 2), (-4, -1, 1), (-2, -2, 1), (-2, -1, 2), (-1, -1, 4)$$

従って, 求める (x, y, z) の組は

$$(x, y, z) = (2, 2, 5), (2, 3, 3), (-3, 0, 2), (-1, -1, 2), (-1, 0, 1), (0, 0, 5) \dots\dots\dots \text{(答え)}$$

(3)

$$xyz = x + y + z \cdots \cdots (*)$$

考え方

今までの誘導を踏襲すると、 $(\quad)(\quad) = (\text{具体的な数})$ にすることが目標です。慣れていないと厳しいと思います。解けなくても良い問題でしょう。

本問では、 $x = k$ とおく。ことから始めます。

解

$x = k$ ($x \in \mathbb{N}$) とおくと、

$$\begin{aligned} kyz = k + y + z &\iff k^2yz = ky + kz \\ &\iff k^2yz - ky - kz = k^2 \\ &\iff (ky - 1)(kz - 1) = k^2 + 1 \cdots \cdots ② \end{aligned}$$

ここで、 $x \leq y$ において、両辺 k 倍して 1 を引くと、

$$\begin{aligned} kx - 1 \leq ky - 1 &\iff ky - 1 \geq kx - 1 \\ &\iff ky - 1 \geq k^2 - 1 \cdots \cdots ③ \end{aligned}$$

同様に、 $y \leq z$ なので、 $z \geq z$ より、

$$kz - 1 \geq k^2 - 1 \cdots \cdots ④$$

③, ④ より、② について、

$$\begin{aligned} (ky - 1)(kz - 1) &\geq (k^2 - 1)(k^2 - 1) \leq k^2 + 1 \\ &\iff k^4 - 2k^2 + 1 \leq k^2 + 1 \\ &\iff k^4 - 3k^2 \leq 0 \\ &\iff k^2 - 3 \leq 0 \\ &\iff -\sqrt{3} \leq k\sqrt{3} \end{aligned}$$

よって、この不等式を満たす自然数は、 $k = 1$ のみなので、 $x = 1$ である。

・ $x = 1$ のとき、

$$\begin{aligned} yz = y + z + 1 &\iff y(z - 1) - z + 1 - 1 = 1 \\ &\iff (z - 1)(y - 1) = 2(y \leq z) \end{aligned}$$

これを満たす y, z の組は, $(y-1, z-1) = (1, 2)$ すなわち $(y, z) = (2, 3)$ のみ.

\therefore $(*)$ を満たす (x, y, z) の組は, $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = (1, 2, 3) \cdots \cdots (\text{答え})$

3.

$$a = (5\sqrt{2} + 7)^{\frac{1}{3}} - (5\sqrt{2} - 7)^{\frac{1}{3}} \dots\dots\dots (*)$$

考え方

3乗根の中身が複雑なので文字で置き換えて計算を簡単にしましょう.

解

(1) $\alpha = 5\sqrt{2} + 7, \beta = 5\sqrt{2} - 7$ とおくと,

$$\begin{aligned} (*) \iff a &= \left(\alpha^{\frac{1}{3}} - \beta^{\frac{1}{3}} \right)^3 \\ &= \alpha - \beta - 3\alpha^{\frac{2}{3}}\beta^{\frac{1}{3}} + 3\alpha^{\frac{1}{3}}\beta^{\frac{2}{3}} \\ &= \alpha - \beta - 3\alpha^{\frac{1}{3}}\beta^{\frac{1}{3}} \left(\alpha^{\frac{1}{3}} - \beta^{\frac{1}{3}} \right) \end{aligned}$$

なので,

$$\begin{cases} \alpha - \beta = 14 \\ \alpha^{\frac{1}{3}}\beta^{\frac{1}{3}} = 50 - 49 = 1 \end{cases}$$

より, $a^3 = 14 - 3a \dots\dots\dots$ (答え)

(2)

$$\begin{aligned} a^3 &= 14 - 3a \iff a^3 + 2a - 14 = 0 \\ &\iff (a - 2)(a^2 + 2a + 7) = 0 \\ &\iff a = 2 \text{ または } a^2 + 2a + 7 = 0 \end{aligned}$$

$\therefore a^2 + 2a + 7 = 0$ の解は複素数なので, $a = 2$ である.

$\therefore a \in \mathbb{Z}$ である. (証明終わり)

(3) $b = \alpha^{\frac{1}{3}} + \beta^{\frac{1}{3}}$ の整数部分を求める.

(1) と同様にして, b^3 を計算する.

$$\begin{aligned} b^3 &= \alpha + \beta + 3\alpha^{\frac{2}{3}}\beta^{\frac{1}{3}} + 3\alpha^{\frac{1}{3}}\beta^{\frac{2}{3}} \\ &= \alpha + \beta + 2\alpha^{\frac{1}{3}}\beta^{\frac{1}{3}}\left(\alpha^{\frac{1}{3}} + \beta^{\frac{1}{3}}\right) \\ &= 10\sqrt{2} + 3b \\ \Leftrightarrow b^3 &= 3b + 10\sqrt{2} \\ \Leftrightarrow b^3 - 3b - 10\sqrt{2} &= 0 \\ \Leftrightarrow (b - 2\sqrt{2})(b^2 + 2\sqrt{2}b + 5) &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore b^2 + 2\sqrt{2}b + 5 = 0$ の解は複素数なので, $b = 2\sqrt{2}$.

$\therefore 2\sqrt{2}$ の整数部分は, 2 なので求める整数は, **2**……(答え)

4 良問集解答編

4.1 第1回

1.0

●解

(1) 両辺が0以上であるから、両辺2乗しても同値性は崩れないので、両辺を2乗することにより、

$$\begin{aligned}(x+3)^2 \geq (x-2)^2 &\iff x^2 + 6x + 9 \geq x^2 - 4x + 4 \\ &\iff x \geq -\frac{1}{2} \cdots \cdots (\text{答え})\end{aligned}$$

(2) 両辺が0以上であるから、両辺2乗しても同値性は崩れないので、両辺を2乗することにより、

$$\begin{aligned}(4x-1)^2 < (x+3)^2 &\iff (4x-1)^2 - (x+3)^2 < 0 \\ &\iff \{(4x-1) + (x+3)\} \{(4x-1) - (x+3)\} < 0 \\ &\iff (5x+2)(3x-4) < 0 \\ &\iff -\frac{2}{5} < x < \frac{4}{3} \cdots \cdots (\text{答え})\end{aligned}$$

▶ 類題演習 1.1 ◀

●解

(1)

$$\begin{aligned}|2x-3| \leq 2 &\iff -2 \leq 2x-3 \leq 2 \\ &\iff \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \cdots \cdots (\text{答え})\end{aligned}$$

また、 $|2x-3| \leq 2 \leq \frac{1-3a}{3}x-1$ は、 $-\frac{2}{5} < x < \frac{4}{3}$ かつ $\frac{1-3a}{3}x \geq 3 \cdots \cdots ①$ となり ① が $x \geq 1$ のとき、 $1 \leq x \leq \frac{5}{2}$ を得る.

従って、 $1-3a > 1$ のとき、 $x \geq \frac{9}{1-3a}$. この式の右边が $\frac{9}{1-3a} = 1$ となるのは、 $a = -\frac{8}{3} \cdots \cdots (\text{答え})$ である.


(2)

$$\begin{aligned} |x| + |x-3| < 4 &\iff |x| < 4 - |x-3| \\ &\iff |x-3| - 4 < x < 4 - |x-3| \\ &\iff \begin{cases} |x-3| < x+4 \\ |x-3| < 4-x \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -(x+4) < x-3 < x+4 \\ x-4 < x-3 < -x+4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x < \frac{7}{2} \end{cases} \\ &\iff -\frac{1}{2} < x < \frac{7}{3} \dots\dots (\text{答え}) \end{aligned}$$

1.2.0

解

与えられた状況を図示すると下図のようになる。



(1) 2本の接線と $y = x^2$ の接点の x 座標を $x = s$ とおくと、この点における接線の方程式は、

$$y = 2s(x - s) + s^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

① が点 $Q(3, 5)$ を通るので、


$$\begin{aligned} 5 &= 2s(3 - s) + s^2 \iff -s^2 + 6s = 5 \\ &\iff (s - 1)(s - 5) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore s = 1, 5$$

$$\therefore s = 1 \text{ のとき, } \textcircled{1} : y = 2(x - 1) + 1 \quad \therefore y = 2x - 1, \text{ 接点 } (1, 1) \cdots \cdots (\text{答え})$$

$$s = 5 \text{ のとき, } \textcircled{1} : y = 10(x - 5) + 25 \quad \therefore y = 10x - 25, \text{ 接点 } (5, 25) \cdots \cdots (\text{答え})$$

(2) P が $(2, 4)$ から $(-3, 9)$ まで動くとき、線分 PQ が通過する領域は、下図の網目部である。




ここで、 $(-3, 9)$ を A 、 $(-3, 0)$ を B 、 $(3, 0)$ を C 、 $(1, 0)$ を D 、 $(1, 1)$ を E とすると、求める面積 S は、

$$\begin{aligned} S &= (\text{台形 } ABCQ) - \left(\int_{-3}^1 x^2 dx + \text{台形 } (DEQB) \right) \\ &= \frac{1}{2}(9 + 5) \cdot 6 - \left(\frac{1}{3} \left[x^3 \right]_{-3}^1 - \frac{1}{2}(1 + 5) \cdot 2 \right) \\ &= 36 - \frac{28}{3} \\ &= \frac{80}{3} \cdots \cdots (\text{答え}) \end{aligned}$$

1.2.1

解

まずは、図示すると下図のような状況.



ここで、線分 AB に C から引いた垂線の足を H、H から C に向かって引いた直線と円との交点を P_0 とすると、円上を動く P が P_0 にきた時に $\triangle ABP$ は最小になるので、

$$\triangle ABP = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot (AH - 6) \cdots \cdots \textcircled{1}$$

と書ける.

ここで、 $AB^2 = 25^2 + 20^2$ であり、AB を通る直線の方程式は、 $4x + 5y = 100$ なので、点と直線の距離公式より、 $CH = \frac{|4 \cdot 10 - 100|}{\sqrt{4^2 + 5^2}} = \frac{60}{\sqrt{4^2 + 5^2}}$.


$$\therefore \triangle ABP = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{5^2 + 4^2} \left(\frac{10}{\sqrt{5^2 + 4^2}} - 1 \right) 6 = 15(10 - \sqrt{41}) \cdots \cdots (\text{答え})$$

▶ 類題演習 1.2.2 ◀

解

(1) O_2 の中心が C , 半径が 2 であることより, C の座標は $(1, 0)$ であるとすぐにわかる.

従って 3 つの円をすべて図示すると下図のようになる.



よって, $\vec{OC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{OB} = \begin{pmatrix} 2 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ なので,

$$\vec{CP} = t\vec{CB}$$

$$\Leftrightarrow \vec{OP} = \vec{OC} + t\vec{CB}$$

$$\Leftrightarrow \vec{OP} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \vec{OP} = \begin{pmatrix} t+1 \\ \sqrt{3}t \end{pmatrix}$$

$$\therefore P(t+1, \sqrt{3}t) \cdots \cdots (\text{答え})$$

(2) O_3 の半径 r とすると, $\overrightarrow{CP} = t\overrightarrow{CB}$ より,

$$CB : CP = 1 : t$$

これより, $BP = t - 1$ より, $r = (t - 1) |\overrightarrow{CB}| = 2(t - 1)$.

従って, $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} t+1 \\ \sqrt{3}t \end{pmatrix}$ を r を用いて表すと,

$$|\overrightarrow{OP}| = (3 - r) = \{3 - 2(t - 1)\}$$

このことより,

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OP}|^2 &= (5 - 2t)^2 \iff (t + 1)^2 + 3t^2 = 25 - 20t + 4t^2 \\ &\iff 22t = 24 \\ &\iff t = \frac{12}{11} \end{aligned}$$

\therefore P の座標は, $P\left(\frac{23}{11}, \frac{12\sqrt{3}}{11}\right)$(答え)

半径 r は, $r = 2 \cdot \frac{1}{11} = \frac{2}{11}$(答え)

4.2 第2回

考え方

領域・軌跡の総合的な演習です。領域・軌跡の典型的な解答は、自然流（順像法）か逆手流（逆像法）の2つです。

軽くまとめておきましょう。

〔軌跡・領域の城跡〕

$y = f(t)$ の t が全ての実数を動くとき、その軌跡（領域） W を求めたい。

1° 順像法： t をすべての実数で動かして、それらをすべて集める。

2° 逆像法： $(x, y) \in W \iff y = f(t)$ を満たす t が少なくとも一つ存在する。 $\iff \dots$

⇒ 注 逆像法を選択するか順像法を選択するかは、問題によって違う。例えば、ベクトルの和の形で表すことができるなら、それは順像法のほうが楽な場合が多いです。

2.1.0

解

以下、(1), (2), (3), (4) の通過領域を $W_i (i = 1, 2, 3, 4)$ とおく。


(1)

$$(x, y) \in W_1 \iff \exists m > 0, m^2 - mx + y = 0 \dots\dots\dots ①$$

ここで、 $f(m) = m^2 - mx + y$ とおくと、

$$\begin{aligned} ① &\iff \begin{cases} x^2 - 4y \geq 0 \\ f(0) > 0 \text{ かつ } x > 0 \\ f(0) < 0 \text{ かつ } (x < 0 \text{ または } x > 0) \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y \leq \frac{x^2}{4} \\ y > 0 \text{ かつ } x > 0 \\ y < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

これを図示すると、次図を得る。




求める領域は左図の網目部で原点を除き, $y = \frac{1}{4}x^2$ 上の境界以外すべて除く.

(2) $P(x, y)$ は方程式 $x^2 + y^2 \leq 1$ を満たす. またこのとき, $\begin{cases} X = x + y \\ Y = xy \end{cases}$ とおくと,

$$\begin{aligned} (X, Y) \in W_2 &\iff \exists(x, y), \begin{cases} X = x + y \\ Y = xy \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases} &\iff \exists(x, y), \begin{cases} X = x + y \\ Y = xy \\ (x + y)^2 - 2xy \leq 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} X^2 - 2Y \geq 1 \\ \exists t, t^2 - Xt + Y = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} Y \geq \frac{X^2}{2} - \frac{1}{2} \\ X^2 - 4Y \geq 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} Y \geq \frac{X^2}{2} - \frac{1}{2} \\ Y \leq \frac{X^2}{4} \end{cases} \end{aligned}$$

これらを図示すると, 下図の網目部が W_2 である. また, 境界はすべて含む.



(3)

$$(x, y) \in W_3 \iff \exists m, \begin{cases} (m-1)x - y + 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ mx + (m-2)y + 2 = 0 \cdots \cdots \textcircled{2} \\ m > 0 \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

ここで①より,

$$mx - x - y + 1 = 0 \iff m = \frac{x+y-1}{x} \quad (x \neq 0)$$

なので,


$$\exists m, \begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{cases} \iff \exists m, \begin{cases} m = \frac{x+y-1}{x} \quad (x \neq 0) \\ m(x+y) - 2y - 2 = 0 \\ m > 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \frac{x+y-1}{x}(x+y) - 2y - 2 = 0 \\ \frac{x+y-1}{x} > 0 \\ x \neq 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \frac{x^2 + y^2 + x - y}{x} = 0 \\ x(x+y-1) > 0 \\ x \neq 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \\ x(x+y-1) > 0 \\ x \neq 0 \end{cases}$$

これを図示すると, $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 中心の円において, $x \neq 0$ より, y 軸上の点を全て含まないことに注意して, 次図を得る.



W_3 は、左下図の太実線部で、原点、 $(1, 0)$ を除き、それ以外の境界すべて含む。

(4)

$$(x, y) \in W_4 \iff -1 \leq \exists t \leq 1, \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t^2 + t \end{cases}$$


$$\iff -1 \leq \exists t \leq 1, \begin{cases} t = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{4}x^2 + x + 1 \end{cases}$$

$$\iff -1 \exists y \leq 1 \begin{cases} t = \frac{1}{2}(x+1) \\ y = \frac{1}{4}x^2 + x + 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -2 \leq x+1 \leq 2 \\ y = \frac{1}{4}(x+2)^2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -3 \leq x \leq 1 \\ y = \frac{1}{4}(x+2)^2 \end{cases}$$

よって、下図を得る。



W_4 は、上図の太実線部で、境界すべて含み、黒丸もすべて含む。

2.1.1

●解

(1) 2点 P, Q を通る直線は,

$$\begin{aligned} y &= \frac{8t}{8}(x-4) + 2t^2 + 4t - 1 \\ &= t(x-4) + 2t^2 + 4t - 1 \end{aligned}$$


$$\therefore y = tx + 3t^2 - 1 \cdots \cdots (\text{答え})$$

(2) 領域 D を先に図示してから, 2点 A, B が D に含まれないことを言う.

D の表す式は,

$$\begin{aligned} \exists(x, y) \in D &\iff -1 \leq \exists t \leq 1, y = tx + 2t^2 - 1 \\ &\iff -1 \leq \exists t \leq 1, 2t^2 + xt - y - 1 = 0 \\ &\iff \text{二次関数 } f(t) = 2t^2 + xt - y - 1 \text{ が } -1 \leq t \leq 1 \text{ の範囲に少なくとも一つ実数解をもつ.} \end{aligned}$$


$y = f(t)$ が, $-1 \leq t \leq 1$ に少なくとも一つ実数解を持つ条件をもつための条件は, 下図を参照することにより,



$$f(-1)f(1) \leq 0 (\text{端点の積が異符号}) \text{ または } \begin{cases} (f(t) = 0 \text{ の判別式}) x^2 + 8(y+1) \geq 0 \\ -1 < \frac{x}{4} < 1 \\ f(-1) > 0 \\ f(1) > 0 \end{cases}$$

$$\iff (-x-y+1)(x-y+1) \leq 0 \text{ または } \begin{cases} y < -x+1 \\ y < x+1 \\ -4 < x < 4 \\ y \geq -\frac{1}{8}x^2 - 1 \end{cases}$$

ところで, $y' = -\frac{1}{2}x$ より, $y = -\frac{1}{8}x^2 - 1$ は, $x = \pm 4$ で $y' = \mp 1$ (復号同順) なので, $x + y = 1$ と $x - y = -1$ とそれぞれ $x = \pm 4$ で接する. これに注意して図示すると, 次図が D である.



上図の網目部が D で, A, B は含まれない. (証明終わり)(i)

D は y 軸に関して対称なので, 求める面積を S とおくと,

$$\begin{aligned} \frac{S}{2} &= -\int_0^4 \left(-\frac{1}{8}x^2 - 1 \right) dx + (1+5) \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{24} \left[x^3 \right]_0^4 + 4 + 12 \\ &= \frac{8}{3} + 16 \\ &= \frac{56}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore S = \frac{112}{3} \dots\dots(\text{答え})$$

▶ 類題演習 2.1.2 ◀


解

(1)

$$\begin{aligned}
 2x^2 + xy - y^2 - 4x + 5y - 6 &= 2x^2 + x(y-4) - y^2 + 5y - 6 \\
 &= 2x^2 + x(y-4) - (y-2)(y-3) \\
 &= \{x + (y-3)\} \{2x - (y-2)\} \\
 &= (x+y-3)(2x-y+2) \cdots \cdots (\text{答え})
 \end{aligned}$$

(2) $D: (2x+y-3)(x-y+2) > 0$ を描く.

$(x, y) = (0, 0) \notin D$ なので, D の表す領域は下図の網目部となり, 境界はすべて除く.



(4)


$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 2kx - y + k^2 < 0 &\iff (x-k)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 < \frac{1}{4} \\
 &\iff \text{中心}\left(k, \frac{1}{2}\right), \text{半径}\frac{1}{2}\text{の円の内部.}
 \end{aligned}$$

これより, $D \cap E = \emptyset$ となる k の下限値と上限値はそれぞれ,

$$x - y = -2 \text{ と } E \text{ が接するとき. (下限値)}$$

$$2x + y = 3 \text{ と } E \text{ が接するとき. (上限値)}$$

である. これより, E と (1) を同一平面内で図示して, 下限値と上限値の状態を描くと, 図は次のような図になる.



点と直線の距離公式より、E とそれぞれの直線が接するなら、中心からの距離と半径が一致するので、まず下限値は、

$$\frac{\left|2k - \frac{1}{2} + 2\right|}{\sqrt{2^2 + 1}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \left|2k + \frac{3}{2}\right| = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{4} \dots\dots\dots ①$$

である。また上限値は、

$$\frac{\left|k + \frac{1}{2} + 3\right|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \left|k - \frac{5}{2}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{5 \pm \sqrt{2}}{2} \dots\dots\dots ②$$

①, ② より、 $D \cap E = \emptyset$ になるためには下限値が、 $k > -1$, 上限値が、 $k < \frac{3}{2}$ をそれぞれ満たす必要があるので、求める k の値の範囲は、

$$\frac{-3 + \sqrt{5}}{4} \leq k \leq \frac{5 - \sqrt{2}}{2} \dots\dots(\text{答え})$$