

# 數值分析 Team5 Homework3

盧勁綸

張毓軒

李奇軒

王宥鈞

[Theoretical problems]

1. (a) Use Gaussian quadrature with  $n = 2$ , let  $f(x) = \frac{2x}{x^2-4}$

$$\begin{aligned}\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2-4} dx &= \frac{1.6-1}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{1.6-1}{2}x + \frac{1.6+1}{2}\right) dx \\ &= 0.3 \int_{-1}^1 f(0.3x + 1.3) dx \\ &\approx 0.3 [\alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \alpha_3 f(x_3)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{where } \alpha_1 &= \frac{5}{9} \approx 0.5556, \quad x_1 = -\sqrt{0.6} \approx -0.7746 \\ \alpha_2 &= \frac{8}{9} \approx 0.8889, \quad x_2 = 0 \\ \alpha_3 &= \frac{5}{9} \approx 0.5556, \quad x_3 = \sqrt{0.6} \approx 0.7746\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2-4} dx &\approx 0.3 [0.5556 * f(0.3(-0.7746) + 1.3) + 0.8889 * f(0.3 * 0 + 1.3) \\ &\quad + 0.5556 * f(0.3(0.7746) + 1.3)] \\ &= 0.3 [0.556 * f(1.0676) + 0.8889 * f(1.3) + 0.5556 * f(1.5324)] \\ &= 0.3 [(-0.4427) + (-1.0005) + (-1.0309)] \\ &= -0.7422\end{aligned}$$

And the exact value is

$$\begin{aligned}\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2-4} dx &= \int_3^{1.44} \frac{dy}{y} \quad (\text{let } y = 4 - x^2, dy = -2x dx) \\ &= [\ln(y)]_3^{1.44} \\ &= \ln(1.44) - \ln(3) \\ &= -0.734\end{aligned}$$

(b) Use Gaussian quadrature with  $n = 2$ , let  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$

$$\begin{aligned}
\int_3^{3.5} \frac{x}{\sqrt{x^2-4}} &= \frac{3.5-3}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{3.5-3}{2}x + \frac{3.5+3}{2}\right) dx \\
&\approx 0.25 [\alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \alpha_3 f(x_3)] \\
&= 0.25 [0.5556 * f(0.25 * (-0.7746) + 3.25) + 0.8889 * f(3.25) \\
&\quad + 0.5556 * f(0.25 * (0.7746) + 3.25)] \\
&= 0.25 [0.5556 * f(3.0564) + 0.8889 * f(3.25) + 0.5556 * f(3.4437)] \\
&= 0.25 [0.7345 + 1.1277 + 0.6825] \\
&= 0.6362
\end{aligned}$$

And the exact value is

$$\begin{aligned}
\int_3^{3.5} \frac{x}{\sqrt{x^2-4}} dx &= \int_5^{8.25} \frac{dy}{2\sqrt{y}} \quad (\text{let } y = x^2 - 4, dy = 2x dx) \\
&= [\sqrt{y}]_5^{8.25} \\
&= \sqrt{8.25} - \sqrt{5} \\
&= 2.8723 - 2.2361 \\
&= 0.6362
\end{aligned}$$

2. We know that given  $n$  point, we can get the order of precision to  $2n - 1$

then consider the following function.

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$$

then by the lecture note

$$\begin{aligned}
Q_n(x) &= \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) = 0 \\
I(f) &= \int_a^b f(x) dx > 0 \\
E_n &= I(f) - Q_n > 0
\end{aligned}$$

By expanding  $f$ , we knew that  $f$  can be express as

$$f(x) = \sum_{i=0}^{2n} \alpha_i x^i$$

for each  $x^i$ ,  $0 \leq i \leq 2n - 1$

$$\begin{aligned}
E_n(x^i) &= I(x^i) - Q_n(x^i) = 0 \\
\Rightarrow E_n(\alpha_i x^i) &= I(\alpha_i x^i) - Q_n(\alpha_i x^i) = 0 \\
\text{but } E_n &= I(f) - Q_n > 0 \\
\Rightarrow E_n(x^{2n}) &= I(x^{2n}) - Q_n(x^{2n}) > 0 \quad QED
\end{aligned}$$

3. Let  $h = \frac{b-a}{3}$  ,  $x_0 = a + h$  ,  $x_1 = b + h$

By Newton formula

$$\begin{aligned}
 f(t) &= f(x_0) \frac{t - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{t - x_0}{x_1 - x_0} \\
 \widetilde{\int_a^b} f(t) dt &= \int_a^b f(x_0) \frac{t - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{t - x_0}{x_1 - x_0} dt \\
 &= f\left(\frac{2a+b}{3}\right) \frac{\frac{b^2-a^2}{2} - \frac{a+2b}{3}(b-a)}{\frac{a-b}{3}} + f\left(\frac{a+2b}{3}\right) \frac{\frac{b^2-a^2}{2} - \frac{2a+b}{3}(b-a)}{\frac{b-a}{3}} \\
 &= \frac{3}{2} \left(\frac{b-a}{3}\right) \left[ f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + f\left(\frac{a+2b}{3}\right) \right] \\
 &= \frac{b-a}{2} \left[ f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + f\left(\frac{a+2b}{3}\right) \right]
 \end{aligned}$$

(1) If  $f(x) = 1$  ,  $\int_a^b 1 dx = b - a$

$$\widetilde{\int_a^b} 1 dx = \frac{b-a}{2} [1 + 1] = b - a$$

(2) If  $f(x) = x$  ,  $\int_a^b x dx = \frac{b^2-a^2}{2}$

$$\widetilde{\int_a^b} x dx = \frac{b-a}{2} \left(\frac{3a+3b}{3}\right) = \frac{b^2-a^2}{2}$$

(3) If  $f(x) = x^2$  ,  $\int_a^b x^2 dx = \frac{b^3-a^3}{3}$

$$\begin{aligned}
 \widetilde{\int_a^b} x^2 dx &= \frac{b-a}{2} \left( \frac{4a^2 + 4ab + b^2}{9} + \frac{a^2 + 4ab + 4b^2}{9} \right) \\
 &= \frac{(b-a)(5a^2 + 8ab + 5b^2)}{18} \\
 &\neq \frac{b^3 - a^3}{3}
 \end{aligned}$$

[Numerical Problems]

1.

```

for time = 1:6
h=10/10^time;
x1=0;
x2=0;
x3=0;

```

```

%Start midpoint
for i = 0:h:1-h
    x1=x1+4/(1+(i+h/2)^2);
end
x1=x1*h;

%Start trapezoid
for i = 0:h:1-h
    x2=x2+4/(1+i^2)+4/(1+(i+h)^2);
end
x2=x2*h/2;

%{
for i = 0:h:1-h

end
%}

fprintf('when h=1/%d \tuse midpoint:%f\n',10^time/10,x1);
fprintf('when h=1/%d \tuse trapezoid:%f\n',10^time/10,x2);
% fprintf('when h=1/%d \tuse Simpson:%f\n',10^time/10,x3);
end

```