


## Forces pressantes - Pression.

### I) Forces pressantes :

#### 1) Expérience :

On dispose d'un solide de type parallélépipède rectangle 20 cm × 30 cm × 60 cm de masse  $m = 1$  kg



On pose ce solide sur une cuve en verre contenant du sucre en poudre, de deux façons différentes.

Problématique : sur quelle face, le solide va s'enfoncer le plus ?

Hypothèse :

Dans les 2 cas, le solide exerce une force de contact avec le sucre en poudre identique. Cette force correspond au poids de l'objet. Le solide s'enfonce plus dans le sucre lorsque la surface de contact est plus petite.

**On pose le solide sur sa face la plus petite (schéma 1).**

$$\text{Surface} = L \times l = 0,20 \text{ m} \times 0,30 \text{ m} = 0,06 \text{ m}^2$$

$$\text{Force exercée par l'objet sur cette surface : c'est le poids} = m \times g = 1 \times 10 = 10 \text{ N}$$

$$\text{Force par unité de surface (traduit l'enfoncement): } \frac{F}{S} = \frac{10 \text{ N}}{0,06 \text{ m}^2} = 167 \text{ N/m}^2 = 167 \text{ Pascals (Pa)}$$

**On pose le solide sur sa face la plus grande (schéma 2)..**

$$\text{Surface} = L \times l = 0,20 \text{ m} \times 0,60 \text{ m} = 0,12 \text{ m}^2$$

$$\text{Force exercée par l'objet sur cette surface : c'est le poids} = m \times g = 1 \times 10 = 10 \text{ N}$$

$$\text{Force par unité de surface : } \frac{F}{S} = \frac{10 \text{ N}}{0,12 \text{ m}^2} = 83,3 \text{ N/m}^2 = 83,3 \text{ Pascals (Pa)}$$

**Remarque :** Plus la surface est importante et plus la surface diminue

Dans notre cas, la surface est 2 fois plus grande et on trouve une pression divisée par 2.