

CATALOGUE

NHÓM HÀNG GMHS



Liên hệ
CSKH

Miền Bắc
1800 6357
phím 1

Miền Trung
1800 6357
phím 2

Miền Nam
1800 6357
phím 3



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
TIỀN PHONG CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM



THUỐC GÂY TÊ - GÂY MÊ

Levobupi-BFS 50 mg

Levobupivacain 50mg/10ml

Hộp 10 ống x 10 ml

84.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Người lớn:

- Gây tê trong phẫu thuật : Phẫu thuật lớn (gây tê ngoài màng cứng, mổ đẻ, gây tê nội tủy, phong bế thần kinh ngoại biên); tiểu phẫu (gây tê thẩm thấu khu vực, phong bế quanh nhãn cầu trong phẫu thuật mắt)
- Giảm đau cấp (sau phẫu thuật, đau đẻ)

Trẻ em: giảm đau (phong bế vùng chậu - bẹn/ chậu - hạ vị)

Lidocain-BFS 200mg

Lidocain hydroclorid 200mg/10ml

Hộp 20 ống x 10 ml

15.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị kỹ thuật hoặc tiến hành các thủ thuật khác và để làm giảm các triệu chứng đau trong nhiều bệnh
- Gây tê từng lớp và các kỹ thuật gây tê phong bế thần kinh bao gồm gây tê thần kinh ngoại biên, gây tê hạch giao cảm, gây tê ngoài màng cứng, gây tê khoang vùng bụng, gây tê tủy sống
- Tiêm để điều trị cấp tính loạn nhịp thất sau nhồi máu cơ tim hoặc trong khi tiến hành các thao tác về tim như phẫu thuật tim hoặc thông tim. Thuốc chọn lọc điều trị ngoại tâm thu thất trong nhồi máu cơ tim, điều trị nhịp nhanh thất và rung tâm thất

Liproin

Lidocain 25mg/g
Prilocain 25mg/g

Hộp 1 tuýp 5g

36.500 VNĐ/tuýp

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Kem bôi ngoài da
- Gây tê bề mặt trong luồn kim (ống thông tĩnh mạch hoặc lấy máu), phẫu thuật bề mặt (phẫu thuật nông như loại bỏ fibrin, mụn và hoại tử).
- Gây tê bề mặt vết loét ở chân trước khi vệ sinh và tiến hành phẫu thuật.
- Giảm đau trong liệu pháp chiếu tia laser trên da.


Propofol-bfs

Propofol 10 mg/ml

Hộp 10 ống x 10 ml

54.600 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Propofol-BFS 10 mg/ml là thuốc gây mê toàn thân đường tĩnh mạch tác dụng ngắn dùng để:

- Khởi mê và duy trì mê toàn thân cho người lớn và trẻ em trên 1 tháng tuổi.
- An thần cho các thủ thuật chẩn đoán và phẫu thuật, sử dụng đơn trị liệu hoặc phối hợp với các thuốc gây tê tại chỗ hoặc gây tê vùng cho người lớn và trẻ em trên 1 tháng tuổi.
- An thần cho bệnh nhân thở máy trên 16 tuổi trong điều trị tích cực.

Ropicain-Bfs

Ropivacain hydrochlorid 5 mg/ml

Hộp 10 ống x 10 ml

90.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Gây tê phẫu thuật:

- Gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật, bao gồm cả mổ đẻ
- Gây tê nội tủy mạc (dưới màng nhện) Phong bế thần kinh lớn
- Phong bế thần kinh ngoại biên và gây tê vùng có chọn lọc

Giảm đau cấp:

- Truyền liên tục ngoài màng cứng hoặc tiêm liều cao gián đoạn để giảm đau sau phẫu thuật hoặc giảm đau khi sinh
- Phong bế thần kinh ngoại biên và gây tê vùng có chọn lọc
- Phong bế thần kinh ngoại biên liên tục bằng cách truyền hoặc tiêm gián đoạn, ví dụ: kiểm soát đau sau phẫu thuật

Giảm đau cấp ở trẻ em (trong và sau phẫu thuật):

- Phong bế ngoài màng cứng vùng thắt lưng cùng ở trẻ sơ sinh, trẻ nhũ nhi và trẻ ≤ 12 tuổi.
- Truyền liên tục ngoài màng cứng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhũ nhi và trẻ ≤ 12 tuổi.

DEMEDIN-BFS

Dexmedetomidin 0,1 mg/ml

Hộp 1 lọ x 2 ml



Chỉ định:

Demedin-BFS được chỉ định trong các trường hợp sau:

- An thần cho bệnh nhân trưởng thành cần được chăm sóc tích cực, yêu cầu mức độ an thần không sâu hơn mức độ kích thích, cho phép đáp ứng được với các kích thích bằng lời nói (tương ứng với điểm từ 0 đến -3 điểm trong thang điểm kích thích - an thần Richmond (RASS)).
- Để an thần cho các bệnh nhân trưởng thành không đặt ống nội khí quản trước khi và/hoặc trong khi chẩn đoán hoặc quy trình phẫu thuật yêu cầu dùng thuốc an thần, như là thủ tục gây mê/an thần còn tỉnh

THUỐC GIÃN CƠ - GIẢI GIÃN CƠ

BFS-Neostigmine

Neostigmin metylsulfat 0,25 mg/ml

Hộp 20 ống x 1 ml

5.460 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Mất trương lực cơ ruột, bàng quang
- Bệnh nhược cơ
- Giải độc khi dùng liều thuốc giãn cơ kiểu cura

Rocuronium-BFS

Rocuronium bromid 50mg/5ml

Hộp 5 ống x 5 ml

67.200 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Giãn cơ trong phẫu thuật, đặt nội khí quản

BFS-Atracu

Atracurium besylat 10 mg

Hộp 20 ống x 1 ml

80.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Mất trương lực cơ ruột, bàng quang
- Bệnh nhược cơ
- Giải độc khi dùng liều thuốc giãn cơ kiểu cura

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DỪNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẮN

Adrenaline-BFS 5mg

Epinephrin (adrenalin) 5mg/5ml

Hộp 10 ống x 5 ml

25.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Hồi sức tim phổi
- Cấp cứu choáng phản vệ và choáng dạng phản vệ (có giãn mạch hệ thống và cung lượng tim thấp)
- Cơ hen ác tính (phối hợp với các thuốc khác như glucocorticoid, salbutamol)

DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

Kama-BFS

Magnesi aspartat 400mg/10ml
Kali aspartat 452mg/10ml

Hộp 10 ống x 10 ml

16.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Điều trị suy tim, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim (chủ yếu là loạn nhịp thất)
- Cải thiện dung nạp glycosid tim

THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DỪNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

BFS-Noradrenalin 10mg

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)
10 mg/10 ml

Hộp 10 ống x 10 ml

145.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Ngừng tim: là thuốc dùng phối hợp trong ngừng tim có huyết áp thấp
- Kéo dài tác dụng gây tê: Có thể dùng noradrenalin, nhưng trong mục đích này adrenalin được ưa dùng hơn
- Kiểm soát huyết áp trong tụt huyết áp cấp hay tình trạng sốc: Noradrenalin được chỉ định như một thuốc phụ để điều trị huyết áp thấp vẫn kéo dài trong sốc sau khi đã được bồi dịch đầy đủ (Hiệu quả của thuốc trong điều trị sốc vẫn còn chưa rõ ràng, đặc biệt sốc do nhiễm khuẩn huyết, bỏng, chấn thương hay quá liều thuốc. Thuốc có thể gây tác dụng không mong muốn trên người bệnh)

BFS-Noradrenalin 4mg

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)
4 mg/4 ml

Hộp 10 ống x 4 ml

105.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Ngừng tim: là thuốc dùng phối hợp trong ngừng tim có huyết áp thấp
- Kéo dài tác dụng gây tê: Có thể dùng noradrenalin, nhưng trong mục đích này adrenalin được ưa dùng hơn
- Kiểm soát huyết áp trong tụt huyết áp cấp hay tình trạng sốc: Noradrenalin được chỉ định như một thuốc phụ để điều trị huyết áp thấp vẫn kéo dài trong sốc sau khi đã được bồi dịch đầy đủ (Hiệu quả của thuốc trong điều trị sốc vẫn còn chưa rõ ràng, đặc biệt sốc do nhiễm khuẩn huyết, bỏng, chấn thương hay quá liều thuốc. Thuốc có thể gây tác dụng không mong muốn trên người bệnh)

Sugam-BFS

Sugammadex 100mg/ml

Hộp 10 ống x 2 ml

1.575.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Hóa giải phong bế thần kinh cơ gây ra bởi rocuronium hoặc vecuronium
- Đối với nhóm bệnh nhi: chỉ nên dùng sugammadex để hóa giải phong bế thần kinh cơ thông thường gây ra bởi rocuronium ở trẻ em và thanh thiếu niên (2 đến 17 tuổi)

THUỐC CHỐNG NHIỄM KHUẨN, NẤM

Metroral

Metronidazol 200 mg/5 ml
(dưới dạng metronidazol benzoat)

Hộp 1 lọ x 60ml

99.000 VNĐ/hộp

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Metronidazol được chỉ định trong dự phòng và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn kỵ khí đã được xác định hoặc nghi ngờ là mầm bệnh. Có tác dụng trên nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli và các chủng vi sinh khác của loài bacteroides, fusobacteria, eubacteria, clostridia.

Bfs-Ciprofloxacin

Ciprofloxacin 200mg/10ml

Hộp 10 ống x 10 ml

55.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các kháng sinh thông thường không còn tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn kháng ciprofloxacin

Levof-BFS 250mg

Ciprofloxacin 200mg/10ml

Hộp 10 ống x 10 ml

44.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với levofloxacin:

- Viêm phổi (viêm phổi bệnh viện hoặc viêm phổi mắc tại cộng đồng)
- Nhiễm khuẩn da và tổ chức dưới da có biến chứng hay không
- Viêm tuyến tiền liệt mạn tính
- Viêm thận - bể thận
- Dự phòng sau khi phơi nhiễm và điều trị triệt để bệnh thận
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp
- Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính
- Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn

Levof-BFS 500mg

Ciprofloxacin 500mg/10ml

Hộp 10 ống x 10 ml

88.200 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với levofloxacin:

- Viêm phổi (viêm phổi bệnh viện hoặc viêm phổi mắc tại cộng đồng)
- Nhiễm khuẩn da và tổ chức dưới da có biến chứng hay không
- Viêm tuyến tiền liệt mạn tính
- Viêm thận - bể thận
- Dự phòng sau khi phơi nhiễm và điều trị triệt để bệnh thận
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp
- Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính
- Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn

Line-BFS 600 mg

Linezolid 600 mg/10 ml

Hộp 10 ống x 10 ml

195.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Linezolid được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn sau đây bao gồm cả các trường hợp có nghi ngờ hoặc đã xác định có nhiễm khuẩn huyết đồng thời, do các chủng vi khuẩn hiếu khí hoặc kỵ khí Gram (+) nhạy cảm gây ra. Điều trị phối hợp có thể được chỉ định trên lâm sàng trong trường hợp vi khuẩn gây bệnh bao gồm cả các chủng vi khuẩn Gram (-). Linezolid chỉ có tác dụng trên các vi khuẩn Gram(+)
- Linezolid không có hoạt tính trên các chủng vi khuẩn gây bệnh Gram(-). Cần sử dụng liệu pháp có tác dụng đặc hiệu trên các vi khuẩn Gram(-) trong trường hợp đã xác định hoặc nghi ngờ nhiễm đồng thời vi khuẩn Gram(-)
- Viêm phổi bệnh viện
- Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm nặng có biến chứng

Fluco-SB

Fluconazol 2mg/ml

Hộp 1 túi x 50 ml

94.000 VNĐ/túi

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Trong các trường hợp nhiễm nấm sau:

- Fluconazol được chỉ định điều trị và dự phòng ở người lớn:
- Viêm màng não do cryptococcus
- Sốt thung lũng (bệnh nấm coccidioides)
- Nhiễm nấm Candida xâm lấn
- Nhiễm nấm Candida niêm mạc: nhiễm nấm vùng miệng, thực quản, nhiễm Candida tiết niệu, nhiễm nấm Candida niêm mạc da mạn tính.
- Nhiễm dạng nấm teo mạn tính đường miệng nếu điều trị tại nhà bằng vệ sinh răng miệng không đáp ứng

THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

Fogyma

Sắt nguyên tố (dưới dạng phức hợp Sắt (III) hydroxyd polimantose) 50mg

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 10 ml

7.500 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Bổ sung sắt cho bệnh nhân có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt như:
- Phụ nữ có thai
- Phụ nữ cho con bú
- Người suy dinh dưỡng
- Người bệnh sau phẫu thuật
- Trẻ em thiếu máu cho thiếu sắt, chậm lớn, còi cọc

Fogyma

Sắt nguyên tố (dưới dạng phức hợp Sắt (III) hydroxyd polimantose)

Hộp 1 lọ x 120 ml

120.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Bổ sung sắt cho bệnh nhân có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt như:
- Phụ nữ có thai
- Phụ nữ cho con bú
- Người suy dinh dưỡng
- Người bệnh sau phẫu thuật
- Trẻ em thiếu máu cho thiếu sắt, chậm lớn, còi cọc

THUỐC TIM MẠCH

BFS-Adenosin

Adenosine 3mg/1ml

Hộp 1 ống x 2 ml

800.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Nhịp nhanh kịch phát trên thất, bao gồm cả hội chứng Wolff - Parkinson - White để chuyển nhanh về nhịp xoang
- Thuốc hỗ trợ trong kỹ thuật xạ hình tưới máu cơ tim trên những bệnh nhân không thể thực hiện được gắng sức thể lực thích hợp: Adenosin dùng để làm giãn động mạch vành cùng với chụp hiện hình tưới máu cơ tim hoặc siêu âm gắng sức để phát hiện các khiếm khuyết trong tưới máu hoặc cơ bóp bất thường cục bộ do bệnh động mạch vành
- Chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh trên thất

BFS-Amiron

Amiodaron hydroclorid
150mg/3m

Hộp 10 ống x 3 ml

24.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Chỉ định điều trị trong các rối loạn tim nghiêm trọng mà các phương pháp khác không hiệu quả hoặc chống chỉ định

BFS-Nicardipin

Nicardipin hydroclorid
10mg/10ml

Hộp 20 ống x 10 ml

84.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Điều trị tăng huyết áp đe dọa tính mạng, tăng huyết áp sau phẫu thuật

Digoxin-BFS

Digoxin 0,25mg/1ml

Hộp 10 ống x 1 ml

16.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Digoxin được chỉ định điều trị suy tim mạn tính. Lợi ích điều trị của digoxin tốt hơn ở bệnh nhân giãn thất
- Digoxin được chỉ định đặc biệt cho suy tim kèm theo rung tâm nhĩ
- Digoxin được chỉ định điều trị loạn nhịp nhanh trên thất (cuồng nhĩ, rung nhĩ, nhịp nhanh trên thất)
- Digoxin tiêm được chỉ định khi cần dùng digitalin tiêm khẩn cấp ở bệnh nhân không dùng glycosid tim trong vòng 2 tuần trước

Dobutamin-BFS

Dobutamin 250mg/5ml

Hộp 10 ống x 5 ml

55.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Điều trị ngắn hạn suy tim
- Sử dụng trong siêu âm thăm dò chức năng tim phát hiện nhồi máu cơ tim hoặc các vùng cơ tim còn sống khi nghiệm pháp gắng sức không thể tiến hành được

DoBu SB

Dobutamin 250mg/250ml

Hộp 1 túi x 250 ml

100.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch DOBU-SB 1mg/ml được chỉ định điều trị trong các trường hợp:

- Hỗ trợ cơ bóp tim trong điều trị ngắn hạn cho bệnh nhân bị suy tim cấp, suy tim mất bù do giảm lực cơ bóp cơ tim trong bệnh tim hoặc phẫu thuật tim.
- Thuốc cũng được dùng trong sốc nhiễm khuẩn.
- Có thể chỉ định dobutamin trong một số trường hợp khác như phẫu thuật tim, thông khí áp lực dương cuối thì đường thở.
- Đối với suy tim sung huyết mạn tính, thuốc có thể được sử dụng điều trị nhưng phải thận trọng và không dùng thuốc dài hạn.
- Thuốc còn được sử dụng trong nghiệm pháp gắng sức để chẩn đoán bằng siêu âm hoặc xạ hình tim trong bệnh mạch vành.

Milrinone-BFS

Milrinon 10mg/10ml

Hộp 1 lọ x 10 ml

1.260.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Điều trị ngắn hạn suy tim sung huyết nghiêm trọng

Nimovaso Sol

Nimodipin 30mg/10ml

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 10ml

15.750 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Dự phòng thiếu máu cục bộ thần kinh sau xuất huyết dưới màng nhện do vỡ phình mạch nội sọ

Nausazy 4mg

Ondansetron 4mg/5ml

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml

14.700VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Người trưởng thành:

- Được chỉ định điều trị buồn nôn và nôn gây ra bởi hóa trị liệu gây độc tế bào và xạ trị.
- Được chỉ định để phòng ngừa và điều trị buồn nôn và nôn sau mổ.

Bệnh nhi:

- Điều trị buồn nôn và nôn do hóa trị gây ra ở trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và để phòng ngừa.
- Điều trị buồn nôn và nôn sau phẫu thuật ở trẻ em từ 1 tháng tuổi trở lên

BFS- Grani

Granisetron hydroclorid 1,12mg/1ml

Hộp 10 ống x 1 ml

50.400VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Người lớn:

- Buồn nôn, nôn liên quan đến hóa trị và xạ trị
- Buồn nôn và nôn sau phẫu thuật

Trẻ em từ 2 tuổi:

- Điều trị buồn nôn và nôn cấp tính do hóa trị liệu



PROGERMILA

Bacillus clausii 2x10⁹



Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml

Giá:

109.200đ/hộp
(đã bao gồm VAT)

CHỈ ĐỊNH

- Thuốc Progermila điều trị và phòng ngừa rối loạn khuẩn chí đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh
- Hỗ trợ phục hồi hệ khuẩn chí đường ruột do ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị liệu
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính ở trẻ em do nhiễm độc hoặc rối loạn khuẩn chí đường ruột và kém hấp thu vitamin

CÁCH DÙNG:

- Người lớn: 2-3 ống/ngày.
- Trẻ em: 1-2 ống/ngày.
- Lắc đều và uống trực tiếp hoặc có thể hòa với sữa, nước trà hoặc nước cam...

THUỐC THỨC ĐẸ, CẦM MÁU SAU ĐẸ VÀ CHỐNG ĐẸ NON

Hemotocin

Carbetocin 100mcg/ml

Hộp 10 ống x 1 ml

346.500 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Ngăn ngừa mất Trướng lực tử cung và xuất huyết hậu sản sau mổ lấy thai chủ động dưới sự gây tê ngoài màng cứng hoặc gây mê tùy sống

Hemastop

Carboprost tromethamin
332mcg/1ml

Hộp 10 ống x 1 ml

290.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Điều trị băng huyết sau sinh, đặc biệt do đờ tử cung
- Dự phòng cho các bệnh nhân có nguy cơ cao bằng cách tiêm bắp cho mẹ vào lúc sổ vai trước của thai nhi:
- Sản phụ lớn tuổi đã sinh nhiều lần
- Tiền sản giật
- Chuyển dạ nhanh hoặc kéo dài
- Bất thường nhau thai
- Phẫu thuật tử cung trước đây
- Tiền sử bị băng huyết sau sinh
- Tiền sử sót nhau
- Căng tử cung quá mức (đa thai, đa ối, thai lớn).

Atosiban-BFS

Atosiban 7,5mg/ml

Hộp 1 ống x 5 ml

1.575.000 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Chỉ định làm chậm hoặc làm trì hoãn thời gian sinh sắp xảy ra ở thai phụ có:
- Cơ co tử cung đều đặn với thời gian ít nhất 30s với tốc độ 4>= cơn mỗi 30 phút
- Giãn cổ tử cung 1-3 cm (0-3cm đối với người chưa sinh đẻ) và xóa cổ tử cung>=50%
- Tuổi thai từ đủ 24 tuần đến đủ 33 tuần
- Nhịp tim thai bình thường

KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

Trainfu

Sắt clorid 4,436mg/10ml
Kẽm clorid 6,815mg/10ml
Mangan clorid 1,258mg/10ml
Đồng clorid 1,614mg/10ml
Crôm clorid 0,032mg/10ml
Natri molybdat dihydrat
0,0242mg/10ml
Natri selenid pentahydrat
0,0789mg/10ml
Natri fluorid 1,260mg/10ml
Kali iodid 0,166mg/10ml

Hộp 10 ống x 10 ml

29.400 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Cung cấp các nguyên tố vi lượng cho bệnh nhân là người lớn được nuôi dưỡng nhân tạo qua đường tĩnh mạch

KHÁC

Zenace

Acetylcystein 1000mg/10ml

Hộp 10 ống x 10 ml

12.600 VNĐ/ống

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

Điều trị hỗ trợ cho các bệnh nhân bài tiết chất nhầy đặc, dẻo hoặc bất thường như trong các trường hợp sau:

- Bệnh phổi phế quản mạn tính (Khí phế thũng mạn tính, khí phế thũng kèm viêm phế quản, viêm phế quản hen suyễn mạn tính, lao phổi, giãn phế quản và thoái biến dạng bột nguyên phát ở phổi)
- Bệnh phổi phế quản cấp tính (viêm phổi, viêm phế quản, viêm khí phế quản)
- Biến chứng hô hấp của bệnh xơ nang
- Biến chứng hô hấp sau phẫu thuật
- Tình trạng sau chấn thương ngực
- Xẹp phổi do tắc nghẽn chất nhờn
- Chăm sóc mở khí quản
- Gây mê
- Acetylcystein cũng có thể dùng như một thuốc hỗ trợ trong các nghiên cứu cứu phế quản chẩn đoán (hô hấp khí phế quản, chụp phế quản, thông phế quản)

Laforin Curespray

Chlorhexidin digluconat.....0,2% w/v

Hộp 1 lọ x 30ml

79.000 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Chỉ định:

- Ước chế hình thành các mảng bám trên răng.
- Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm nướu và vệ sinh răng miệng, đặc biệt trong các trường
- hợp việc đánh răng không thể thực hiện một cách thường xuyên (ví dụ ở bệnh nhân sau
- phẫu thuật miệng, bệnh nhân có trở ngại về thể chất hoặc tinh thần, bệnh nhân bị bệnh nan y hoặc suy giảm miễn dịch).
- Là liệu pháp trong chế độ điều trị sau phẫu thuật để thúc đẩy quá trình lành nướu.
- Kiểm soát loét miệng và nhiễm nấm miệng (ví dụ viêm miệng do răng giả, tưa miệng).
- Hỗ trợ điều trị viêm họng, viêm amidan...

Thạch dinh dưỡng Zodiac

Nước tinh khiết, đường, chất làm dày, chất điều chỉnh độ acid (330), hương tổng hợp (hương dứa, hương xoài, hương cam, hương dâu, hương táo, hương ổi, hương nho, hương việt quất, hương chuối, hương chanh leo, hương vải, hương dưa), chất xơ hòa tan (FOS), chất bảo quản (211), vitamin C, immune Path-IP, chất điều vị (950, 955), màu thực phẩm (110, 102, 133, 124, 129), pro-vitamin B5, vitamin PP, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6.

Túi 12 gói x 15g

24.640 VNĐ/Túi

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Bổ sung các vitamin nhóm B, B1, B2, B6, PP, pro-vitamin B5 và vitamin C

Thạch Zodiac

Nước tinh khiết, đường, chất làm dày, chất điều chỉnh độ acid (330), hương tổng hợp (hương dứa, hương xoài, hương cam, hương dâu, hương táo, hương ổi, hương nho, hương việt quất, hương chuối, hương chanh leo, hương vải, hương dưa), chất xơ hòa tan (FOS), chất bảo quản (211), vitamin C, immune Path-IP, chất điều vị (950, 955), màu thực phẩm (110, 102, 133, 124, 129), pro-vitamin B5, vitamin PP, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6.

Túi 1 kg

115.000 VNĐ/túi

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Bổ sung các vitamin nhóm B, B1, B2, B6, PP, pro-vitamin B5 và vitamin C

Laforin 500ml

Chlorhexidine digluconate - 0,12%,
Sodium fluoride - 0,05%

Hộp 1 lọ 500ml

94.500 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Chứa thành phần Chlorhexidine và Sodium fluoride tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn, nên hiệu quả trong các trường hợp sử dụng ngăn ngừa để:
- Phòng và hỗ trợ làm giảm các triệu chứng viêm họng, viêm lợi, đau họng, cảm cúm.
- Sau phẫu thuật răng miệng.
- Bệnh nhân nằm viện dài ngày.

Laforin baby hương cam

Propolis extract.....0.1 mg
Sodium chloride.....9.0 mg
Sodium fluoride..... 0.2 mg
Green tea extract.....0.5 mg

Hộp 1 lọ 350ml

55.650 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ em.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi.
- Giúp hơi thở thơm mát.

Laforin baby hương đào

Propolis extract.....0.1 mg
Sodium chloride.....9.0 mg
Sodium fluoride..... 0.2 mg
Green tea extract.....0.5 mg

Hộp 1 lọ 350ml

55.650 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ em.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi.
- Giúp hơi thở thơm mát.

Laforin baby hương ổi

Propolis extract.....0.1 mg
Sodium chloride.....9.0 mg
Sodium fluoride..... 0.2 mg
Green tea extract.....0.5 mg

Hộp 1 lọ 350ml

55.650 VNĐ/lọ

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ em.
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu - lợi.
- Giúp hơi thở thơm mát.

BÙ ĐIỆN GIẢI

Glukan hương tăng lực

Mỗi 100 ml có chứa:
Glucose; natri citrat 290 mg
Natri clorid 260 mg, Kali clorid
Immunepath- IP (chiết xuất từ thành
tế bào của chủng lợi khuẩn
Lactobacillus paracasei)
Kẽm (dưới dạng kẽm gluconat) 1 mg
Thùng 24 chai x 265ml

216.000 VNĐ/thùng

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Bù Nước - Điện giải, Kẽm và Postbiotics

Cách dùng:

- Trẻ từ 1 - 12 tuổi: 1 chai sau mỗi lần mất nước
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn: 1 - 2 chai sau mỗi lần mất nước
- Uống ngon hơn khi dùng lạnh.

Glukan hương dâu

Mỗi 100 ml có chứa:
Glucose; natri citrat 290 mg
Natri clorid 260 mg, Kali clorid
Immunepath- IP (chiết xuất từ thành
tế bào của chủng lợi khuẩn
Lactobacillus paracasei)
Kẽm (dưới dạng kẽm gluconat) 1 mg
Thùng 24 chai x 265ml

216.000 VNĐ/thùng

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Bù Nước - Điện giải, Kẽm và Postbiotics

Cách dùng:

- Trẻ từ 1 - 12 tuổi: 1 chai sau mỗi lần mất nước
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn: 1 - 2 chai sau mỗi lần mất nước
- Uống ngon hơn khi dùng lạnh.

Glukan hương cam

Mỗi 100 ml có chứa:
Glucose; natri citrat 290 mg
Natri clorid 260 mg, Kali clorid
Immunepath- IP (chiết xuất từ thành
tế bào của chủng lợi khuẩn
Lactobacillus paracasei)
Kẽm (dưới dạng kẽm gluconat) 1 mg
Thùng 24 chai x 265ml

216.000 VNĐ/thùng

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Bù Nước - Điện giải, Kẽm và Postbiotics

Cách dùng:

- Trẻ từ 1 - 12 tuổi: 1 chai sau mỗi lần mất nước
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn: 1 - 2 chai sau mỗi lần mất nước
- Uống ngon hơn khi dùng lạnh.

Glukan hương vải

Mỗi 100 ml có chứa:
Glucose; natri citrat 290 mg
Natri clorid 260 mg, Kali clorid
Immunepath- IP (chiết xuất từ thành
tế bào của chủng lợi khuẩn
Lactobacillus paracasei)
Kẽm (dưới dạng kẽm gluconat) 1 mg
Thùng 24 chai x 265ml

216.000 VNĐ/thùng

(Giá đã bao gồm VAT)



Công dụng:

- Bù Nước - Điện giải, Kẽm và Postbiotics

Cách dùng:

- Trẻ từ 1 - 12 tuổi: 1 chai sau mỗi lần mất nước
- Trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn: 1 - 2 chai sau mỗi lần mất nước
- Uống ngon hơn khi dùng lạnh.



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

A: Cụm CN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội
T: 024 3376 5503

CHI NHÁNH HÀ NỘI

A: Số 1 lô DX, Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hoàng Liệt, Hà Nội
T: 024 3218 1360

 www.cpc1hn.com.vn

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

A: Đường số 2, KCN Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
T: 0236 650 6540

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

A: Số 26 - 28 Hàn Mạc Tử, Phú Thọ Hòa, Hồ Chí Minh
T: 0286 267 8144

 www.facebook.com/cpc1hn