

بەشى يەكەم · بىنەماكان

كەى نەخشەيەك بەرز دەبىتەو و كەى دادەبەزىت؟

لە لىژىيەو بۇ خالى شلۇق — بەبى ئەوئى پىشتەر هېچت لەسەر داتاشراو زانبييت

لەم بەشەدا فىرى ئەمانە دەبىت

- ✓ واتاي لىژى چىيە و چۆن پىمان دەلىت نەخشەكە بەرز دەبىتەو يان دادەبەزىت.
- ✓ هىماي $f'(x)$ چى دەگەيەنىت و چۆن دەخوئىنەو.
- ✓ چۆن خالى شلۇق بدۆزىنەو — ئەو خالەى نەخشەكە تىيدا ئاراستە دەگۆرپت.
- ✓ چۆن خشتەى هىما بە چوار هەنگاو دروست بکەيت.

پىويسىت نىيە بترسىت هەموو هىمايەكى نوئ لە يەكەم جازدا بە زمانى ساكار پروون دەكرىتەو، و لە كۆتايى بەشەكەدا خشتەيەكى وشە هەيە كە هەموويان كۆدەكاتەو.

۱ پیش دهستی کردن: نه مانه بزانه

ئهم شهش شته له پۆلی ۹ و ۱۰ هوه فیروویت. خیرا بیانخوینهوه و راهینانه بچووکه کان جیبه جی بکه — ئه گهر نه مانته له بهرده ستدا بیته، به شهکانی دواتر ئاسان ده بن.

۲ روونکردنهوهی نهخسه

ههر جووته ژمارهیهک (x, y) ده بیته خالیك. هه موو خاله کان پیکه وه چه مانه یهک دروست ده کهن.

هیلێک $\rightarrow (1, 3), (2, 6), (3, 9)$

۱ نهخسه چییه؟

ئامپێکه: ژمارهیهکی پیده دهیت، ژمارهیهکت پیده داته وه.

$2 \rightarrow f(x) = 3x \rightarrow 6$

$$f(2) = 3 \times 2 = 6$$

۴ دانانهوه له فۆرمولدا

له بری x ژماره که داده نیته و لێکی ده ده یته وه.

$$f(x) = x^2 - 6x \Rightarrow f(1) = 1 - 6 = -5$$

۳ لێژی هیل

لێژی = بهرزبونهوه ÷ رویشتن. ئه گهر موجه بوو هیلکه سهرده که ویت، ئه گهر سالب بوو داده به زیت.

$$m = 1.5 \div 2 = 0.75$$

۶ هیمای لیکدان

موجه $\times$ موجه = موجه. موجه $\times$ سالب = سالب.

$$(-2)(5) = -10 \cdot (-2)(-5) = +10$$

۵ ده رهینانی فاکتهری هاوبهش

ئه گهر x له ههردوو به شدا هه بوو، ده ری ده هی نهیت.

$$3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

خۆت تاقی بکه ره وه ★

۱ ئه گهر $f(x) = x^2 - 4x$ بیته، $f(3)$ چه نه ده؟

۲ فاکتهری هاوبهشی $2x^2 - 8x$ ده ره ی نه.

۳ هیلێک له ههر رویشتنی ۲ به ۶ بهرز ده بیته وه. لێژییه که ی چه نه ده؟

هولام: $3(3 \cdot 2x(x - 4) - 3(1 - 3))$

٢ بیرۆکه‌که: ریڭایه‌کی چیا


بیرۆکه

وا بیربکه‌ره‌وه که به ریڭایه‌کدا ده‌رۆیت که به‌سه‌ر گردیڭدا تیده‌په‌ریت. سه‌ره‌تا **سه‌رده‌که‌ویت**، پاشان **داده‌به‌زیت**.

له‌نیوان ئه‌و دوو به‌شه‌دا خالی‌ک هه‌یه که ریڭاکه تیی‌دا نه سه‌رده‌که‌ویت و نه داده‌به‌زیت — **ته‌خته**. ئه‌و خاله به‌رزترین خالی ریڭاکه‌یه.

نه‌خشه‌کانیش هه‌ر به‌و شیوه‌یه‌ن. ئه‌وه‌ی ده‌مانه‌ویت بیدۆزینه‌وه ئه‌م دوو پرسیاره‌یه:

- 1 له کام ماوه‌دا نه‌خشه‌که **به‌رز ده‌بیته‌وه** و له کام ماوه‌دا **داده‌به‌زیت**؟
- 2 ئه‌و خالانه له کوین که نه‌خشه‌که تییاندا **ناراسته** ده‌گۆریت؟



سه‌رکه‌وتن، ته‌ختبون، داهاتن


ناوی فهرمی به‌و خاله‌ی نه‌خشه‌که تیی‌دا ته‌خت ده‌بیته ده‌وتریت **خال شلۆق**، وه به‌و نرخه‌ی x که له‌ویدا به ده‌وتریت به‌های **شلۆق**.

وردبونه‌وه له وینه‌که ★

- 1 له به‌شه **سه‌وزه‌که‌دا**، ریڭاکه سه‌رده‌که‌ویت یان داده‌به‌زیت؟
- 2 له خاله **ئه‌مبه‌رییه‌که‌دا**، ریڭاکه چۆنه؟
- 3 دوا‌ی ئه‌و خاله، ریڭاکه چی لیدیته؟

وه‌لام: 1) سه‌رده‌که‌ویت 2) ته‌خته، نه سه‌رده‌که‌ویت نه داده‌به‌زیت 3) داده‌به‌زیت

۳ لە لیژییەو و بۆ داتاشراو



بۆ ھێلێکی راست، لیژی یەك ژمارەو و لە ھەموو شوێنێکدا وەك یەكە:

$$m = \frac{\text{بەرزبۆونەو}}{\text{رۆیشتن}}$$


بەلام چەمانەیک لە ھەر خالێکدا لیژییەکی جیاوازی ھەیە. بۆیە پێویستمان بە ئامرازێکە کە لیژی لە ھەر خالێکدا پێمان بۆت.

لیژی ھێلێکی راست


ھێمای نوێ

ئەو ئامرازە بە $f'(x)$ دەناسرێت و بەم شیوەیە دەخوێنێتەو: «داتاشراوی یەكەمی f لە x ».


ئەوێ دەیکات تەنھا یەك شتە: لیژی نەخشەکەت پێدەلێت لەو خالەدا.



لیژی سالب — نەخشەکە دادەبەزێت



لیژی سفر — نەخشەکە تەختە



لیژی مۆجەب — نەخشەکە بەرز دەبێتەو

قاعیدەى بنەرەتى — تەنھا ئەمە لەبەر بکە

$$f'(x) < 0$$

دادەبەزێت

$$f'(x) = 0$$

خالێ شلۆق

$$f'(x) > 0$$

بەرز دەبێتەو

٤ رېبازه که: چوار ههنگاو

- 1 داتاشراوه وهرېگره — $f'(x)$ بدۆزهوه.
- 2 يه کسانى بکه به سفر — $f'(x) = 0$ و نرخى x بدۆزهوه. ئهمه به هاى شلۆقه.
- 3 خشته که دروست بکه — هیلّی ژماره کان به به هاى شلۆق دابهش بکه.
- 4 هیلّی تاقى بکهروهه — له ههر ماوه يه که ژماره يه کی ئاسان هه لّېژیره و له f' دايینی.

خشته که به ههنگاو دروست دهکړیت

- 1 نهخشه که: $f(x) = x^2 - 6x + 8$
- 2 داتاشراوه کهى: $f'(x) = 2x - 6$
- 3 يه کسان به سفر: $2x - 6 = 0$ واتا $x = 3$

٣ ناراسته بنووسه

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	- - -	0	+ + +
$f(x)$		-1	

٢ هیلّی تاقى بکهروهه

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	- - -	0	+ + +

١ هیلّی ژماره کان دابهش بکه

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	?	0	?

بۆ ههنگاوى ٢ له ماوه ي چهپ ژماره 0 هه لّده بژيړين: $f'(0) = 2(0) - 6 = -6$ که **سالبه**. له ماوه ي راست 4 هه لّده بژيړين: $f'(4) = 2(4) - 6 = 2$ که **موجه به**.

۵ نەمۇنەيەكى تەواو، ھەنگاو بە ھەنگاو

ماوہى بەرزبۆونەو و داھاتنى $f(x) = x^2 - 6x + 8$ بدۆزەو و خالى شلۆقەكەى ديارى بکە.

ئەمە نەخشەكەبە. $8+$ کاریگەرى
لەسەر لیژی نییە، چونکە ژمارەيەكى
نەگۆرە.

$$۱ \quad f(x) = x^2 - 6x + 8$$

داتاشراوہمان وەرگرت. ئیستا ئەم
فۆرمولە لیژیمان پندەلپت لە ھەر
خیکدا.

$$۲ \quad f'(x) = 2x - 6$$

لیژی یەکسان کرد بە سفر، واتا لە
کوی نەخشەكە تەختە. ئەمە
بەھای شلۆقە.

$$۳ \quad 2x - 6 = 0 \implies x = 3$$

دوو ژمارەى ئاسانمان ھەلبارد،
یەکیک لەپیش 3 و یەکیک لە دواى.
ھێماکە گۆرا.

$$۴ \quad f'(0) = -6 < 0 \quad f'(4) = +2 > 0$$

نرخى x لە نەخشە بنەرەتیەكە
دادەنپینەوہ تا بەرزى خالەكە بزانی.


$$۵ \quad f(3) = 9 - 18 + 8 = -1$$

وہلام


دادەبەزیت لە ماوہى $]-\infty, 3[$

بەرز دەیتتەوہ لە ماوہى $]3, +\infty[$

خالى شلۆق $(3, -1)$ — ئەمە نزمترین خالى نەخشەكەيە.



پروونکردنه وهی $f(x) = x^2 - 6x + 8$



هیمای f' له سه ره یلی ژماره کان

٦ راهیان و ههله باوهکان

خوت تاقی بکهره وه ★ ناست يهک

١ $f'(x) = 4x - 8$. بهای شلوق بدوزه وه.

٢ تهگه $f'(5) = -3$ ییت، نهخشه که لهو خالدا بهرز ده بیته وه یان داده به زیت؟

٣ $f(x) = x^2 - 10x$. داتاشراوه که ی بنووسه.

وهلام: $f'(x) = 2x - 10$ (٣ · داده به زیت ٢ · $x = 2$ ١)

خوت تاقی بکهره وه ★★ ناست دوو

٤ بو $f(x) = x^2 - 4x + 1$: بهای شلوق، خشته ی هیما و خالی شلوق بدوزه وه.

٥ بو $f(x) = 6x - x^2$: له کام ماوه دا بهرز ده بیته وه؟

وهلام: $x = 2$ (٤ خالی شلوق $(2, -3)$ ٥ · $]-\infty, 3[$)

هەلە باوەکان — ئاگادارى ئەمانە بە

✓ بەھای شلۆق تەنھا x . خالى شلۆق جووتەى (x, y) ە.

✗ بەھای شلۆق و خالى شلۆق وەك يەك نین.

✓ ھەندىك جار نەخشەكە تەنھا تەخت دەپىت و ئاراستە ناگۆرپىت.

✗ $f'(x) = 0$ واتا ھەمىشە بەرزترین يان نزمترین خال.

✓ ھىما ھەمىشە لە $f'(x)$ تاقى دەكرىتەو، نەك لە نەخشە بنەرەتییەكە.

✗ ھىما لە $f(x)$ تاقى بكەرەو.

وشەنامە

كوردى	ئینگلىزى	ھىما / نموونە
لېژى	slope	m
داتاشراوى يەكەم	first derivative	$f'(x)$
بەھای شلۆق	critical value	$x = 3$
خالى شلۆق	critical point	$(3, -1)$
پوو لە زيادبوون	increasing	$f'(x) > 0$
پوو لە كەمبوون	decreasing	$f'(x) < 0$
ماوھى كراوھ	open interval	$]a, b[$

پوختەى بەشەكە لەسەر يەك لاپەرە

۱ داتاشراوە وەرەگرە: $f(x) \rightarrow f'(x)$

۲ يەكسانی بکە بە سفر: $f'(x) = 0 \leftarrow$ بەهای شلۆق

۳ خشتە دروست بکە: هێلێ ژمارەکان بە بەها شلۆقەکان دابەش بکە

۴ هێما تاقى بکەرەو: لە هەر ماوەیەک ژمارەیک لە f' دابنێ

۵ y بدۆزەرەو: x لە f دابنێو تا خالەکە تەواو بێت

$$f'(x) < 0$$

دادهبەزێت

$$f'(x) = 0$$

خالی شلۆق

$$f'(x) > 0$$

بەرز دەبێتەو