

|      |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歷史沿革 | 秦漢 | 溫病一詞即首見於《內經》 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●《素問·六元正紀大論篇》中有『民乃厲，溫病乃作』、『其病溫厲大行，遠近咸若』</li> <li>●《素問·生氣通天論篇》中有『冬傷於寒，春必病溫』之論述→<sup>*</sup>後世伏邪(伏氣)溫病學說的由來。</li> <li>●《素問·熱論篇》記載：『凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑。』</li> <li>●《素問·熱論篇》中指出了熱病愈後如飲食不當可導致邪熱復起的『遺證』，並說『<u><sup>*</sup>病熱少愈，食肉則復。</u>』</li> <li>●《素問·刺法論篇》提出了預防疫病的關鍵在於『正氣存內』和『避其毒氣』，並立有<u>小金丹</u>方以預防疫病的發生</li> <li>●《難經》根據《素問·熱論篇》：『今夫熱病者，皆傷寒之類。』的精神，把一切外感熱病總稱為傷寒，於《五十八難》中認為『傷寒有五：有中風、有傷寒、有濕溫、有熱病、有溫病，其所苦各不同。』</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 漢唐 |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●張仲景在所編著的《傷寒雜病論》中，對於溫病溫熱的特點已有了比較明確的描述： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.『太陽病，發熱而渴，不惡寒者，為溫病。』</li> <li>2.『太陽中熱者，喝是也。汗出惡寒，身熱而渴，白虎加人參湯主之。』</li> </ol> </li> <li>●孫思邈的《備急千金要方》列有治溫病方十首 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.萎蕤湯由後世溫病學家加減化裁，作為滋陰解表劑用以治療陰虛外感表證</li> <li>2.太乙流金散(雄黃、雌黃、礬石、鬼箭羽、羚羊角)燒煙薰之辟溫氣以預防溫病</li> <li>3.《千金翼方》中收錄的紫雪成為後世治療溫病高熱、神昏的『三寶』之一</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 宋元 | 為溫病自成體系奠定了基礎 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●宋·朱肱在《傷寒類證活人書》中提出，運用《傷寒雜病論》麻黃湯、桂枝湯等辛溫發表方劑治療外感熱病不能一成不變，必須<u>因時、因地、因人而異</u>。</li> <li>●金·劉河間，在熱性病依據《素問·熱論篇》所論，提出『六經傳受自淺至深，皆是熱證，非有陰寒之病』的觀點，認為<sup>*</sup>火熱貫於外感熱病的始終 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.為治療熱病開創了<sup>*</sup>清熱解毒先河</li> <li>2.後世推劉河間為<sup>*</sup>溫病學說的創始人，而有「傷寒宗仲景，熱病崇河間」之說</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 明清 | 溫病學獨立體系的形成   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●明·汪石山，在發病學上提出<sup>*</sup>新感溫病之說。他將溫病分為伏邪和新感，突破了伏寒化溫理論的侷限</li> <li>●明·吳又可編著《溫疫論》是中國醫學史上的<sup>*</sup>第一部溫病學專著，它標誌著溫病學獨立體系的形成。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.溫疫病因：<sup>*</sup>非風、非寒、非暑、非濕，乃天地間別有一種異氣—『<u>癘氣</u>』所感。</li> <li>2.溫疫病機：<sup>*</sup>邪從口鼻而入，始客於膜原，邪潰則有九種傳變，大凡不出表裡之間，出表為順，內陷為逆。</li> <li>3.溫疫治療：<sup>*</sup>以祛邪為第一要義 <ul style="list-style-type: none"> <li>■<sup>*</sup>創疏利透達之法，使膜原邪氣鬆動，精氣潛入，鼓邪外出，一戰而解，</li> <li>■或使膜原疫邪傳入胃腑，用承氣湯攻下通邪而癒。</li> </ul> </li> <li>4.溫疫流行：溫疫具強烈的傳染性，眾人觸及之即病。流行程度，有『盛行』、『衰少』、『不行』等區別。</li> </ol> </li> <li>●清·葉天士：《外感溫熱論》、《臨證指南醫案》、《三時伏氣外感篇》 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.<sup>*</sup>創立了溫病衛氣營血辨證論治的理論</li> </ol> </li> </ul> |

|        |    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    |                                            | 2.發展和豐富溫病學診斷方法<br>3.制定了溫病各階段的治療大法<br>●清·薛生白著《濕熱病篇》<br>●清·王孟英編著的《溫熱經緯》一書<br>1.以《內經》、《傷寒雜病論》、《金匱要略》中有關熱病的論述為經，<br>2.以葉天士、陳平伯、余師愚等諸家溫病條文為緯<br>●楊栗山《傷寒溫疫條辨》、陳平伯《外感溫病篇》<br>●余師愚《疫疹一得》、柳寶詒《溫熱逢源》<br>●雷少逸《時病論》、俞根初《通俗傷寒論》<br>●戴天章《廣溫熱論》 |
| 概<br>說 | 概念 | ●溫病是由溫邪引起的，以發熱為主症，具熱象偏重、易化燥傷陰等特點的一類急性外感熱病。 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 特點 | *傳染性                                       | ●吳又可《溫疫論》把通過空氣感染的稱天受，通過直接接觸感染的稱傳染                                                                                                                                                                                                |
| 概<br>說 | 特點 | *流行性                                       | ●古代稱流行性為『天行』或『時行』<br>●宋·龐安常《傷寒總病論》：『天行之病，大則流毒天下，次則一方，次則一鄉，次則偏著一家。』                                                                                                                                                               |
|        |    | 季節性                                        | ●溫病在特定季節氣候條件下發生及流行，稱為季節性，大多數溫病具有這一特性，因此又稱溫病為四時溫病                                                                                                                                                                                 |
|        |    | 地域性                                        | ●巢元方在《諸病源候論》中提出了瘴氣多發生於『嶺南』（兩廣、雲南、貴州一帶）。<br>●葉天士在《溫熱論》中說：『吾吳濕邪害人最廣』                                                                                                                                                               |
|        | 命名 | 發病季節                                       | ●春溫、冬溫                                                                                                                                                                                                                           |
|        |    | 四時主氣                                       | ●風溫、濕溫、暑溫                                                                                                                                                                                                                        |
|        |    | 季節+主氣                                      | ●秋燥                                                                                                                                                                                                                              |
|        |    | 臨床症候                                       | ●大頭瘟、爛喉痧                                                                                                                                                                                                                         |
|        |    | 流行情況                                       | ●溫疫、天行、時行                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 分類 | 病證性質                                       | ●溫熱類：風溫、春溫、暑溫、秋燥、大頭瘟、爛喉痧、疫疹、瘧疾→起病較急，熱象顯著，傳變較快，病程較短—清熱救陰<br>●*濕熱類：濕溫、暑濕、伏暑、霍亂→起病較緩，病程較長、纏綿難癒—以化濕清熱，宣暢氣機，護陽保津                                                                                                                      |
|        |    | 發病時間                                       | ●新感溫病：風溫、秋燥、冬溫、大頭瘟、爛喉痧→初起以表熱證為主，無明顯的裏熱證候—解表祛邪<br>●*伏邪溫病：春溫、伏暑→初起以裏熱證為主                                                                                                                                                           |
|        |    | *溫疫                                        | ●一般把不傳染或傳染性小，呈散在發生的稱為溫病。把*傳染性強而引起大流行的稱為溫疫。                                                                                                                                                                                       |
|        |    | *溫毒                                        | ●溫毒實際屬於溫病的範疇，是溫病中具有*局部紅腫熱痛，甚則潰爛等特殊腫毒症狀的一類疾病。                                                                                                                                                                                     |
|        | 病  | 四時                                         | *風熱                                                                                                                                                                                                                              |
|        |    |                                            | ①先犯上焦肺衛 ②易傷脾胃之陰 ③熱變迅速                                                                                                                                                                                                            |

|    |        |           |                                                                               |                                             |
|----|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 因  | 溫病     | * 暑熱      | ①初起徑犯陽明氣分 ②易損傷津氣 ③易兼挾濕邪                                                       |                                             |
|    |        | * 濕熱      | ①易犯中焦脾胃 ②起病較緩，病勢纏綿，傳變較慢 ③易遏傷陽氣，阻滯氣機                                           |                                             |
|    |        | * 燥熱      | ①初起先犯肺衛 ②易致津液乾燥                                                               |                                             |
| 辨證 | 衛氣營血辨證 | 總綱        | 葉天士在《溫熱論》中提出：『大凡看法，衛之後方言氣，營之後方言血。在衛，汗之可也。到氣，才可清氣。入營，猶可透熱轉氣。入血，就恐耗血動血，直須涼血散血。』 |                                             |
|    |        | 衛         | 溫邪襲表，肺衛失宣                                                                     | 發熱微惡風寒，口微渴，咳嗽，脈浮數，苔薄白，舌邊尖紅                  |
|    |        | 氣         | 肺熱壅遏，氣機鬱閉                                                                     | 身熱喘咳，苔黃，口渴                                  |
|    |        |           | 胸膈熱鬱，氣失宣暢                                                                     | 身熱，苔薄黃，心煩懊憹不安                               |
|    |        |           | 胃熱亢盛，正邪劇爭                                                                     | 壯熱口渴，汗出氣粗，小溲黃赤，苔黃燥，脈洪大                      |
|    |        |           | 腸道熱結，腑氣不通                                                                     | 潮熱便秘或稀水旁流，腹滿硬痛，苔黃厚乾燥，脈沉實                    |
|    |        |           | 膽火犯胃，痰濕鬱阻                                                                     | 寒熱如瘧，熱多寒少，口苦脅痛，脘痞惡心，苔黃微膩，脈弦數                |
|    |        |           | 脾濕不化，濕邪蘊熱                                                                     | 身熱不揚，脘痞泛惡，身重肢倦，苔膩，脈濡                        |
|    |        | 營         | 熱灼營陰，心神被擾                                                                     | * 舌質紅絳，煩擾不寐，身熱夜甚，口不甚渴，斑疹隱隱，時有譫語(* 神志改變)，脈細數 |
|    |        | 血         | * 熱盛逼血，心神擾亂                                                                   | 舌色深絳，吐血衄血或溲血便血，斑疹透露，躁擾不安，甚或昏狂               |
|    | 三焦辨證   | 上焦        | * 手太陰肺                                                                        | 溫熱病的初期階段                                    |
|    |        | 中焦        | * 足陽明胃                                                                        | 溫熱病的極期階段                                    |
|    |        | 下焦        | * 足厥陰肝，足少陰腎                                                                   | 溫熱病的末期階段                                    |
| 診斷 | 舌苔     | 總論        | * 舌苔由胃氣蒸發而成                                                                   |                                             |
|    |        | 薄白苔       | 病在衛分                                                                          |                                             |
| 診斷 | 舌苔     | 厚白苔       | 濕阻氣分                                                                          |                                             |
|    |        | 白苔厚而乾燥    | 氣分濕邪未化而胃津已傷，氣不化液→甘淡滲濕                                                         |                                             |
|    |        | 砂苔(水晶苔)   | 白苔乾硬如砂皮：熱邪化燥入胃迅速，未及轉黃而津液被灼→從速攻下                                               |                                             |
|    |        | 白霉苔       | 滿舌生白衣，其苔如霉，或生白點如細碎飯粒，甚至瀰漫到滿舌及唇顎等處：胃氣因敗→急宜甘淡養胃                                 |                                             |
|    |        | 黃苔        | 主熱邪在裏，候氣分之邪                                                                   |                                             |
|    |        | 黃白相兼      | 氣分鬱熱，雖有裏結之勢，但表邪尚未盡透，或者是濕遏熱伏的現象→治以辛涼開泄，宣透氣分為宜                                  |                                             |
|    |        | 灰苔        | 係裏實熱證的反映，多見於黃苔轉黑的過程中→以苦寒攻下或甘寒救液                                               |                                             |
|    |        | 黑苔焦燥起刺    | 質地乾澀蒼老：熱毒熾盛，陰液耗損→急下存陰，甘寒大劑清熱                                                  |                                             |
|    |        | 黑苔燥甚焦枯    | 溫病後期，為熱邪深入下焦，腎陰耗竭→急須重用壯水鹹寒之劑，急救真陰                                             |                                             |
|    |        | 黑苔滑潤，舌質不紅 | ● 陽虛寒盛-----王孟英說：『凡虛寒證雖見黑苔，其舌必潤而不紫赤，識此最為秘訣。』                                   |                                             |

|      |    |           |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鑑別診斷 | 舌質 | 舌絳無苔，中心乾燥 | 血熱津傷→清營救液，兩顧其急                                                                                                                                                                                                        |
|      |    | 焦紫起刺，狀如楊梅 | ①血分熱毒極盛，為熱盛動血或動風癰厥之先兆 ②爛喉痧(猩紅熱)→若外證有大便秘結，用藥攻下之中，必加清熱解毒。                                                                                                                                                               |
|      |    | 紫晦而乾，色如豬肝 | 肝腎陰竭的危候，多屬難治                                                                                                                                                                                                          |
|      |    | 藍舌        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●瘟疫和濕溫證熱邪不透</li> <li>●婦人懷孕而見藍舌，必定胎死腹中</li> <li>●癲癇病患者，或素有胃病者</li> </ul>                                                                                                        |
|      | 舌體 | 舌體強硬      | 多由中樞神經病變所致                                                                                                                                                                                                            |
|      |    | 舌卷+囊縮     | 病入厥陰，危險徵象                                                                                                                                                                                                             |
|      | 驗齒 | 門齒        | 齒為腎之餘，齦為胃之絡→熱邪不燥胃津，必耗腎液                                                                                                                                                                                               |
|      | 切脈 | 弦細朮遲      | 暑傷氣分                                                                                                                                                                                                                  |
|      |    | 弦而數       | 熱鬱少陽，膽火熾盛                                                                                                                                                                                                             |
|      |    | 沈實有力      | ①陽明腑實 ②下焦蓄血                                                                                                                                                                                                           |
|      |    | 沈細而澀      | 熱灼真陰                                                                                                                                                                                                                  |
| 鑑別診斷 | 發熱 | 發熱惡寒      | 溫病初起邪在衛表                                                                                                                                                                                                              |
|      |    | 寒熱往來      | 熱鬱少陽                                                                                                                                                                                                                  |
|      |    | 但熱不寒      | 熱邪入裏                                                                                                                                                                                                                  |
|      |    | 夜熱早涼      | 餘邪留伏陰分                                                                                                                                                                                                                |
|      |    | 低熱        | 溫病後期持續低熱，身熱面赤，手足心熱尤甚的：肝腎陰虛，虛多邪少之候                                                                                                                                                                                     |
|      | 出汗 | 戰汗        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●病人突然全身戰慄，繼之全身出汗，多見於熱邪逗留氣分階段。為正氣積聚力量，抗邪外出的佳象。</li> <li>1.故戰汗之後，大多邪隨汗出，熱退身涼，脈象平和而病漸向愈。</li> <li>2.但也有少數戰慄而不能汗出，或戰汗之後發熱不退，煩躁不安，脈疾不平，乃正氣虛憊，不能鼓邪外出而熱復內陷的危重徵象，病情嚴重，須防變化。</li> </ul> |
|      | 斑疹 | 斑         | 點大成片，視之斑斑如錦紋，一般不高出皮膚，撫之不礙手→熱鬱陽明，內迫營血，外溢肌膚                                                                                                                                                                             |
|      |    | 疹         | 雲頭隱隱或呈碎粒，形如粟米，一般高出於皮膚，撫之礙手→肺熱鬱閉，波及營分，外竄血絡                                                                                                                                                                             |
|      |    | 斑疹外透      | 標誌著內伏之邪有外透之機，但宜見而不可多見。                                                                                                                                                                                                |
|      |    | 型態        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●余師愚所說：『斑疹一見，苟能細心審量，神明於鬆浮、緊束之間，決生死於臨證之傾。』</li> <li>1.鬆浮朗潤，如洒皮面者：邪淺病輕，預後良好→順證</li> <li>2.緊束有根，如履透針者：熱毒深重，預後嚴重→逆證</li> </ul>                                                     |
| 鑑    | 白  | 病因病機      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●多見於濕熱性質的溫病，如濕溫、暑溫夾濕、伏暑等。</li> <li>●其形成主要由於濕熱之邪留戀氣分，淹滯不解，鬱蒸肌膚，蘊釀而成</li> </ul>                                                                                                  |

|             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 別<br>診<br>斷 |          | 症狀   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 白 是一種細小的表面隆起的白色丘疹。內含漿液，形如水泡，呈水晶色而瑩亮。其分布多見於頸項及胸腹部，四肢很少見到，頭面部則不會出現。</li> <li>● 濕熱之邪，性質黏滯，非一次所能透盡，故白 亦不止一次地分批發出，往往患者發熱起伏一次，出一次汗，即發出一批白。</li> </ul>                                                                                                                |
|             | 瘰癧       | 虛風內動 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 由陰虛而導致： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 多因熱邪逗留日久，陰津血液慢性耗傷，筋脈失於濡養，而呈現動風之象，故稱虛風內動。</li> <li>2. 大凡虛風內動多發生在溫病的後期階段。</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                               |
| 治<br>法      | 清氣       | 輕清宣氣 | 邪熱初傳氣分，氣機不暢而裏熱不甚：身熱微渴，心中懊憹不舒，苔薄黃→梔子豉湯                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 化濕       | 芳香化濁 | 濕溫初起，濕邪偏重：身熱不揚，頭脹如裹，脘痞腹脹，口渴不欲飲，嘔惡，便溏，溲短，苔膩，脈緩→藿朴夏苓湯                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |          | 辛開苦降 | 濕溫病濕漸化熱，鬱遏於裏：發熱，脘痞泛惡，口渴不欲多飲，小便黃赤，苔黃滑膩→王氏連朴飲                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 攻下       | 苦寒攻下 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 溫病中運用較多，奏效迅速的一個治療方法</li> <li>● 柳寶詒：『胃屬五臟六腑之海，位居中土，最善容納，邪熱入胃，則不復他傳，故溫熱病熱結胃腑，得攻下而解者，十居六七。』</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|             | 涼血       | 涼血散血 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 血熱熾盛，每易兼見邪閉心包及肝風內動，故涼血法每多配合開竅、熄風等法使用。使用涼血法必須注意的是： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 涼血法治療目的著重『涼血散血』，所以涼血中合以活血散血之劑，臨床應用必須和清營法有所區分→犀角地黃湯</li> <li>2. 溫病熱毒充斥氣血、三焦，其證多來勢凶猛，證情險惡，病機上已無復衛氣營血可分，故治療非一般氣營兩清方法所能勝任，而須即時採取大劑複方，大清氣血→清瘟敗毒散</li> </ol> </li> </ul> |
|             | 兼證<br>治法 | 痰濕內阻 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 其證多見胸脘痞悶、噁心嘔吐、渴喜熱飲、苔黏滑等。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 王孟英：『凡視溫證，必察胸脘，如拒按者...必挾痰濕。』</li> <li>2. 葉天士：『舌絳望之若乾，手捫之原有津液，此津虧濕熱熏蒸，將成痰濁蒙閉心包也。』</li> </ol> </li> </ul>                                                                                     |
|             | 瘥後       | 補益氣血 | 溫病瘥後，邪熱雖除而氣血虧損，證見面色少華，氣弱倦怠，聲顫乏力，語不接續，舌質淡紅，脈虛無力等，治須補益氣血→集靈膏                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 調理       | 芳香醒胃 | 濕熱證瘥後，餘邪未淨，胃氣失健，證見胸悶不暢，知饑不食，脈緩等，治宜芳香醒胃，清滌餘邪→薛氏五葉蘆根湯                                                                                                                                                                                                                                                     |



## ● 第一章 風溫

|      |                                                                                                   |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 提綱   | ● 風溫是感受風熱病邪所引起以肺經為主的急性外感熱病。本病一年四季均可發生，但多見於春冬兩季(其發於冬季的又稱冬溫)                                        |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | ● 初起肺衛表熱(發熱、微惡風寒、咳嗽、口微渴、苔薄白、脈浮數)→中期邪熱壅肺等氣分證候→後期肺胃陰傷。                                              |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | ● 肺衛之邪不解，則其發展趨向大致有兩種情況：                                                                           |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | 1. 順傳於胃：陽明邪熱熾盛                                                                                    |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
| 邪在衛分 | 2. 逆傳心包：溫邪上受，首先犯肺，逆傳心包                                                                            |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | ● 文獻：                                                                                             |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | 1. 清・陳平伯《外感溫病篇》：                                                                                  |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | ■ 風溫為病，春月與冬季居多，或惡風，或不惡風，必身熱、咳嗽、煩渴，此風溫證之提綱也。                                                       |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
| 邪在氣分 | ■ 風邪屬陽，陽邪從陽，必傷衛氣。人身之中，肺主衛，又胃為衛之本，足以風溫外搏，肺胃內應，風溫內襲，肺胃受病。其溫邪之內外有異形，而肺胃之專司無二致，故惡風為或有之症，而熱渴、咳嗽為必有之症也。 |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | 2. 清・吳坤安《傷寒指掌》：風溫吸入，先傷太陰肺分，右寸脈獨大，肺氣不舒，身痛胸悶，頭脹咳嗽，發熱口渴，或發痧疹，主治在太陰氣分。                                |                                                  |                                                    |          |                                  |                                  |                                            |
|      | 風邪襲肺                                                                                              | 但 * 咳，身不甚熱，口微渴等。                                 | 邪在肌表                                               | 桑菊飲      | 桑菊飲中桔梗翹，杏仁甘草薄荷擦，蘆根為飲輕清劑，風溫咳嗽服之消。 | ● * 辛涼輕劑→肺衛                      |                                            |
|      | 風溫客表                                                                                              | 發熱，微惡風寒，無汗或少汗，頭痛，咳嗽，口微渴，苔薄白，舌邊尖紅，脈浮數。            | * 治以辛散                                             | 銀翹散      | 銀翹散理上焦病，竹葉荊茅鼓薄荷，甘桔蘆根煎湯下，清宣風熱煮無過。 | ● * 辛涼平劑→表衛                      |                                            |
| 邪在氣分 | 熱鬱胸膈                                                                                              | 身熱，心煩懊憹，坐臥不安，舌苔微黃。                               | 清宣透熱達邪外出                                           | 梔子豉湯     | 梔子、淡豆豉                           |                                  |                                            |
|      | 邪熱壅肺                                                                                              | * 身熱、汗出，煩渴，咳嗽，咯痰不爽，舌紅苔黃，脈滑數。                     | 宣肺透熱                                               | 麻杏石甘湯    | 麻黃、杏仁、炙草、生石膏                     | ● 重在宣肺透熱而非解表                     |                                            |
|      | 痰熱阻肺<br>腑有熱結                                                                                      | * 潮熱便秘，痰涎湧盛，喘促不寧，苔黃膩或黃滑，脈右寸實大。                   | 宣肺化痰泄熱攻下                                           | * 宣白承氣湯  | 宣白承氣大黃配，石膏杏仁栝蒌皮。<br>(白虎湯+承氣湯)    | ● 麻杏石甘湯→重在宣肺達邪<br>● 宣白承氣湯→重在滌除痰熱 |                                            |
|      | 痰熱結胸                                                                                              | 身熱面赤，渴欲涼飲，飲不解渴，得水則嘔，胸脘痞滿，按之疼痛。便秘，苔黃滑，脈洪滑。        | 清熱化痰開結                                             | 小陷胸加枳實湯  | 半夏、黃連、栝蒌實、枳實                     | ● 痰熱阻肺→喘咳痰嗽<br>● 痰熱結胸→胸脘滿痛       |                                            |
|      | 熱阻胸膈<br>微兼腑實                                                                                      | 身熱不已，煩躁不安，胸膈灼熱如焚，唇焦咽燥，口渴，便秘，舌心乾四邊色紅，苔或黃或白，脈浮滑而數。 | 清上泄下                                               | 涼膈散      | 涼膈硝黃甘草翹，梔子黃芩薄荷饒，竹葉蜜煎療膈上，臟腑積熱服之消。 | ● 運用標準在胸膈之熱而不在大便之秘               |                                            |
|      | 邪入                                                                                                | 無形熱盛<br>(陽明經證)                                   | * 壯熱面赤，惡熱、心煩、大汗出，苔黃而燥，渴喜涼飲，脈形洪大，按之愈盛。(脈洪而芤→白虎加人參湯) | 大清陽明氣分之熱 | 白虎湯                              | 石膏、知母、生甘草、粳米<br>(* 清瀉陽明裏熱主方)     | * 白虎四禁：<br>● 仲景：其表不解者<br>● 吳塘：脈浮細、脈沉、不渴、無汗 |

|      |      |                |                                                                               |                  |                          |                                  |                                                                                                                            |
|------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 陽明   | 有形熱結<br>(陽明腑證) | 日晡潮熱，濇濇汗出，時有譫語，大便秘結，或 <u>純利惡臭稀水(熱結旁流)</u> ，肛門灼熱，腹部脹滿硬痛或拒按，苔老黃而燥，甚則灰黑而燥裂，脈沉有力。 | 緩下熱結             | 調胃承氣湯                    | 炙甘草、芒硝、大黃                        |                                                                                                                            |
|      |      | 肺熱移腸           | 身熱，咳嗽，口渴，下利色黃熱臭，肛門灼熱，腹不硬痛，苔黃，脈數。                                              | 苦寒清熱止利           | 葛根黃芩黃連湯                  | 葛根、炙甘草、黃芩、黃連                     | ● 病變重心在大腸                                                                                                                  |
|      |      | 胃熱陰傷           | 身熱自汗，面赤、神迷，身重難以轉側，多睡眠，鼻鼾，語言難出，苔黃而燥，脈數。                                        | 泄熱救津             | 竹葉石膏湯                    | 麥半參草米+竹葉、石膏                      |                                                                                                                            |
| 邪在營分 | 熱入營分 | 熱燦營陰           | 身熱夜甚，心煩躁擾，甚或時有譫語，* 斑疹隱隱(cf>血分：斑疹透露)，口反不甚渴，舌質紅絳無苔，脈細數。                         | 清營泄熱透熱轉氣         | * 清營湯                    | 清營湯是溫病方，熱入心營犀地良，銀翹連竹玄丹麥，清營瀉熱效力強。 | ● Cf>陽明腑實熱盛神昏的譫語：腹硬痛、便秘、舌上苔垢                                                                                               |
|      |      | 肺熱發疹           | 身熱，咳嗽，胸悶，外發紅疹。                                                                | 宣肺泄熱涼營透疹         | 銀翹散 - 荊芥、豆豉+生地、丹皮、大青葉、玄參 |                                  | ● * 斑→陽明(胃)熱毒<br>● * 疹→太陰(肺)風熱                                                                                             |
| 邪在營分 | 熱入心包 | 熱陷心包           | 身灼熱，肢厥，神昏譫語，或昏愢不語，舌蹇，舌色鮮絳，脈細數。                                                | 清心開竅             | 清宮湯(送服)                  | 清宮湯用四種心，熱陷心包作神昏，連翹蓮子竹葉麥，犀角磨汁黑元參。 | ● Cf>熱入營分：* 無舌蹇肢厥、譫語不甚<br>● 三寶相同藥：犀角、麝香、朱砂(金箔)<br>● * 安宮牛黃丸→清心豁痰<br>● * 至寶丹→開竅醒神<br>● * 紫雪丹→止癇熄風<br>● * 清宮湯→清熱育陰，但無豁痰開竅之效。 |
|      |      |                |                                                                               |                  | * 安宮牛黃丸                  | 安宮牛黃用朱犀，山梔芩連熱盛宜，雄珠腦麝鬱金箔，竅閉神昏莫失機。 |                                                                                                                            |
|      |      |                |                                                                               |                  | * 紫雪丹                    | 紫雪犀羚砂朴硝，硝磁寒水滑石膏，丁沉香麝升玄草，更用赤金法亦超。 |                                                                                                                            |
| 邪在營分 | 熱入心包 |                |                                                                               |                  | * 至寶丹                    | 至寶朱砂麝息香，雄黃犀角與牛黃，金銀二箔兼龍腦，琥珀還加玳瑁良。 | ● Cf>陽明腑實：不致舌蹇而語言不利，神昏程度亦較輕                                                                                                |
|      |      | 熱入心包+陽明腑實      | 身熱，神昏，舌蹇，肢厥，便秘，腹部按之硬痛，舌絳，苔黃燥，脈數沉實。                                            | 清心開竅攻下腑實         | 牛黃承氣湯                    | 安宮牛黃丸一九+生大黃末三錢                   |                                                                                                                            |
|      |      |                |                                                                               |                  |                          |                                  |                                                                                                                            |
| 邪在血分 | 熱盛動風 | 肝經熱盛動風         | 身熱壯盛，頭暈脹痛，手足躁擾，甚則癱瘓，狂亂瘈瘲，舌紅苔燥無津，脈象弦數。                                         | 涼肝熄風             | 羚角鉤藤湯                    | 羚羊鉤藤菊花桑，芍甘貝茹茯地黃，抽搐不止因濕熱，涼肝息風是妙方。 |                                                                                                                            |
|      |      | 陽明熱盛引動肝風       | 壯熱如焚，口渴欲引涼飲，手足癱瘓，甚至角弓反張，苔黃而燥。                                                 | 清泄胃熱涼肝熄風攻下腑實涼肝熄風 | 白虎湯+羚羊、鉤藤<br>調胃承氣湯+羚羊、鉤藤 |                                  | ● 以或清或下為主<br>● 佐以涼肝熄風之法                                                                                                    |
|      |      | 心營熱盛引動肝風       | 灼熱肢厥，神識昏迷，手足癱瘓，舌質紅絳。                                                          | 清心開竅<br>涼肝熄風     | 清宮湯+羚羊、鉤藤、丹皮<br>紫雪丹      |                                  | ● * 陽明熱盛動風：苔必黃而燥，或焦黃焦黑，口渴欲涼飲。<br>● * 心營熱盛動風：必有神昏、肢厥，舌質絳而無苔。                                                                |

|                  |              |                                                                         |                       |         |                                  |                                                         |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 熱<br>燥<br>真<br>陰 | 陽亢陰虛         | 心中煩不得臥，身熱，苔黃，舌紅，脈細數等。                                                   | 清熱育陰                  | 黃連阿膠湯   | 《傷寒論》黃連阿膠湯—炙甘草                   | ● 病變重心在少陰心腎                                             |
|                  | 肝腎陰傷         | * 真陰欲竭(下焦真陰欲竭，邪少虛多)：身熱面赤，手足心熱 > 手足背，口乾，舌燥，或神倦，耳聾，脈象虛大等。                 | 滋陰養液                  | * 加減復脈湯 | 炙草、生地、阿膠、麥冬、麻仁、芍藥                | ● 少陽證耳聾：多有脹悶感<br>● 真陰欲竭耳聾：無脹悶感                          |
|                  |              |                                                                         | 滋陰鎮攝                  | * 救逆湯   | 加減復脈湯—麻仁+生龍骨、生牡蠣                 | ● 誤汗，陰虧心氣損傷。                                            |
|                  |              |                                                                         | 滋陰固攝                  | * 一甲復脈湯 | 加減復脈湯—麻仁+生牡蠣                     | ● 誤下，陰虧大便微溏。                                            |
|                  |              | 虛風內動：手足蠕動，甚或瘈瘲，心中憺憺大動，神倦脈虛，舌絳苔少，甚或時時欲脫等。                                | 滋陰潛陽                  | * 二甲復脈湯 | 加減復脈湯+生牡蠣、生鱉甲                    | ● 僅見手足蠕動，尚未至瘈瘲                                          |
|                  |              |                                                                         | 滋陰潛鎮                  | * 三甲復脈湯 | 二甲復脈湯+生龜板                        | ● 兼心中憺憺而動，脈象細促                                          |
|                  |              | * 痰熱內閉心包，陽氣暴然外脫：身熱(邪熱閉於內)，神志昏愢不語，倦臥，或兼汗多氣短、脈細無力，或兼面色蒼白、汗出淋漓、四肢厥冷、脈微細欲絕。 | 滋陰固脫                  | * 大定風珠  | 三甲復脈湯+五味子、雞子黃                    | ● 已見瘈瘲、神倦、脈虛、舌絳少苔、時時欲脫                                  |
|                  |              |                                                                         | 潛陽熄風                  |         |                                  |                                                         |
| 後<br>期<br>證<br>治 | 內閉外脫         | 清心開竅固脫救逆                                                                | 安宮牛黃丸、紫雪丹、至寶丹+生脈散、參附湯 |         |                                  | ● 本證以身熱、神昏、大汗、肢厥、脈微為辨證要點                                |
|                  | 邪留陰分         | 夜熱早涼，熱退無汗，能食形瘦等。                                                        | 滋陰透邪                  | 青蒿鱉甲湯   | 青蒿鱉甲地知丹，陰虛伏熱此為先，夜熱早涼身無汗，滋陰透熱病可痊。 | 此方有先入後出之妙：<br>● 青蒿不能直入陰分，有鱉甲領之入也<br>● 鱉甲不能獨出陽分，有青蒿領之出也。 |
|                  | 餘熱未淨<br>肺胃陰傷 | 身熱不甚或不發熱，乾咳不已或痰少而黏，口舌乾燥而渴，舌紅少苔，脈細。                                      | 滋養肺胃<br>滌淨餘熱          | 沙參麥冬湯   | 麥玉沙桑甘豆花<br>桑—桑葉 豆—白扁豆            |                                                         |



## ● 第二章 春溫

提綱

● 春溫是由溫熱病邪內伏而發(《素問·金匱真言論》：藏於精者，春不病溫)，起病即見裡熱症候為特徵的急性熱病。初起多以發熱、心煩、口渴、舌紅苔黃等裡熱症候為主要表現，重者可以出現神昏痙厥等症。

1. 伏邪自發：初起即呈裡熱熾盛→《傷寒指掌》：伏氣春溫，初起但熱不寒而口渴，此自內而發出於外也。

2. 新感引發：兼有惡寒、頭痛等衛表證→《傷寒指掌》：感而即發之春溫，初起微寒，後則但熱不寒，此由肺衛而受也。

● 病機演變：正虛程度不同

1. 初起發於氣分者：邪熱雖盛，但正氣抗邪之力尚強，病情較發於營分者為輕。

2. 初起發於營分者，病情較邪發氣分者為重，若經治療其病可轉出氣分。若邪勢發展則可深入血分，致有動風、動血、閉竅之變，甚則導致內閉外脫，後期則有肝腎陰傷之象。

● 春溫應當與風溫、暑溫等病作鑒別：

|    |    |                        |
|----|----|------------------------|
| 春溫 | 伏邪 | 初起以 <u>裡熱傷陰證</u> 為主    |
| 風溫 | 新感 | 初起以 <u>邪在肺衛之表熱證</u> 為主 |

  

|    |              |                             |
|----|--------------|-----------------------------|
| 春溫 | 夏至之 <u>前</u> | 初起多表現為 <u>熱毒化火盛于氣分或營分之證</u> |
| 暑溫 | 夏至之 <u>後</u> | 初起多見 <u>陽明裡熱熾盛證</u>         |

邪在氣分

\*熱在少陽膽經

發熱不惡寒，口渴而渴，心煩，小溲短赤，舌紅苔黃，脈弦數等。

苦寒直清裏熱

\*黃芩湯

黃芩、芍藥、甘草、大棗

● \*熱在陽明胃經：表裏俱熱

● \*熱在少陽膽經：裏熱偏重

表裏兩解

蔥豉桔梗湯 + 黃芩

蔥豉桔梗薄荷翹，山梔竹葉甘草調，熱邪束肺嗽咽痛，風溫初起此方療。

● 兼有惡寒、頭痛等表證

熱熾

熱熾津傷

壯熱、面赤、汗多、心煩、渴喜涼飲，舌質紅苔黃而燥，脈洪大或滑數。

清熱生津

白虎湯

石膏、知母、粳米、炙甘草

\*熱盛動風

高熱、煩渴、手足躁擾，甚則狂亂、神昏痙厥，或見頸項強直、角弓反張，舌紅苔黃、脈象弦數，或者舌紅絳、脈細弦數。

清熱涼血熄風

\*羚羊鉤藤湯

羚羊鉤藤菊花桑，芍甘貝茹茯地黃，抽搐不止因濕熱，涼肝息風是妙方。

\*熱結腸腑

身熱，腹滿便秘，口乾唇裂，舌苔焦燥，脈象沉細，或伴見口乾咽燥，倦怠少氣，撮空摸床，肢體震顫，目不了了，苔乾黃或焦黑，脈沉弱或沉細，或伴見小便涇滴不暢，溺時疼痛，尿色紅赤，時煩渴，舌紅脈數。

增液滋陰

\*增液承氣湯

增液湯 + 調胃承氣湯 - 甘草

● \*熱結液虧

攻補兼施

\*新加黃龍湯

新加黃龍兩參歸，增液調胃薑汁推。

● \*熱結氣液俱虧

通腑瀉熱

\*導赤承氣湯

導赤承氣用硝黃，生地連柏赤芍當。

● \*小腸熱盛

邪在營血

熱在營分

證候、病機與風溫證熱入營分相同

清營泄熱

清營湯

清營湯是溫病方，熱入心營犀地良，銀翹連竹玄丹麥，清營瀉熱效力強。

兼有表證→見發熱惡寒、頭痛、無汗或少汗、心煩、舌赤、咽喉乾燥等證

透表清營

銀翹散 + 生地、玄參、丹皮

● 熱在營分 + 外感

\*熱入血分  
(熱盛動血)

灼熱躁擾，甚或昏狂譫妄，斑疹紫黑或吐衄、便血，舌質深絳等。

\*涼血解毒

\*犀角地黃湯

犀角地黃芍藥丹，吐衄斑疹火邪干。

● \*入血就恐耗血動血→涼血散血

氣血(營)兩燔

壯熱口渴、煩躁不寧、苔黃舌絳，或肌膚發斑，甚或吐血、

氣血兩清

玉女煎 - 熟地、牛膝 + 細生地、玄參方

|      |      |                                                                           |              |                      |                                      |                                               |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |      | 衄血等。                                                                      |              | * 化斑湯                | 白虎湯+犀角、玄參                            | ● * 發斑                                        |
|      |      |                                                                           |              | 白虎湯+犀角地黃湯            |                                      | ● * 吐衄                                        |
| 邪在營血 | 熱與血結 | 少腹堅滿疼痛，小便自利，神志如狂或清或亂，脈沉實等。                                                | 清熱通下<br>活血逐瘀 | * 桃仁承氣湯<br>《溫病條辨》    | 溫病桃仁承氣湯，歸芍丹桃硝大黃，下焦蓄血急煎服，解除夜熱煩如狂。丹—丹皮 | ● 下焦蓄血                                        |
|      | 熱入心包 | * 伏熱內閉<br>身灼熱，神昏譫語，或昏憤不語，或痰壅氣粗，舌蹇肢厥，脈弦數或滑數。                               | * 清心開竅       | * 清宮湯送服安宮牛黃丸、紫雪丹、至寶丹 |                                      | ● * 伏邪發于營分，營分熱毒深陷，內閉心包所致。                     |
|      |      | * 內閉外脫<br>身熱驟降，神昏譫語或不語如屍厥，躁擾不安，氣短息促，手足厥冷，冷汗自出，大便閉，舌絳色暗，欲伸無力，苔乾燥起刺，脈細疾或沉弱。 | * 開閉固脫       | * 參附湯、生脈散送服安宮牛黃丸、至寶丹 |                                      | ● * 熱毒閉而正氣脫<br>1. 陽氣外越而脫→參附湯<br>2. 心之氣陰欲脫→生脈散 |
| 肝腎陰傷 |      | 春溫一證，裏熱偏重，津液尤易耗傷，所以病至後期，邪熱極易深入下焦，劫燬肝腎之陰，較之風溫證尤為多見。                        | 清熱育陰         | 黃連阿膠湯                | 黃連阿膠湯《傷寒論》—炙甘草                       | ● 熱灼真陰，陽亢陰虛                                   |
|      |      |                                                                           | 滋補真陰         | 阿膠雞子黃湯               | 阿膠雞子黃湯好，地芍鈎藤牡蛎草，石決茯神絡石藤，陰虛風動此方妙。     | ● 真陰欲竭                                        |
|      |      |                                                                           | 滋陰熄風         | 大定風珠                 | 大定風珠熄風方，麥味麻草芍地黃，阿膠雞子滋陰血，龜鯢牡蠣可潛陽。     | ● 陰虛動風                                        |

### ● 第三章 暑溫

●特點：

- 有嚴格的發病季節：先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑→六月下旬夏至到九月上旬處暑之間
- \* 有特定的臨床表現：初起即見高熱、煩渴、大汗、脈洪大的陽明氣分熱盛證候(①葉天士：夏暑發自陽明 ②無衛分過程)→中期氣傷津耗→末期邪陷心營而出現神昏、斑疹
- \* 有急速多變的傳變：病程中易於產生嚴重變化，較為多見的如傷津耗氣、閉竅昏厥、動風發痧等。

●暑溫病根據其臨床表現的不同，可分為以下三種類型：

- 暑溫**本病**：指發病初起以陽明氣分熱盛見症為主要表現，病程中易出現津氣耗傷、竅閉動風之變的病證。
- 暑溫**兼證**：指感受暑熱致病的同時兼感其他病邪。主要有兩類，即暑溫兼濕和暑邪夾濕兼寒。
- 暑溫**類證**：此類病證雖屬感受暑邪而發，但與暑溫病的典型表現和經過有所不同，故稱之為類證。
  - **昌暑**：夏月冒受暑熱或暑濕病毒，而以手太陰肺為病變重心→**暑咳**
  - **暑厥**：夏月猝中暑熱之邪，而致陡發神昏肢厥的病候，名為暑厥(若無肢厥，即名中暑)。
  - **暑風**：因猝中暑熱之邪而引動肝風的病候，名為暑風。吳鞠通說：「小兒暑溫，身熱，猝然痙厥，名曰**暑癇**。」
  - **暑瘵**：因感受暑熱而驟然吐血咳嗽，狀似瘵瘵的，名為暑瘵。
  - **暑穢**：因感受暑濕穢濁之氣，而致猝然悶亂煩躁的病證，名為暑穢。

●根據其臨床特點，它可能包括乙腦、流感及鉤端螺旋體病等急性傳染病。

●治則：暑溫證「發自陽明」，熱盛氣傷，古人認為治暑必補氣，不補氣不足以言治暑。

- \* 治暑大法：暑病首用辛涼，繼用甘寒，終用甘酸斂津，不必用下。(清·張鳳達《傷暑全書》)
- \* 暑溫挾濕：治暑之法，清心利小便最好。(明·王綸《明醫雜著》)→cf>暑為寒濕所遏，治宜辛溫以散外寒，合以化濕透熱。

|         |                                                  |                      |         |                                  |                                                           |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| * 暑入陽明胃 | 1 身熱熾盛，惡熱心煩，頭痛且暈，面赤氣粗，2 口渴燥渴飲，3 汗多，背微惡寒，4 脈洪大而芤。 | 清氣泄熱                 | 白虎湯     | 石膏、知母、粳米、炙甘草                     | ● 暑熱雖盛而津氣未傷                                               |
|         |                                                  | 益氣生津                 | 白虎加人參湯  | 石膏、知母、粳米、炙甘草、人參                  | ● 元氣+津液耗傷                                                 |
| 暑傷津氣    | 身熱息高，心煩溺黃，口渴自汗，肢倦神疲，脈虛無力。                        | 清熱滌暑<br>益氣生津         | 王氏清暑益氣湯 | 清暑益氣養氣陰，石斛麥冬西洋參，連草竹葉肥知母，荷梗瓜翠米要真。 | ● * 白虎加人參湯：清熱強→達表<br>● * 王氏清暑益氣湯：生津強→清裏                   |
| * 津氣欲脫  | 身熱已退，汗出不止，喘渴欲脫，脈散大。                              | 補斂津氣                 | 生脈散     | 人參、麥冬、五味子                        | ● 暑熱之邪雖已解除，但由於正氣損傷過甚，不能固攝於外，故身無熱象而汗出不止，脈形散大而無力。           |
| * 暑傷心腎  | 心熱煩躁，消渴不已，舌絳，苔黃燥。                                | 清心熱<br>滋腎液           | * 連梅湯   | 連梅湯用麥地膠，能治心熱渴不消。                 | ● 本方是由《傷寒論》黃連阿膠湯化裁而得                                      |
| 暑       | 暑入心營                                             | 脈虛舌赤，心煩口乾，夜寐不安，時有譫語。 | 清心涼營    | 清營湯                              | 清營湯是溫病方，熱入心營犀地良，銀翹連竹玄丹麥，清營瀉熱效力強。<br>● Cf>熱閉心包之神昏譫語：本證病情較輕 |

|     |          |                                                         |                |                                |                                              |                                                      |
|-----|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 入營血 |          |                                                         | 清心開竅           | 清營湯送服安宮牛黃丸                     |                                              | ● 營分熱盛，內閉心包→神昏譫語                                     |
|     | 暑入血分     | 灼熱煩躁，斑色紫黑，舌絳苔焦，甚則神昏妄笑。                                  | 涼血解毒<br>清心開竅   | 神犀丹 +<br>安宮牛黃丸                 | 神犀丹用犀元參，芩銀蒲地板藍根，翹歧金汁天花粉，紫草合治熱毒深。             | ● 本證較前證更深一層，所以病勢最為嚴重。                                |
|     | 暑濕困阻中焦   | 壯熱煩渴，汗多溺短，脘痞身重，脈洪大。                                     | 清陽明胃熱<br>化太陰脾濕 | 白虎加蒼朮湯                         | 石膏、知母、粳米、炙甘草、蒼朮                              | ● 陽明胃熱：壯熱煩渴，汗多溺短，脈洪大<br>● 太陰脾濕：脘痞身重                  |
|     | * 暑濕瀰漫三焦 | 身熱面赤耳聾，胸悶脘痞，下利稀水，小便短赤，咳痰帶血，不甚渴飲，舌紅赤，苔黃滑。                | 清宣暑溼           | * 三石湯                          | 三石湯用滑水膏，杏仁竹茹銀花招，再入金汁白通草，清宣濕暑漫三焦。             | ● * 上焦見證：胸悶耳聾<br>● * 中焦見證：口渴脘痞<br>● * 下焦見證：下利稀水、小溲短赤 |
|     | * 暑兼寒濕   | 頭痛身熱，惡寒無汗，身形拘急，脘悶心煩，舌苔薄膩。                               | 解表散寒<br>化濕滌暑   | * 新加香薷飲                        | 香薷飲—扁豆+扁豆花、銀花、連翹                             | ● 外寒與暑邪均等                                            |
|     |          | 凜凜惡寒，身熱煩躁而口渴便溏。                                         |                | 黃連香薷飲                          | 三物香薷豆朴先，若云熱盛用黃連。                             | ● 在裏之暑濕較甚                                            |
|     | * 冒暑     | 暑熱傷肺：身熱口渴，* 咳嗽無痰(暑咳)，胸悶脅痛，脈濡滑而數，兩寸有力，或頭暈，寒熱汗出，咳嗽，苔薄白微膩。 | 清熱宣肺           | 雷氏清宣金臟法                        | 清宣金臟清肺金，川貝牛蒡栝杏仁，桔梗兜鈴枇杷桑葉，咳嗽胸悶熱邪深。栝一栝蒺皮 枇一枇杷葉 | ● * 暑熱傷肺(初起無衛分見證) →苔不垢膩                              |
|     |          |                                                         | 清利暑濕           | 雷氏清涼滌暑法                        | 清涼滌暑扁通蒿，滑石甘芩瓜翠翹，暑瀉稠黏小便赤，渴煩面垢又高燒。通—通草         | ● * 暑濕遏於肺衛(初起有衛分見證) →苔微膩                             |
|     | 暑厥       | 暑熱閉塞清竅：猝然暈倒，昏不知人，身熱肢厥，氣粗如喘，不聲不語，牙關微緊或口開，脈洪大或滑數。         | 清心開竅           | 內：安宮牛黃丸，紫雪丹<br>外：針刺人中、十宣、曲澤、合谷 |                                              | ● 暑熱內閉之時切忌早用寒涼，以免暑邪愈遏愈深。反致不能外解                       |
|     | 暑風       | 暑熱亢盛，引動肝風：身熱，四肢抽搐，甚或角弓反張，牙關緊閉，神迷不清，脈形弦數。                | 清熱熄風           | 羚羊鉤藤湯<br>清營湯 + 羚羊角、鉤藤          |                                              |                                                      |
|     | 暑瘧       | 暑熱傷肺，灼傷血絡：驟然吐血、衄血，頭目不清，煩熱口渴，咳嗽氣喘，脈象浮取則洪，中取則空，沈取復有。      | 清熱保肺<br>清絡止血   | 雷氏清宣金臟法 + 苦芩、黑梔                |                                              | ● 體實                                                 |
|     |          |                                                         |                | 雷氏卻暑調元法                        | 卻暑調元元氣傷，暑侵熱盛正宜匡，東洋參麥苓甘米，半夏石膏滑石裏。米—粳米         | ● 體虛                                                 |
|     |          |                                                         |                | 清絡飲 + 杏仁、苡仁、滑石                 | 清絡竹荷金銀花，翠衣絲瓜扁豆花。竹—竹葉心                        | ● 暑濕傷肺                                               |
|     | 暑穢       | 頭痛而脹，胸脘痞悶，煩燥嘔惡，膚熱有汗，甚則神昏耳聾。                             | 芳香化濁           | 雷氏芳香化濁法 + 滑石、甘草                | 芳香化濁佩霍香，大腹陳朴半荷裏，暑濕溫邪胸脘悶，嘔吐諸痧服之康。佩—佩蘭         | ● 暑熱重：苔色黃膩，心煩口渴                                      |
|     |          |                                                         |                | 雷氏芳香化濁法 + 神麴、蒼朮                |                                              | ● 暑濕重：舌苔白膩，口亦不渴                                      |
|     |          |                                                         | 開通氣機           | 通關散                            | 通關散用細辛皂，吹鼻得嚏保生還。                             | ● 穢濁蒙閉清竅                                             |

|                                                                                                                                                                                   |  |        |       |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                   |  | * 溫開之劑 | * 玉樞丹 | 紫金朱砂山慈菇，千金五倍戟麝雄，<br>小兒疔瘡糯米糊，化痰開竅辟穢毒。<br>千金子 五倍子 |  |
| <p>* 無衛分過程：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新感：<u>暑溫</u></li> <li>● 伏氣：<u>春溫</u>(但有新感引發的可能)、<u>伏暑</u>(不論發於氣分，抑或發於營分，均為新涼所觸發)</li> <li>● 瘟疫：<u>濕熱疫</u>(膜原)</li> </ul> |  |        |       |                                                 |  |



## ● 第四章 濕溫

|                                                               |                                                                                       |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 提綱                                                            | ● 濕溫是由濕熱病邪所引起的急性外感熱病。本病四時皆有，但以 <u>夏末秋初</u> 雨濕較盛、氣候炎熱之時為多。                             |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | ● 病因：外邪入裡，裡濕為合→薛生白：「 <u>太陰</u> 內傷，濕飲停聚，客邪再至，內外相引，故病濕熱。此皆先有內傷，再感客邪。」                   |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | ● 初起：濕邪偏重，積留氣分，以脾胃為病變中心。發病緩慢，病程較長，易發白☹。→ <u>身熱不揚、頭痛惡寒、身重疼痛、胸悶、脘痞、不渴、面色淡黃、苔白膩、脈濡緩。</u> |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | ● 中後期：濕熱之邪侵入中焦→①濕熱化燥傷陰    ②濕盛困阻傷陽                                                     |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | 1. 中氣實者，病多在胃：熱>濕→壯熱汗出，口渴但不欲多飲，胸痞嘔惡，心煩澀赤，便秘或溏而不爽，舌苔黃膩甚或乾燥，舌邊尖紅絳，脈象濡數。                  |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | 2. 中氣虛者，病多在脾：濕>熱→身熱不揚，渴不引飲或喜熱飲，胸悶泛惡，四肢倦怠，身重頭蒙，神情呆鈍，小便渾濁，大便溏泄，脈象濡緩，舌苔白膩等。              |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | ● * 辨證：首重分辨濕熱之偏盛程度，其次應辨別病變所屬部位。                                                       |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | ● 治則：                                                                                 |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | 1. 注重分解濕熱，濕去熱孤則易消解→* 吳鞠通：「徒清熱則濕不退，徒祛濕則熱愈熾。」                                           |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
|                                                               | 2. 本病初起禁用發汗、攻下、滋陰等法→* 吳鞠通：「汗之則神昏耳聾，甚則目瞑不欲言，下之則洞泄，潤之則病深不解。」                            |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
| ● 現代醫學的傷寒、副傷寒、沙門氏菌屬感染、病毒感染、鉤端螺旋體病、流行性感冒等，有表現為濕溫證候者，可參考本病辨證施治。 |                                                                                       |                                                                  |          |          |                                            |                                   |
| * 濕遏衛氣                                                        |                                                                                       | 頭痛重脹(因於濕，首如裹)，惡寒，身重疼痛，體倦無力，身熱不揚，午後則熱象較顯，胸脘痞悶不饑，口不渴，面色淡黃，苔白膩，脈濡緩。 | 宣化表裏之濕   | * 藿朴夏苓湯  | 藿朴夏苓濕在表，三仁豆豉瀉豬苓。                           | ● 表濕較甚：藿香、豆豉→芳化透表，用於濕較甚者          |
|                                                               |                                                                                       |                                                                  |          | * 三仁湯    | 三仁杏蔻薏苡仁，夏朴通草竹葉存，加入滑石滲濕熱，身重胸悶屬濕溫。通草→白通草、通脫木 | ● 裏濕蘊熱：竹葉、滑石→無芳化透表之用，卻有辛涼泄熱之功。    |
| 邪在氣分                                                          | * 三焦升降失司                                                                              | 三焦濕鬱，升降失司：脘腹連脹，大便不爽。                                             | 宣化中焦濕濁   | * 一加減正氣散 | 正氣藿苓厚朴陳，一杏神腹麥茵陳。                           | ● 苦辛微寒法                           |
|                                                               |                                                                                       | 濕鬱三焦：脘悶，便溏，身痛，舌白，脈象模糊。                                           | 化濕理氣宣通經絡 | * 二加減正氣散 | 二加己豆通苡仁。<br>豆一大豆黃卷 通一通草                    | ● 苦辛淡法                            |
|                                                               |                                                                                       | 穢濕著裏：舌黃，脘悶，氣機不宣，外則釀熱。                                            | 理氣化濕兼以泄熱 | * 三加減正氣散 | 三加滑石苦杏仁。                                   | ● 苦辛寒法                            |
|                                                               |                                                                                       | 穢濕著裏，邪阻氣分：舌白滑，脈右緩。                                               | 溫中化濕     | * 四加減正氣散 | 四神草果山楂好。                                   | ● 苦辛溫法                            |
|                                                               |                                                                                       | 穢濕著裏：脘悶，便瀉。                                                      | 運脾燥濕     | * 五加減正氣散 | 五用大穀蒼朮真。<br>大一大腹皮 穀一穀芽                     | ● 苦辛溫法                            |
|                                                               | 穢濁阻於膜原                                                                                | 濕邪偏重 + 穢濁：寒熱往來如瘧狀，寒甚熱微，身痛有汗，手足沉重，嘔逆脹滿，舌苔白厚膩濁或如積粉，脈緩              | 宣透膜原     | 雷氏宣透膜原法  | 宣透膜原果朴榔，苓甘藿夏引生薑，熱寒似瘧苔白滑，邪遏膜原第一方。           | ● 本方係從達原飲化裁而來。<br>● 厚朴、草果、檳榔直達膜原。 |
|                                                               | 邪留少陽三焦                                                                                | 寒熱起伏，胸悶(上)，脘痞腹脹(中)，溲短(下)、苔膩等。                                    | 分消走泄宣展氣機 | 黃連溫膽湯    | 溫膽湯—大棗+黃連                                  |                                   |
|                                                               | 濕困中焦                                                                                  | 身熱不揚，脘痞腹脹，噁心欲吐，口不渴或渴而不欲飲或渴喜熱飲，大便溏泄，小便混濁，苔白膩，脈濡緩。                 | 燥濕化濁     | 雷氏芳香化濁法  | 芳香化濁佩藿香，大腹陳朴半荷裏，暑濕溫邪胸脘痞，嘔吐諸痧服之康。<br>佩—佩蘭   |                                   |
|                                                               | * 濕熱中阻                                                                                | 發熱汗出不解，口渴不欲多飲，脘痞嘔噁，心中煩悶，便                                        | 辛開苦降     | * 王氏連朴飲  | 王氏連朴薑炒連，梔鼓薏夏藿葉銜，                           |                                   |

|      |                |                                                                                           |                |                             |                                                       |                                         |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                | 青色黃，溲短赤，苔黃膩，脈濡數。                                                                          | 清化濕熱           | 半夏瀉心湯 - 人參、乾薑、甘草、大棗 + 枳實、生薑 |                                                       | ● 嘔甚而痞，濕熱互結，中焦痞塞不通者。                    |
|      | * 濕熱瀰漫三焦       | 苔灰白，胸痞悶，身熱嘔惡，煩渴自利，汗出溺短。                                                                   | 苦辛開泄<br>清利三焦   | * 杏仁滑石湯                     | 杏仁滑石鬱芩連，陳夏通滑厚朴先。<br>鬱一鬱金 通一通草                         |                                         |
|      | * 濕熱膠結難解       | 脈緩，舌苔淡黃而滑，身痛，渴不多飲，或竟不渴，汗出熱解，繼而復熱。                                                         | 清化濕熱           | * 黃芩滑石湯                     | 黃芩滑石薏通草，大腹豬苓苓皮全。<br>薏一白豆薏                             |                                         |
| 邪在氣分 | * 濕熱蘊毒         | 發熱口渴，胸悶腹脹，肢酸倦怠，咽喉腫痛，小便黃赤，或身目發黃，苔黃而膩，脈滑數。                                                  | 清熱解毒<br>化濕     | * 甘露消毒丹                     | 甘露消毒菴藿香，茵陳滑石木通菖，<br>翹苓貝母射干薄，濕溫黃疸服之康。                  | ● * 王孟英：「此治濕溫時疫之主方也。」                   |
|      | 濕熱鬱發白          | 發熱身痛，有汗不解，胸脘痞悶欲嘔。苔黃滑膩，胸腹等處發出白㖥。                                                           | 清泄濕熱<br>透邪達外   | 薏苡竹葉散<br>三仁湯                | 薏苡竹葉菴滑石，通草茯苓連翹穿。                                      | ● * 濕熱鬱阻之白㖥：狀如水晶，破之有淡黃色漿液流出→濕熱之邪有向外透泄之機 |
|      |                |                                                                                           | 補益氣液           | 生脈散                         | 人參、麥冬、五味子                                             | ● * 氣液枯竭之枯㖥：㖥色枯白而空殼無漿。                  |
|      | 濕熱釀痰<br>蒙蔽心竅   | 身熱不退，朝輕暮重，神識昏蒙，似清似昧，或時清時昧，時或譫語，舌苔黃膩，脈濡滑而數。                                                | 清熱化濕<br>豁痰開竅   | 菖蒲鬱金湯                       | 菖蒲鬱金炒山梔，竹燈通翹牡丹施，<br>薑汁竹瀝祛痰濁，五分玉樞沖服之。<br>燈一燈蕊 通一木通 玉樞丹 | ● 熱邪偏重→ + 至寶丹<br>● 痰濁偏盛→ + 蘇合香丸         |
|      | 濕阻下焦<br>泌別失職   | 濕 > 熱：熱蒸頭脹，小便不通，渴不多飲，苔白膩。                                                                 | 淡滲濕邪           | 茯苓皮湯                        | 茯苓皮湯生苡仁，豬苓通草腹皮倫，<br>再加竹葉水煎服，淡滲分消濕熱清。                  |                                         |
|      | 濕阻腸道<br>傳導失司   | 神識如蒙，少腹硬滿，大便不通，苔垢膩。                                                                       | 宣通氣機<br>清化濕濁   | 宣清導濁湯                       | 宣清導濁二苓全，寒水蠶砂皂角宣。                                      | ● 本證非燥屎內結，故禁用苦寒下奪。                      |
|      | * 濕熱挾滯<br>內阻胃腸 | 身熱不退，胸脘痞悶，腹微痛，大便溏而不爽，舌苔黃濁。                                                                | 緩下其邪           | * 枳實導滯丸                     | 枳實導滯首大黃，苓連麴朮澤苓襄，<br>最宜蒸餅糊丸服，濕熱能除積滯攘。                  | ● * 一般濕溫忌用攻下，本證為特例之一。                   |
|      | 熱熾陽明<br>濕困太陰   | 熱 > 濕：高熱汗出，面赤氣粗，口渴欲飲，身重脘痞，苔黃微膩，脈象滑數。                                                      | 清陽明胃熱<br>化太陰脾濕 | 白虎加蒼朮湯                      | 石膏、知母、粳米、炙甘草、蒼朮                                       |                                         |
|      | * 陽明熱結兼濕       | 身熱面赤，口渴咽乾，渴欲飲水，脘痞便秘，苔黃燥，脈沈實。                                                              | 攻下熱結           | * 小承氣湯等分方                   | 大黃、厚朴、枳實各等份                                           | ● 大黃減量，減輕原方苦寒之性。<br>● 厚朴、枳實增量，有助於化濕。    |
| 邪在營血 | 濕熱化燥<br>入於心包   | 痰濕化燥，內陷厥陰，閉阻心包：身熱不退，神昏少有清醒之時，譫語，甚則昏憤不語，舌蹇肢厥，舌質紅絳，苔薄黃少津。<br>心竅閉阻不開，又突然陽氣外脫：身熱，驟退、汗出不止、脈微細。 | 清心開竅<br>兼祛餘濕   | 加減清宮湯送服紫雪丹、至寶丹              |                                                       | ● 清宮湯 - 蓮子心、連心麥冬 + 金銀花、赤小豆皮             |
|      |                |                                                                                           | 益氣固脫<br>清心開竅   | 生脈散、參附湯配安宮牛黃丸               |                                                       |                                         |
|      | 濕熱化燥瘧厥         | 壯熱，口渴，瘧瘧，昏譫或笑，苔黃，舌紅而燥。                                                                    | 涼營養陰<br>開竅熄風   | 薛氏救陰泄邪方                     | 犀角、羚羊角、連翹、生地、玄參、<br>鉤藤、銀花露、鮮菖蒲、至寶丹                    |                                         |

|      |              |                                  |                      |                               |                                            |                                 |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|      | 濕熱化燥<br>大便下血 | 灼熱煩躁，便下鮮血，舌質紅絳，脈細數。              | 涼解血熱<br>止血           | 犀角地黃湯 + 連翹、紫草、茜草根、銀花露、地榆炭、側柏炭 |                                            |                                 |
|      | 下血過多<br>氣虛欲脫 | 大便血出不止，顏面蒼白，汗出肢冷，舌淡無華，脈象微細。      | 益氣固脫<br>扶陽益陰<br>養血止血 | 獨參湯<br>黃土湯                    | 人參<br>溫陽攝血黃土湯，朮草膠附生地協，<br>更加黃芩成反佐，陽虛失血此堪嘗。 | ● 有形之血不能驟生，無形之氣所當急固。            |
| 濕邪寒化 | 濕困脾陽         | 脘腹脹滿，大便不爽，或瀉，食少無味，舌苔白膩而滑，脈緩遲。    | 健脾化濕<br>理氣暢中         | * 四加減正氣散<br>* 五加減正氣散          | 四神草果山楂好。五用大穀蒼朮真。                           |                                 |
|      | 濕勝陽微         | 身冷，汗泄，胸痞，口渴，苔白膩，舌淡滑，脈沈細。         | 補氣扶陽<br>逐濕           | 薛氏扶陽逐濕湯<br>真武湯                | 人參、附子、益智仁、白朮、茯苓                            | ● * 葉天士《溫熱論》：「面色白者要顧其陽氣，濕勝則陽微。」 |
| 後期調治 | 餘邪未淨         | 身熱已退，脘中微悶，知饑不食，苔薄膩。              | 輕清芳化<br>滌除餘邪         | * 薛氏五葉蘆根湯                     | 五葉蘆根冬瓜子，薄薑佩荷枇杷集。                           |                                 |
|      | 邪退正虛         | 身熱已退，神疲倦語，不思食，小便短少，唇齒乾，舌紅苔少，脈細弱。 | 甘寒養胃<br>甘淡實脾         | 薛氏加減生脈散                       | 薛氏參麥木瓜湯，石斛甘蓮穀芽充。                           |                                 |

## ● 第五章 伏暑

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |                     |                  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| 提綱  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本病因發生於暑令之後，在發病季節上又有遲早不同，有發於秋季的，也有發於冬季的，所以有晚發、伏暑秋發、冬月伏暑等名稱。起病急驟，病勢既重，且纏綿難解。</li> <li>● 特點是發病 * 初期與感冒相似，繼而形似瘧疾，惟其寒熱不規則。以後則 * 惡寒罷而但發熱，夜間熱甚，至天明得汗身熱稍減，而胸腹灼熱不除，大便可見 * 溏而不爽，其色如醬。</li> <li>● 病機：伏暑的發生，不論發於氣分，抑或發於營分，* 均為新涼所觸發，初起必兼有衛分表證。</li> <li>1. * 發於氣分(氣分伏暑)：發病之初見有暑濕內鬱氣分的證象→衛 + 氣同病</li> <li>2. * 發於營分(營分伏暑)：發病之初見有邪熱在營的證象→衛 + 營同病</li> <li>● 伏暑包括發生於秋季或冬季的流感、病毒性感染、沙門氏菌屬感染及乙腦等傳染性疾病。</li> <li>● * 吳鞠通：『伏暑、暑溫、濕溫，證本一源，前後互參。不可偏執。』</li> <li>1. 暑溫：多發生在夏季小暑 - 大暑期間，以陽明氣分熱盛為主，初起極少有衛表見證，易傷津氣，尤易動風。兼濕的則每多見脘痞身重等症。</li> <li>2. 濕溫：多發生在夏末秋初，每以脾胃為病變中心。病勢纏綿，在氣易發白，入血每多出現便血。</li> <li>3. 冬溫：發生於冬季的新感溫病，常以肺衛表證為主要臨床表現。無暑濕或暑熱內鬱等症。</li> </ul> |                                     |              |                     |                  |  |
| 裏熱兼 | * 氣分兼表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 外有表邪，裡有暑濕：頭痛惡寒，發熱無汗，心煩口渴，小溲短赤，脘痞苔膩。 | 辛散解表<br>清熱利濕 | * 黃連香薷飲             | 三物香薷豆朴先，若云熱盛用黃連。 |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 衛分表熱較重，暑濕見證不甚：發熱重，微惡寒，舌白滑，口渴無汗。     | 辛涼透表<br>兼利暑濕 | * 銀翹散 + 杏仁、滑石、苡仁、通草 |                  |  |

|                  |                                  |                                                                                      |              |                     |                                                       |                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表<br>證           | * 營分兼表                           | 發熱微惡寒，頭痛少汗， <u>口乾不渴</u> ，心煩， <u>舌赤無苔</u> 。                                           | 辛涼解表<br>清營瀉熱 | * 銀翹散 + 生地、丹皮、赤芍、麥冬 |                                                       |                                                                                                           |
| * 邪在少陽膽經         |                                  | 寒熱似瘧，口渴心煩，脘痞苔膩， <u>身熱午後較重</u> ， <u>入暮尤劇</u> ， <u>天明得汗</u> ，諸候稍減，但 <u>胸腹灼熱</u> ，始終不除。 | 清泄少陽<br>兼以利濕 | * 蒿芩清膽湯             | <u>溫膽湯</u> + 青蒿、黃芩 + <u>碧玉散</u>                       |                                                                                                           |
| 熱<br>結<br>胃<br>腸 | * 濕熱挾滯<br><br>阻於胃腸<br><br>(僅在大腸) | 胸腹灼熱，嘔噎，* <u>便溏不爽</u> ， <u>色黃如醬</u> ，苔黃垢膩。                                           | 瀉熱理氣<br>利濕解毒 | <u>枳實導滯湯</u>        | 枳實導滯黃連櫛，小承紫翹通楂神。<br>紫—紫草 通—木通                         | ● 濕熱挾滯，阻於胃腸，非一次攻下即能排除病邪→總以胃腸病邪全淨，濕熱挾滯之證消失為度。<br>1. 連續攻下多次而病始得解除<br>2. 下後不久，熱勢復作，宜再攻下<br>● 病變重心在 <u>大腸</u> |
|                  | <u>陽明腑實</u><br><u>小腸熱結</u>       | <u>陽明腑實</u> ： <u>身熱</u> ，煩渴，腹滿痛拒按，苔黃燥。<br><u>小腸熱結</u> ： <u>小便短赤</u> 而痛               | 通腑瀉熱         | * <u>導赤承氣湯</u>      | 導赤承氣用硝黃，生地連柏赤芍嘗。                                      | ● 本證病變重心在 <u>大小二腸</u>                                                                                     |
| 邪<br>在<br>營      | 熱在 <u>心營</u><br><br>下移 <u>小腸</u> | 發熱日輕夜重，心煩不寐、口乾、渴不欲飲， <u>小溲短赤熱痛</u> ， <u>舌絳</u> 等。                                    | 清心涼營<br>清泄腸腑 | <u>導赤清心湯</u>        | <u>導赤</u> 清心麥茯神，丹皮 <u>益元</u> 燈蓮芯。<br>蓮子心              |                                                                                                           |
| 營<br>血           | 熱閉心包<br><br><u>血絡瘀滯</u>          | 發熱夜甚，神昏譫語。 <u>漱水不欲嚥</u> ，舌絳無苔，望之若乾，捫之尚潤，或紫晦而潤等。                                      | 清營泄熱<br>開竅通瘀 | <u>犀地清絡飲</u>        | <u>犀地</u> 清絡翹桃仁， <u>薑汁竹瀝</u> 茅燈萐。<br>鮮茅根、燈芯、鮮石菖蒲汁煎湯代水 |                                                                                                           |

## ● 第六章 秋燥

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |          |         |                                                                     |                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 提綱   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 秋季感受燥熱病邪所引起的外感熱病。病變重心在肺，以衛氣分見證為主，病情較輕，傳變較少，預後較好→喻嘉言：「燥氣先傷於上焦華蓋。」</li> <li>● 其中涼燥類風寒，溫燥近似風溫。但不論涼燥或溫燥，初起除具有表證外，都必兼有津氣乾燥見症，如咽乾、鼻燥、咳嗽少痰、皮膚乾燥等。</li> <li>● 病程： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初起臨床表現類似風熱表證</li> <li>2. 肺衛燥熱之邪不解，勢必內傳於裏→傷津耗液 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 燥熱在肺→則可形成肺燥陰傷。</li> <li>■ 傳入胃腸→則可導致肺胃陰傷、肺燥腸閉或陰傷腑實等證。</li> </ul> </li> <li>3. 少數患者，如感邪較重，正氣較虛，亦可內陷營血或傳入下焦。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 傳入營血者→可出現絡傷咳血或氣血兩燔。</li> <li>■ 深入下焦者→則可以傷及肝腎之陰，導致水不涵木、虛風內動等證。</li> </ul> </li> <li>4. 燥熱為患，一般證情較輕，大多病在衛、氣分階段即可告癒，危重病例較為少見。</li> </ol> </li> <li>● 治則：燥邪最易傷津，所以治療以滋潤為主→《素問·至真要大論》：「燥者潤之」 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 治療秋燥 * 初、中、末三期之大法→上燥治氣，中燥增液，下燥治血</li> <li>2. * 涼燥初起→宜辛開溫潤</li> <li>3. * 溫燥初起→宜辛涼甘潤。</li> <li>4. 一般溫病化熱以後，有用苦寒清熱的，惟燥證則喜柔潤，最忌苦燥→「治火可用苦寒，治燥必用甘寒。火鬱可以發，燥勝必用潤，火可以直折，燥必用濡養。」</li> </ol> </li> </ul> |                                                |          |         |                                                                     |                              |
| 邪在肺衛 | * 溫燥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 發熱，微惡風寒，頭痛，少汗，咳嗽少痰，咽乾鼻燥，口不作渴，苔白舌紅，右脈數大。        | 辛涼甘潤     | * 桑杏湯   | 桑杏湯用象貝宜，沙參梔豉與梨皮，頭痛身熱渴乾咳，清宣涼潤燥能醫。<br><small>象貝一浙貝</small>            |                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |          | 桑菊飲     | 桑菊飲中桔梗翹，杏仁甘草薄荷撿，蘆根為飲輕清劑，風溫咳嗽服之消。                                    | ● 感燥而咳嗽，其證情尚較輕淺。             |
| 邪在氣分 | * 涼燥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 發熱，惡寒較重，頭痛，無汗，鼻塞，咽乾唇燥，口不作渴，咳嗽稀痰等。苔薄白而乾，舌質未有變化。 | 宣肺達表化痰潤燥 | * 杏蘇散   | 杏蘇散內夏陳前，甘桔枳芩薑棗全，別有夏陳苓杏芥，加甘乃號六安煎。                                    | ● 化熱後與溫燥同趨一轍。                |
|      | * 燥干清竅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 耳鳴、目赤、齦腫、咽痛等。                                  | 輕清宣透上焦燥熱 | 翹荷湯     | 翹荷湯用綠豆皮，甘草桔梗黑梔皮。                                                    | ● 咽喉為肺胃之門戶<br>● 牙齦為陽明經脈所絡    |
|      | * 燥熱傷肺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 身熱，乾咳無痰，咳嗽而喘，咽喉乾燥，鼻燥，胸滿脅痛，心煩口渴，舌苔薄白而燥，舌質邊尖紅赤等。 | 清肺潤燥     | * 清燥救肺湯 | 清燥救肺參草麻，阿膠膏杏麥枇杷，經霜收下冬桑葉，氣津兩傷服之佳。<br><small>麻一胡麻仁 膏一煅石膏 麥一麥冬</small> |                              |
|      | * 肺胃陰傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 津傷為主，燥熱較輕：身熱不甚，乾咳不已，無痰(肺)，口舌乾燥而渴(胃)。           | 滋養肺胃津液   | * 沙參麥冬湯 | 麥玉沙桑甘豆花<br><small>玉一玉竹 豆一白扁豆 花一天花粉</small>                          | ● 本方純屬生津養液之品，用於津傷而邪熱不甚者，最為適宜 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |          | * 五汁飲   | 五汁蘆梨薺麥藕(攪來去賣藕)<br><small>藕汁↔蔗漿 蘆一葦根 薺一葶薺</small>                    | ● 津傷而邪熱甚的，應合於清熱方中使用。         |

|      |              |                                   |              |                     |                                 |                          |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
|      | * 肺燥腸閉       | 咳嗽不爽而多痰，胸腹脹滿，便秘等。                 | 肅肺化痰<br>潤腸通便 | * 五仁橘皮湯             | 五仁橘皮杏桃仁，松柏郁李上下行。                | ● 用原桃仁者，只取其潤腸而不欲其破血行瘀也。  |
|      | 腑實津傷         | 便秘，腹脹，神昏譫語，苔黑乾燥。                  | 攻下腑實<br>滋養陰液 | 調胃承氣湯 + 鮮首烏、鮮生地、鮮石斛 |                                 |                          |
| 邪在營血 | 肺燥腸熱<br>絡傷咳血 | 初起喉癢乾咳，繼則因咳甚而痰黏帶血，胸脅牽痛，腹部灼熱，大便泄瀉。 | 清熱止血<br>滋陰潤燥 | 阿膠黃芩湯               | 阿膠黃芩蔗桑杏，芍藥甘草車下行。<br>桑—桑白皮 車—車前子 | ● 肺中燥熱之邪下移腸道，故腹部灼熱而大便泄瀉。 |
|      | 氣血兩燔         | 身熱，口渴，煩躁不安，甚或吐血衄血，苔黃舌絳。           | 氣血兩清         | * 加減玉女煎             | 玉女煎—熟地、牛膝+細生地、玄參                |                          |



## ● 第七章 溫毒

|    |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提綱 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 溫毒是 <u>* 溫熱時毒</u> 疾患的總稱：除具有一般 <u>外感見證</u> 外，<u>*</u> 並出現①<u>局部紅腫熱痛</u>，甚則②<u>潰爛</u>等證的病候。</li> <li>● 一般發生於 <u>* 冬春</u> 兩季。</li> </ul> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ● 大頭瘟(顏面丹毒)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                |                                                  |                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提綱     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 大頭瘟是感受 <u>風熱時毒</u> 而引起的一種以 <u>* 頭面焮赤腫大</u> 為特徵的急性外感熱病。以 <u>* 肺胃</u> 為主要病位，多發生於 <u>冬春季節</u>。<u>本病少有深入營血者，預後較好，很少引起死亡。</u></li> <li>● 中醫歷代文獻上記載的大頭瘟 <u>* 有強烈的傳染性，可引起大範圍的流行，並有較高的死亡率</u>，這與 <u>顏面丹毒</u>、<u>流行性腮腺炎</u> 又有不盡相同之處。</li> </ul> |                      |                |                                                  |                                                                                                                        |
| * 衛氣同病 | 1. <u>風熱時毒</u> 自口鼻而入 → <u>衛</u> 受邪鬱 (起病急，短暫的憎寒發熱) → <u>氣分</u> 熱毒蒸迫， <u>肺胃</u> 受病 (壯熱煩躁，口渴引飲，咽喉疼痛)<br>2. <u>風邪上犯</u> ，邪毒向上攻竄於 <u>頭面</u> ，搏結脈絡 (頭面紅腫疼痛，甚則發生潰爛) → 邪毒內陷，深入 <u>營血</u> ，或犯 <u>手足厥陰經</u> (動血耗血、神昏驚厥)                                                                    | 疏風透邪<br>清熱解毒<br>衛氣同治 | * 普濟消毒飲        | 普濟消毒芩連鼠，元參甘桔藍根侶，升柴馬勃連翹陳，薄荷殭蠶為末咀，或加入參及大黃，大頭天行力能禦。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 表證顯著而裡熱未盛：- <u>芩連</u></li> <li>● 兼陽明腑實：+ <u>大黃</u></li> </ul>                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 水仙膏            | 水仙花根                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 其妙全在 <u>汁之膠黏</u>，<u>能拔毒外出</u></li> <li>● 敷之以見 <u>皮膚小黃瘡</u> 為度</li> </ul>      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | * <u>三黃二香散</u> | <u>連柏大乳沒</u>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 性味苦寒辛芳，有清火、消腫、活絡、鎮痛的作用。</li> <li>● <u>塗水仙膏後，腫未盡清的，則以此散敷之，以善其後。</u></li> </ul> |

## ● 爛喉痧(猩紅熱) - 爛喉疳痧、時喉痧、疫喉痧

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                                           |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|
| 提綱     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 爛喉痧是一種嚴重的傳染性疾患，多發於 <u>冬春</u> 兩季。</li> <li>1. <u>* 以咽喉疼痛腐爛，肌膚發出紅色疹子(瘧痧)</u> 為主症，故又名 <u>爛喉疳痧</u>。</li> <li>2. <u>* 因其發病與時令氣候變化有著密切關係</u>，所以又稱為 <u>時喉痧</u></li> <li>3. <u>* 因其具有傳染性</u>，能引起流行，所以又有 <u>疫喉痧</u> 之稱。</li> <li>● <u>* 發病機轉為病毒外襲，肺胃受邪。</u></li> <li>● 治則：宣肺、清火、解毒、養陰 → <u>* 丁甘仁：「爛喉疳痧以暢汗為第一要義。」</u></li> </ul> |          |                 |                                           |                  |
| * 毒侵肺胃 | 初起憎寒發熱，繼即壯熱煩渴， <u>咽喉紅腫疼痛</u> ，甚或 <u>潰爛</u> ， <u>肌膚疳痧隱約</u> ，苔白乾燥。舌紅如朱，脈弦數，或沉數，或沉弦不數。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 解表發汗     | 清咽湯             | 清咽浮萍薄荷防，甘桔殭蠶杏牛蒡。枳前橄欖解咽毒，發表暢汗第一方。          | ● 表邪重            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 清裡泄熱兼行解表 | * <u>清咽梔子豉湯</u> | 清咽梔鼓馬牛犀，銀翹甘桔薄荷殭。馬勃 牛蒡子                    | ● 裡熱重(裏熱已熾而表猶未淨) |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 解毒消腫     | * <u>玉鑰匙</u>    | 冰硼硝殭蠶 硼砂、火硝、冰片、白殭蠶                        | ● 吹喉             |
| 毒壅上焦   | 壯熱，口渴，煩躁，咽喉紅腫 <u>腐爛</u> ，舌紅苔黃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 清氣泄熱涼膈解毒 | 余氏 <u>清心涼膈散</u> | 余氏清心涼膈散，涼膈竹葉硝黃減，增入 <u>桔梗生石膏</u> ，咽喉潰爛疳痧顯。 | ● 裏熱化火，但病機尚在氣分。  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 清熱解毒祛腐生新 | * <u>錫類散</u>    | 錫類牛象黛珍珠 牛黃 象牙                             |                  |

|      |                                          |              |         |                                            |                       |
|------|------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 毒燔氣血 | 咽喉紅腫腐爛，阻塞不通，疔痧密布，紅暈如斑，壯熱，汗多，口渴，煩燥，舌絳乾燥等。 | 清氣涼營<br>解毒救陰 | 丁氏涼營清氣湯 | 涼營清氣黑元參，犀角地黃加蘆根，<br>梔連薄荷草落翹，石膏石斛竹葉金。<br>金汁 | ● 喉痧重險之候<br>● 氣營(血)兩燔 |
| 餘毒傷陰 | 咽喉腐爛疼痛，壯熱已除，惟午後仍熱，脈象細數，舌紅而乾。             | 滋養陰液<br>兼清餘熱 | 清咽養營湯   | 清咽養營病在上，知母花粉與熱抗，<br>茯神芍草增液湯，二冬西洋正氣旺。       | ● 陰虛之熱                |

## ● 第八章 溫疫 - 天行、時行

|        |                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提<br>綱 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 溫疫是感受疫癘之毒而發生的急性熱病。其特點是發病急劇，病情險惡，①傳染性強，能引起②大流行(天行、時行)</li> <li>● 吳又可《溫疫論》所論之溫疫，即為濕熱穢濁之疫→濕熱疫</li> <li>● 余師愚《疫疹一得》所論之溫疫，則為暑燥淫熱之疫→暑燥疫</li> </ul> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ● 濕熱疫

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                            |       |                                  |                                                                   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 提綱 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 感受濕熱疫毒，舍於膜原。因疫毒深重，多反復傳變，所以吳又可《溫疫論》中又有九傳的敘述。<ul style="list-style-type: none"><li>1. * 病邪外出→太陽表證</li><li>2. * 入裏化燥→陽明裏證</li></ul></li><li>● 吳又可認為「邪由口鼻而入，舍於伏膺之內，附近於胃，即內經所謂橫連膜原。」</li><li>● 本病濕濁之邪較重，熱邪為其所遏而難以透達，故*治療以疏利透達為原則，不可強用發汗之方或攻裏之劑，徒傷正氣。</li></ul> |                                                   |                            |       |                                  |                                                                   |  |
|    | * 邪遏膜原                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 初起憎寒壯熱，嗣後但熱不寒，晝夜發熱，日晡益甚，頭痛身痛。其脈不浮不沈而數，苔白如積粉，舌質紅絳。 | 疏利透達膜原之邪                   | * 達原飲 | 達原朴果與檳榔，黃芩知母芍甘嘗，邪伏膜原憎寒熱，辟穢化濁效力強。 | ● 如服達原飲後，舌變黃色，隨現胸膈滿痛，人渴煩躁，此為濕熱之邪內傳陽明，逐漸化燥阻塞胃腑，而膜原之邪，仍然錮結未解→達原飲+大黃 |  |
|    | 邪傳陽明                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * 陽明氣熱                                            | 壯熱口渴，大汗出，舌苔黃，脈洪數。          | 清泄陽明  | * 白虎湯                            | 石膏、知母、生甘草、粳米<br>(清瀉陽明禮熱主方)                                        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * 熱結胃腑                                            | 煩渴身熱，午後復加，煩燥熱盛，鼻如煙煤，舌變黑生刺。 | 急下熱實  | * 大承氣湯                           | 大黃、芒硝、厚朴、枳實                                                       |  |

## ● 暑燥疫

|          |                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                                            |                                                                                                   |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 提綱       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 本病為感受暑燥淫熱疫毒所引起。多見於久旱無雨，暑氣亢盛之年。</li><li>● 病機：淫熱火毒燔熾陽明，外竄經絡，內攻臟腑，以致毒邪充斥表裏上下內外，而出現一派熱毒極盛的見證。</li><li>● * 治則：大劑清熱解毒，涼血救陰，不可誤用表散，誤則烈焰煽揚，如火得風助，必致勢不可抑。</li></ul> |          |                        |                                            |                                                                                                   |  |
| * 熱毒充斥表裏 | 身大熱，頭痛如劈，兩目昏眊，或狂躁譫妄，口乾咽痛，骨節煩疼，腰如被杖，或吐衄發斑，舌絳苔焦，或生芒刺，脈浮大而數或沈數，或六脈沈細而數。                                                                                                                               | 清熱解毒涼血瀉火 | * 余氏清瘟敗毒飲              | 清瘟敗毒白虎吞，犀角地黃湯當遵，桔梗連翹川連芩，竹葉梔子黑元參。<br>白虎湯一粳米 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 本方運用可因證之輕重，斟酌藥量：小劑→中劑→大劑</li><li>● 白虎+黃連解毒+犀角地黃</li></ul> |  |
| * 熱毒漫延臟腑 | 大熱大渴，口開吹氣，或絞腸痛絕，或頭腦脹痛欲死，或口噤不言，或渾身發臭難聞。或猝然仆地不省人事，雙目直視，脈亂，舌乾黑無苔，或紅裂，或黑苔起瓣，或舌有灰量。                                                                                                                     | 大劑瀉熱解毒   | * 十全苦寒救補湯<br>戴天章《廣溫熱論》 | 十全苦寒名救補，大承氣湯并白虎，犀角黃連解毒湯，不用甘草梔子苦。           | <ul style="list-style-type: none"><li>● 白虎+黃連解毒+大承氣</li></ul>                                     |  |

# 溫病的治法(jujubear)(補完 佑 溫病學整理)

## 溫病的治法

- ◎ 葉天士：「在衛汗之可也，到氣才可清氣，入營猶可透熱轉氣，入血就恐耗血動血，直須涼血散血」  
 ◎ 吳鞠通：「治上焦如羽（非輕不舉），治中焦如衡（非平不安），至下焦如權（非重不沉）」

一、**解表法**：驅除表邪，解除表證。具有疏泄腠理，透邪外出的作用。

臨床：邪在衛分的表證。熱性病初期階段。

| 方法   |         | 作用        | 適用證                                   | 代表方劑    |
|------|---------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 解表泄熱 | 辛涼解表    | 宣泄肺衛，透熱達邪 | 發熱、口微渴，咳嗽、微惡風寒，無汗或汗泄不暢，脈浮數，苔薄白，舌邊尖紅等  | 銀翹散     |
|      | 辛溫(微)解表 | 泄衛透汗      | 微熱惡寒、頭痛少汗、苔白脈浮                        | 蔥豉湯     |
| 解表清暑 |         | 透表清暑      | 夏月暑為寒濕所遏，肌表鬱閉，症見頭痛，惡寒，身形拘急，發熱無汗，口渴心煩等 | 新加香薷飲   |
| 解表化濕 |         | 疏化表濕      | 濕邪困表，惡寒身重，微熱少汗，脘痞苔膩等                  | 藿香正氣散加減 |
| 解表清燥 |         | 疏表清燥      | 溫燥傷肺，頭痛身熱，咳嗽不已，咽乾喉痛，鼻乾唇燥，苔白舌紅欠潤       | 桑杏湯     |

注意：1. 無表證不可使用。 2. 多宜辛涼之劑，切忌率溫燥烈，如麻桂等發汗酸劑。 3. 涼藥不宜用之過早

二、**清氣法**：清泄氣分熱邪，具有清熱存津，除煩止渴

臨床：邪熱入裏而未入營血動血之氣分證

| 方法   | 作用                    | 適用證                                         | 代表方劑          |
|------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 輕清宣氣 | 宣暢氣機，透熱外達             | <u>邪熱初傳氣分，氣機不暢而裏熱不甚</u> ，證見身熱微渴，心中懊穢不舒，苔薄黃等 | 梔子豉湯加萸皮、杏仁、葦莖 |
| 大清氣熱 | 以辛寒清熱之品大清氣熱以退熱存津、除煩止渴 | 陽明胃熱熾盛，而壯熱，汗多，心煩口渴，苔黃，脈洪大之證                 | 白虎湯           |
| 清熱瀉火 | 以苦寒之品直清裏熱             | 熱蘊氣分而化火，裏熱口苦，煩渴溲赤，舌紅苔黃等                     | 黃芩湯加減         |

加減配合：1. 熱邪初入氣分而表未盡解 → 宣氣透表 2. 氣熱亢盛而津傷較甚 → 清熱生津 3. 熱閉於肺，肺氣鬱阻 → 清熱宣肺 4. 熱毒壅結，局部有紅腫熱痛 → 清熱解毒

注意：1. 熱象雖盛而病邪在表者，不可用 2. 素體虛弱者，慎用

三、**和解法**：和解表裏，分清上下、宣泄氣機

臨床：溫病邪鬱少陽、流連三焦、邪伏膜原

| 方法   | 作用                      | 適用證                                              | 代表方劑  |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 清泄少陽 | <u>清透少陽膽經氣分之熱，兼化痰濕</u>  | <u>熱鬱少陽而兼痰濕</u> ，證見：寒熱往來，口苦脅痛，煩渴溲赤，脘痞泛惡，苔膩舌紅，脈弦數 | 蒿芩清膽湯 |
| 分消走泄 | <u>宣泄氣機，化痰利濕，分消三焦之邪</u> | <u>邪留三焦氣分</u> ，氣化失司，痰濕阻遏，證見，寒熱起伏，胸痞腹脹，溲短、苔膩      | 溫膽湯   |
| 開達膜原 | 疏利達膜原濕濁之邪               | 溫疫濕熱穢濁鬱閉膜原，證見寒戰熱熾，脘痞嘔惡，苔白膩如積粉等                   | 達原飲   |

注意：1. 氣分熱盛者則力不盛 2. 病邪留戀氣分，氣化失司，不宜寒涼清透 3. 熱盛津傷者，慎用

◎葉天士：「彼則和解表裏之半，此則分消上下之勢」。彼→傷寒之少陽，此→溫病的少陽。葉天士所言杏、朴、苓等能分消走泄，其用意亦屬和解法

四、**化溼法**：芳香、淡滲或苦溫來祛除濕邪

臨床：溫病熱與濕合，特別是在濕重熱輕時

| 方法   | 作用   | 適用證                                              | 代表方劑  |
|------|------|--------------------------------------------------|-------|
| 芳香化濁 | 透化濕濁 | 濕溫初起，濕邪偏重。證見身熱不揚，頭脹如裹，脘痞腹脹，口渴不欲飲，嘔惡，便溏，溲短，苔膩，脈緩等 | 藿朴夏苓湯 |

|      |        |                                       |       |
|------|--------|---------------------------------------|-------|
| 辛開苦降 | 宣降濕熱之邪 | 濕溫濕漸化熱，鬱遏於裏。證見發熱，脘痞泛惡，口渴不欲飲，小便黃赤，苔黃膩等 | 王氏連朴飲 |
| 淡滲利濕 | 分利濕邪   | 濕中夾熱蘊阻下焦。證見小便短澀甚或不通，熱蒸頭脹，不渴，苔白        | 茯苓皮湯  |

注意：1. 濕已化熱，而熱重於濕，應以清熱為主 2. 濕已化燥，陰液不足等，慎用

#### 五、通下法：瀉下邪熱，通導積滯

臨床：溫病有形實邪內結，如燥屎、積滯、瘀血積聚等證

| 方法   | 作用       | 適用證                                            | 代表方劑  |
|------|----------|------------------------------------------------|-------|
| 苦寒攻下 | 攻瀉實熱     | 陽明腑實。證見潮熱，譫語，腹滿，便秘，苔老黃，脈沉實等                    | 調胃承氣湯 |
| 導滯通腑 | 導泄鬱熱濕滯下行 | 濕熱夾滯，交結胃腸，證見脘腹痞滿，嘔惡，便澇不爽，色黃如醬，肛門灼熱，苔黃厚等        | 枳實導滯丸 |
| 增液瀉下 | 滋養津液、通下  | 津液虧損而又兼腑實。證見大便秘結，口乾唇裂，舌苔乾燥等                    | 增液承氣湯 |
| 通瘀破結 | 驅逐瘀血下行   | 溫病下焦蓄血。證見少腹硬滿急痛、大便秘結，小便自利，其人如狂，漱水不欲咽、舌色紫絳，脈沉實等 | 桃仁承氣湯 |

注意：1. 表邪未解者，不可使用 2. 邪實正虛者，須攻補兼施 3. 增液瀉下，對於濕熱夾滯證，不可漫投

苦寒攻下法→溫病中運用較多，奏效迅速的一個治療方法

柳寶詒：『胃屬五臟六腑之海，位居中土，最善容納，邪熱入胃，則不復他傳，故溫熱病熱結胃腑，得攻下而解者，十居六七。』

#### 六、清營法：清泄邪熱，具有清營泄熱、滋養營陰

臨床：邪熱入營而未入血分

| 方法   | 作用    | 適用證                             | 代表方劑      |
|------|-------|---------------------------------|-----------|
| 清營泄熱 | 透熱轉氣  | 熱入營分，證見身熱夜甚，心煩不寐或神呆譫語，斑疹隱隱，舌質紅絳 | 清營湯       |
| 氣營兩清 | 清營與清氣 | 氣營兩燔。證見壯熱，口渴，煩躁，苔黃舌紅絳，甚或發斑等     | 加減玉女煎、化斑湯 |

注意：1. 清營泄熱法，若邪已動血或邪在氣分者，不可使用 2. 氣營兩燔，需兩者都兼顧

#### 七、涼血法：清解血分邪熱，具有清火解毒、涼血散血作用

臨床：溫病熱邪深入血分，血熱熾盛

| 方法   | 作用          | 適用證                                                             | 代表方劑  |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 涼血散血 | 涼解血分熱邪，活血散血 | 熱邪深入血分，血熱熾盛，迫血妄行。證見吐血、衄血、便血、溲血，斑疹紫黑，躁擾不安，甚或狂亂譫妄，舌質紫絳等           | 犀角地黄湯 |
| 清熱解毒 | 清解氣血中熱毒     | 溫病熱毒壅盛，充斥氣血、三焦。證見壯熱煩渴，口穢噴人，頭痛如破，譫狂不安、斑疹紫黑，或吐血、衄血、苔黃焦燥、舌質焦燥，舌質紫絳 | 清瘟敗毒飲 |

注意：溫病熱毒充斥氣血、三焦須即時採取大劑複方，大清氣血，清瘟敗毒

●血熱熾盛，每易兼見邪閉心包及肝風內動，故涼血法每多配合開竅、熄風等法使用。使用涼血法必須注意的是：

1. 涼血法治療目的著重『涼血散血』，所以涼血中合以活血散血之劑，臨床應用必須和清營法有所區分→犀角地黄湯

2. 溫病熱毒充斥氣血、三焦，其證多來勢凶猛證情險惡，病機上已無復衛氣營血可分，故治療非一般氣營兩清方法所能勝任，而須即時採取大劑複方，大清氣血→清瘟敗毒散

#### 八、開竅法：具有清心化痰，芳香透絡，開閉通竅

臨床：邪閉心包的神昏病變

| 方法   | 作用          | 適用證                                   | 代表方劑          |
|------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| 清心開竅 | 清泄心包邪熱，化痰宣竅 | 熱邪內閉心包。證見神昏譫語或憤不語，舌蹇肢厥，舌質純絳           | 安宮牛黃丸、至寶丹、紫雪丹 |
| 豁痰開竅 | 清化濕熱痰濁、宣竅醒神 | 濕熱鬱蒸，釀痰蒙閉清竅，證見神識昏蒙，時明時昧，身熱不高，舌質雖紅而苔黃膩 | 菖蒲鬱金湯         |

注意：邪入營血，未見厥閉者，不可早用清心開竅

九、**熄風法**：清熱涼肝、滋陰潛鎮以平息肝風，定驚止癇

臨床：溫病肝風內動，抽風驚厥之證

| 方法   | 作用        | 適用證                                                            | 代表方劑  |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 涼肝熄風 | 清熱涼肝，熄風定癇 | <b>溫病熱盛</b> 引動肝風，證見手足抽搐，灼熱肢厥，神迷，口噤，脈弦數                         | 羚角鉤藤湯 |
| 滋陰熄風 | 滋補肝腎，潛鎮風陽 | 溫病後期 <b>肝腎陰傷</b> ，肝脈失養， <b>虛風內動</b> ，證見手足蠕動甚或瘈瘲，肢厥神倦，舌乾絳少苔，脈虛細 | 大定風珠  |

注意：1. 小兒在病初期即可因高熱而引起抽搐，根據病在衛、在氣而以清熱透邪為主。熱退抽搐停止，不宜徑投涼肝熄風之品  
2. 涼肝熄風：**重祛邪** 滋陰熄風：**偏扶正**

十、**滋陰法**：滋補真陰、壯水增液，生津養液，滋陰潤燥

臨床：凡溫病中出現陰液不足現象

| 方法   | 作用        | 適用證                                             | 代表方劑      |
|------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 滋養肺胃 | 滋養肺胃津液    | <b>氣分熱邪</b> 漸解，胃陰或肺陰受傷。證見口乾咽燥，舌苔乾燥，或乾咳無痰等       | 沙參麥冬湯、益胃湯 |
| 增液潤腸 | 生津養液、潤腸通便 | <b>陽明溫病</b> ，津液不足，證見腸燥便秘，咽乾口渴，舌紅而乾等             | 增液湯       |
| 滋補腎陰 | 滋補真陰，壯水增液 | 溫病熱邪久羈，劫燬真陰，證見身熱面赤，手足心熱甚於手足背，口乾咽燥，神倦欲眠，舌絳而乾，脈虛細 | 加減復脈湯     |

注意：1. **邪熱亢盛之實證**，不可濫用滋陰，即使邪熱盛而陰不足，也只可清熱之中合以滋陰 2. **濕熱之證**，切忌使用→戀滯病邪，膠著難解

◎增液湯—吳塘：「補藥之體，做泄藥之用，既可攻實，又可防虛」

十一、**回陽固脫法**：回陽救逆、益氣固脫

臨床：因體質因素或汗、下太過而導致陽虛氣脫

| 方法   | 作用        | 適用證                               | 代表方劑    |
|------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 回陽救逆 | 回陽救脫      | 亡陽虛脫。證見手足厥冷，惡寒倦臥，下利清穀，舌淡苔白，脈象沉微   | 四逆湯及其加減 |
| 益氣固脫 | 補益氣陰，升陽固脫 | 溫病津氣兩傷，氣虛欲脫。證見血壓下降，汗多神倦，氣短而促，脈微氣絕 | 生脈散     |

溫病兼挾證的治療

|     | 病因                                                  | 證候                                                                                          | 治則                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼痰飲 | 痰濕內阻                                                | 病邪流連氣分，三焦氣化失司，而致津液停蓄不化，釀成痰飲。                                                                | 舒展氣機，化痰利濕→溫膽湯                                                                                                     |
|     | 痰熱互結                                                | 為熱邪燔熾，熬煉津液，而成痰濁                                                                             | 1 因痰熱壅於肺胃的，多見咳嗽痰黏而黃，甚或汗出喘促、苔黃脈滑等證<br>2 因熱盛生風，痰濁內阻，風痰入絡的，可見舌強語蹇、口吐涎沫、脈弦滑等證<br>3 因痰火互阻，蒙開心包，竅機不運的，則見神昏譫語或口噤不語、脈滑數之證 |
| 兼食滯 | 1 發病前，所食之物未及消化。以致引起宿食內停。<br>2 病發後，勉強進食，難以運化，以致食滯中阻。 | 胸脘痞悶，吞酸噯腐、惡聞食臭，或心煩不寧、腹滿腸鳴、矢氣頻轉、舌被厚苔、脈沉澀或滑實等                                                 | 兼消食導滯<br>1 偏於上者，宜消食和胃→保和丸<br>2 偏於下者，宜兼導滯通腑→枳實導滯丸之類。                                                               |
| 兼氣鬱 | 情志不遂，或喜怒無常，或憂思過度，氣機因以鬱而不舒。                          | 胸脅苦滿，上氣太息，或脘悶泛惡，脅肋脹痛，脈沈伏或弦澀等                                                                | 於主治方中加入理氣舒鬱之品→桔梗、香附、佛手、青皮、延胡索、川楝子                                                                                 |
| 兼血瘀 | 患者素有瘀傷宿血，如跌仆閃挫之後；或惱怒傷肝，氣滯血凝；或婦女經閉血瘀等；再感溫熱之邪，則       | 胸中滿痛或兩脅刺痛，或少腹結痛，舌色紫暗而捫之潮潤，脈澀等（辨證要點： <b>舌色紫暗潮潤</b> ）<br>葉天士：「熱傳營血，其人素有瘀傷宿血在胸膈中，挾熱而搏，其舌色必紫而暗， | 主治方中佐以活血散瘀之品<br>→桃仁、紅花、赤芍、歸尾<br>若瘀血蓄結下焦，少腹硬滿而痛，小便                                                                 |



|  |          |      |                                                    |
|--|----------|------|----------------------------------------------------|
|  | 為溫病挾瘀之證。 | 捫之濕」 | 自利，大便秘結。神志如狂或發狂的，則須採用 <u>通瘀破結</u> 之法→ <u>桃仁承氣湯</u> |
|--|----------|------|----------------------------------------------------|

## 溫病勞復、食復的治療

| 勞復                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 食復                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、<u>宣解餘邪</u> → 用於挾邪勞復，即<u>瘥後元氣未復，餘邪未盡，因勞致復</u></p> <p>1. <u>邪熱在裏，氣不宣暢</u>：身熱、心煩懊惱，胸中滿悶→ <u>泄熱除煩，行氣寬胸</u> → <u>枳實梔子湯</u></p> <p>2. <u>餘邪留戀，樞機不利</u>：寒熱往來，胸脅苦滿→ <u>和解之法</u> → <u>小柴胡湯</u></p> <p>二、<u>補益虛損</u> → 用於虛證勞復，即<u>瘥後餘邪雖解，但元氣或陰液虧虛，因勞致復</u></p> <p>1. <u>元氣虛弱，因勞復熱</u>：微兼惡寒，四肢倦怠，脈虛，舌潤無苔而胸膈脹悶→ <u>補益元氣</u> → <u>補中益氣湯</u></p> <p>2. <u>汗多畏寒</u> → <u>歸耆建中湯</u></p> <p>3. <u>腎陰虧陰，因勞發熱</u> → <u>加減復脈湯</u></p> <p>4. <u>陰虛又復感外邪</u> → <u>滋陰解表</u> → <u>梔子豉湯</u>加<u>蔥白、薄荷、鮮生地、麥冬</u></p> | <p>病因：溫病熱退之後，餘邪未盡，驟進穀食，脾胃氣弱，不及運化，以致食滯內停，餘邪發作，是為食復</p> <p>證候：多見發熱、煩悶、脘痞、不納、苔厚、脈滑</p> <p>治法：偏於上者 → <u>消食和胃</u> → <u>保和丸</u></p> <p>偏於下者 → <u>兼導滯通腑</u> → <u>枳實導滯丸</u></p> <p>※ 若食復證輕，僅微感飽悶不舒，無發熱等證→ <u>損穀即愈</u></p> <p>※</p> |

## 溫病後遺證的治療：養陰清熱、補氣益血、和血通絡、化痰熄風

| 後遺證       | 病因                 | 治則          | 方藥                                   |
|-----------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 神呆        | 痰熱未淨，清竅失寧所致        | <u>化痰寧神</u> | 菖蒲、鬱金、遠志、茯神、蓮心、山梔、黃芩及至寶丹等            |
| 失語        | 熱邪傷陰，脈絡失和，兼夾痰熱瘀血阻滯 | 養陰活絡，清泄餘熱   | 玄參、麥冬、竹葉、赤芍、地龍等。夾痰加膽星、半夏、竹茹；夾瘀加桃仁、紅儘 |
| 震顫        | 熱邪傷陰，虛風擾動          | 養陰熄風        | 大定風珠                                 |
| 肢體強直或手足拘攣 | 熱邪傷陰，經絡失養          | 養陰和絡        | 三甲復脈湯加減                              |
|           | 風痰入絡，血脈失和          | 祛風活絡        | 蠶蠶、全蝎、地龍、烏梢蛇、白附子、膽星、紅花               |
| 癱瘓        | <u>瘀痰阻絡</u>        |             | 白附子、膽星、當歸、赤芍、紅花、桃仁                   |
|           | <u>濕熱入絡</u>        |             | 蒼朮、苡仁、黃柏、蠶砂                          |
|           | <u>陰傷而脈絡失養</u>     |             | 生地、白芍、龜板、阿膠                          |
|           | <u>病久氣血兩虛，肝腎虧損</u> |             | 熟地、當歸、黃耆、懷牛膝、川斷、何首烏                  |

## 溫病瘥後調理：主要不外補體虛，清餘邪兩方面

| 調理法         | 適應症                                                      | 方劑                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>補益氣血</u> | 溫病瘥後， <u>邪熱雖除而氣血虧損</u> ，證見面色少華，氣弱倦怠，聲顫乏力，語不接續，舌質淡紅，脈虛無力等 | <u>集靈膏</u>                |
| <u>補氣增液</u> | <u>氣液兩虛</u> ，精神萎頓、不饑不食、睡眠不酣、舌乾少津的                        | <u>三才湯</u> 或 <u>薛氏參麥湯</u> |
| <u>清補兼施</u> | <u>氣液雖虛而餘熱未清的</u>                                        | <u>竹葉石膏湯</u>              |
| <u>增液潤腸</u> | 瘥後如 <u>僅胃腸津液未復</u> ，口乾咽燥或唇裂、便結的                          | <u>益胃湯</u> 、 <u>增液湯</u>   |
| <u>芳香醒胃</u> | <u>濕熱證瘥後，餘邪未淨，胃氣失健</u> ，證見胸悶不暢，知饑不食，脈緩等                  | <u>薛氏五汁蘆根湯</u>            |
| <u>健脾化濕</u> | 脾胃虛弱，運化失職，內濕又生，而致飲食不消，四肢無力，大便溏薄，脈形虛弱，舌苔薄白，甚或肢體浮腫的        | <u>參苓白朮散</u>              |