

金匱要略純條文整理

徜徉山林的系圖小精靈

有方條文		
2	瘧	太陽病，其證備，身體強，几几然，脈反沉遲，此為瘧，栝蒌桂枝湯主之。(11)_{101、105、109、110} 太陽病，無汗而小便反少，氣上衝胸，口噤不得語，欲作剛瘧，葛根湯主之。(12)_{104、108、110} 瘧為病，一本瘧字上有剛字。胸滿，口噤，臥不著席，腳攣急，必齮齒，可與大承氣湯。(13)₁₁₀
	濕	濕家身煩疼，可與麻黃加朮湯發其汗為宜，慎不可以火攻之。(20) 寒濕在表_{102、107} 病者一身盡疼，發熱，日晡所劇者，名風濕。此病傷於汗出當風，或久傷取冷所致也。可與麻黃杏仁薏苡甘草湯。(21)風濕在表₁₀₈ 風濕，脈浮身重，汗出惡風者，防己黃耆湯主之。(22) 風濕表虛_{106、107} 傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，脈浮虛而澀者，桂枝附子湯主之；若大便堅，小便自利者，去桂加白朮湯主之。(23)風濕表陽虛_{100、110} 風濕相搏，骨節疼煩掣痛，不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，或身微腫者，甘草附子湯主之。(24)表裡俱虛_{103、109}
	渴	太陽中熱者，渴是也。汗出惡寒，身熱而渴，白虎加人參湯主之。(26)₁₀₆ 太陽中渴，身熱疼重，而脈微弱，此以夏月傷冷水，水行皮中所致也，一物瓜蒂湯主之。(27)
3	百合	百合病，不經吐、下、發汗，病形如初者，百合地黃湯主之。(5)_{102、103、104、108} 百合病，發汗後者，百合知母湯主之。(2)_{104、108} 百合病，下之後者，滑石代赭湯主之。(3)_{104、110} 百合病，吐之後者，用後方（百合雞子湯）主之。(4)_{103、104、108} 百合病，一月不解，變成渴者，百合洗方主之。(6)₁₀₁ 百合病，渴不差者，用後方（栝蒌牡蠣散）主之。(7)₁₀₈ 百合病，變發熱者，一作發寒熱。百合滑石散主之。(8)_{104、108}
	狐惑	蝕於上部則聲啞一作嘎，甘草瀉心湯主之。(10) 蝕於下部則咽乾，苦參湯洗之。(11)₁₀₆ 蝕於肛者，雄黃熏之。(12) 病者脈數，無熱，微煩，默默但欲臥，汗出，初得之三、四日，目赤如鳩眼；七、八日，目四眦一本此有黃字黑。若能食者，膿已成也，赤豆當歸散主之。(13)_{106、108}
	陰陽毒	陽毒之為病，面赤斑斑如錦紋，咽喉痛，唾膿血，五日可治，七日不可治，升麻鱉甲湯主之。(14) 陰毒之為病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。五日可治，七日不可治，升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之。(15)₁₀₃
4		溫瘧者，其脈如平，身無寒但熱，骨節疼煩，時嘔，白虎加桂枝湯主之。(4)₁₀₉ 瘧多寒者，名曰牝瘧，蜀漆散主之。(5) 此結為癥瘕，名曰瘧母，急治之，宜鱉甲煎丸。(2)
5		諸肢節疼痛，身體魁羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐，桂枝芍藥知母湯主之。(8)_{100、101、110、111} 病歷節不可屈伸，疼痛，烏頭湯主之。(10)_{102、106、110}
6	血痹	血痹陰陽俱微，寸口關上微，尺中小緊，外證身體不仁，如風痺狀，黃耆桂枝五物湯主之。(2)_{103、110}
	陽	虛勞腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味腎氣丸主之。(15)₁₀₉
	虛	虛勞諸不足，風氣百疾，薯蕷丸主之。(16)_{100、105}

	陰虛	虛勞虛煩不得眠，酸棗仁湯主之。(17)_{106、109} 五勞虛極羸瘦，腹滿不能飲食，食傷、憂傷、飲傷、房室傷、飢傷、勞傷、經絡營衛氣傷，內有乾血，肌膚甲錯，兩目黯黑，緩中補虛，大黃廔蟲丸主之。(18)₁₀₇
		虛勞裏急，悸、衄，腹中痛，夢失精，四肢痠疼，手足煩熱，咽乾口燥，小建中湯主之。(13)₁₀₂ 虛勞裏急、諸不足，黃耆建中湯主之。(14)₁₁₀ 夫失精家少腹弦急，陰頭寒，目眩一作目眶痛，髮落，脈極虛芤遲，為清穀亡血，失精。脈得諸芤動微緊，男子失精，女子夢交，桂枝加龍骨牡蠣湯主之。(8)₁₀₂
7	肺痿	肺痿吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遺尿，小便數。所以然者，以上虛不能制下故也。此為肺中冷，必眩，多涎唾，甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者，屬消渴。(5)₁₀₆ 大逆上氣，咽喉不利，止逆下氣者，麥門冬湯主之。(10)₁₀₅
	肺癰	肺癰，喘不得臥，葶藶大棗瀉肺湯主之。(11) 肺癰胸滿脹，一身面目浮腫，鼻塞涕出，不聞香臭酸辛，咳逆上氣，喘鳴迫塞，葶藶大棗瀉肺湯主之。(11)_{膿未成}₁₀₀ 咳而胸滿，振寒脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者，為肺癰，桔梗湯主之。(12)_{膿已成}₁₀₆
	咳嗽上氣	咳而上氣，喉中水雞聲，射干麻黃湯主之。(6) 肺經寒_{104、106、110、111} 咳逆上氣，時時吐濁，但坐不得眠，皂莢丸主之。(7) 痰氣為病 咳而上氣，此為肺脹，其人喘，目如脫狀，脈浮大者，越婢加半夏湯主之。(13) 氣逆肺脹_{101、106、109} 上氣喘而躁者，屬肺脹，欲作風水，發汗則愈。(4) 風水肺脹 肺脹，咳而上氣，煩躁而喘，脈浮者，心下有水，小青龍加石膏湯主之。(14) 水氣肺脹_{105、109} 咳而脈浮者，厚朴麻黃湯主之。(8) 風寒病外_{100、108} 脈沉者，澤漆湯主之。(9) 痰飲病內₁₀₈
8		奔豚氣上衝胸，腹痛，往來寒熱，奔豚湯主之。(2)_{100、101、104} 發汗後，燒鍼令其汗，鍼處被寒，核起而赤者，必發奔豚，氣從少腹上至心，灸其核上各一壯，與桂枝加桂湯主之。(3)_{100、109、111} 發汗後，臍下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大棗湯主之。(4)_{105、109、111}
		胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短氣，寸口脈沉而遲，關上小緊數，栝蒌薤白白酒湯主之。(3)_{100、103、104、106x2} 胸痹不得臥，心痛徹背者，栝蒌薤白半夏湯主之。(4)_{100、102、103、111} 心痛徹背，背痛徹心，烏頭赤石脂丸主之。(9)陰寒痼結_{101x2、102、103、107、111} 胸痹緩急者，薏苡附子散主之。(7)_{102、106} 胸痹，胸中氣塞，短氣，茯苓杏仁甘草湯主之；橘枳薑湯亦主之。(6)_{103、104、106} 胸痹心中痞，留氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心，枳實薤白桂枝湯主之；人參湯亦主之。(5)_{106、109、111x2} 心中痞，諸逆，心懸痛，桂枝生薑枳實湯主之。(8)_{102、105、111}
10	腹滿	病腹滿，發熱十日，脈浮而數，飲食如故，厚朴七物湯主之。(9)腹滿兼表證_{106、110} 腹中寒氣，雷鳴切痛，胸脅逆滿，嘔吐，附子粳米湯主之。(10)脾胃虛寒水濕內停_{100、103、104、107} 痛而閉者，厚朴三物湯主之。(11)脹重於積 腹滿不減，減不足言，當須下之，宜大承氣湯。(13)積與脹俱重_{108、110} 按之心下滿痛者，此為實也，當下之，宜大柴胡湯。(12)少陽陽明 腹滿痛 心胸中大寒痛，嘔不能飲食，腹中寒，上衝皮起，出見有頭足，上下痛而不可觸近，大

		建中湯主之。(14)脾胃虛寒 脅下偏痛，發熱，其脈緊弦，此寒也，以溫藥下之，宜大黃附子湯。(15)寒實內結¹¹¹ 寒氣厥逆，赤丸主之。(16)脾腎虛寒水飲上逆¹⁰¹
	寒 疝	寒疝繞臍痛，若發則白汗出，手足厥冷，其脈沉緊者，大烏頭煎主之。(17)¹⁰⁴ 寒疝腹中痛，及脅痛裏急者，當歸生薑羊肉湯主之。(18)^{104、110} 寒疝腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺諸藥不能治，抵當烏頭桂枝湯主之。(19)¹⁰⁴
	宿 食	宿食在上脘，當吐之，宜瓜蒂散。(24)宿食在上^{105、108} 寸口脈浮而大，按之反澀，尺中亦微而澀，故知有宿食，大承氣湯主之。(21)宿食在下 脈數而滑者，實也，此有宿食，下之愈，宜大承氣湯。(22) 下利不欲食者，有宿食也，當下之，宜大承氣湯。(23)^{105、108} 寸口脈浮而大，按之反澀，尺中亦微而澀，故知有宿食，大承氣湯主之。(21)
11		肝著，其人常欲蹈其胸上，先未苦時，但欲飲熱，旋覆花湯主之。(7)¹⁰⁰ 趺陽脈浮而澀，浮則胃氣強，澀則小便數，浮澀相搏，大便則堅，其脾為約，麻子仁丸主之。(15)¹⁰⁴ 腎著之病，其人身體重，腰中冷，如坐水中，形如水狀，反不渴，小便自利，飲食如故，病屬下焦，身勞汗出，衣一作表裏冷濕，久久得之，腰以下冷痛，腹重如帶五千錢，甘薑苓朮湯主之。(16)¹⁰⁶
	痰 飲	病者脈伏，其人欲自利，利反快，雖利，心下續堅滿，此為留飲欲去故也，甘遂半夏湯主之。 (18)¹⁰⁴ 先渴後嘔，為水停心下，此屬飲家，小半夏茯苓湯主之。(41)胃中停水¹⁰⁴ 卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，小半夏加茯苓湯主之。(30)膈間有水^{102、110} 假令瘦人臍下有悸，吐涎沫而癰眩，此水也，五苓散主之。(31)水停臍下^{102、103、107} 夫短氣有微飲，當從小便去之，苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。(17)短氣有逆^{104、111} 心下有痰飲，胸脅支滿，目眩。苓桂朮甘湯主之。(16)脾陽虛不能行水^{107、109、111} 腹滿，口舌乾燥，此腸間有水氣，己椒藶黃丸主之。(29)腸間有水飲^{102、103、108}
	懸 飲	病懸飲者，十棗湯主之。(22)^{100、111}
12	溢 飲	病溢飲者，當發其汗，大青龍湯主之；小青龍湯亦主之。(23)¹⁰⁶
★	支 飲	嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，心下有支飲故也，小半夏湯主之。(28)^{105、110} 支飲胸滿者，厚朴大黃湯主之。(26)¹⁰² 支飲不得息，葶藶大棗瀉肺湯主之。(27) 膈間支飲，其人喘滿，心下痞堅，面色黧黑，其脈沉緊，得之數十日，醫吐下之不愈，木防己湯 主之。虛者即愈，實者三日復發，後與不愈者，宜木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。(24)¹¹⁰ 心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉湯主之。(25)^{102x2、104、106x2、111} 咳家其脈弦，為有水。十棗湯主之。(32) 夫有支飲家，咳煩胸中痛者，不卒死，至一百日或一歲，宜十棗湯。(33) 咳逆倚息不得臥，小青龍湯主之。(35) 青龍湯下已，多唾口燥，寸脈沉，尺脈微，手足厥逆，氣從小腹上衝胸咽，手足痺，其面翕熱如 醉狀，因復下流陰股，小便難，時復冒者，與茯苓桂枝五味甘草湯，治其氣衝。(36)^{101、105} 衝氣即低，而反更咳、胸滿者，用桂苓五味甘草湯去桂加乾薑、細辛，以治其咳滿。(37)¹⁰¹
13		渴欲飲水，口乾舌燥者，白虎加人參湯主之。(12)^{103、104、111} 渴欲飲水不止者，文蛤散主之。(6)¹¹¹ 男子消渴，小便反多，以飲一斗，小便一斗，腎氣丸主之。(3)¹¹¹

		脈浮，小便不利，微熱消渴者，宜利小便發汗，五苓散主之。(4)_{103、111} 渴欲飲水，水入則吐者，名曰水逆，五苓散主之。(5) 脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利者，豬苓湯主之。(13)_{105、106、108} 小便不利者，有水氣，其人若渴，栝蒌瞿麥丸主之。(10)_{100、101、103} 小便不利，蒲灰散主之，滑石白魚散、茯苓戎鹽湯并主之。(11)₁₀₃
14	風水	風水，脈浮身重，汗出惡風者，防己黃耆湯主之。腹痛加芍藥。(22)_{103、111} 風水惡風，一身悉腫，脈浮不渴，續自汗出，無大熱，越婢湯主之。(23)(惡風者加附子)_{102、111} 水之為病，其脈沉小，屬少陰；浮者為風，無水虛脹者為氣。水，發其汗即已。脈沉者宜麻黃附子湯；浮者宜杏子湯。(26)₁₁₁
	皮水	皮水為病，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動者，防己茯苓湯主之。(24)_{102、108、109、110} 厥而皮水者，蒲灰散主之。(27) 裏水，越婢加朮湯主之；甘草麻黃湯亦主之。(25)裏水應作「皮水」₁₁₁ 裏水者，一身面目黃腫，其脈沉，小便不利，故令病水。假如小便自利，此亡津液，故令渴也。越婢加朮湯主之。(5)₁₀₂
	黃汗	黃汗以汗出入水中浴，水從汗孔入得之，宜芍藥桂枝酒湯主之。(28) 若身重，汗出已輒輕者，久久必身瞶，瞶即胸中痛，又從腰以上必汗出，下無汗，腰髀弛痛，如有物在皮中狀，劇者不能食，身疼重，煩躁，小便不利，此為黃汗，桂枝加黃耆湯主之。(29)
	氣分	心下堅，大如盤，邊如旋盤，水飲所作，枳朮湯主之。(32)_{103、110} 氣分，心下堅，大如盤，邊如旋杯，水飲所作，桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之。(31)_{102、103}
15		穀疸之為病，寒熱不食，食即頭眩，心胸不安，久久發黃為穀疸，茵陳蒿湯主之。(13)_{101、106、111} 黃家日晡所發熱，而反惡寒，此為女勞得之；膀胱急，少腹滿、身盡黃，額上黑，足下熱，因作黑疸，其腹脹如水狀，大便必黑，時澹，此女勞之病，非水也。腹滿者難治。硝石礬石散主之。(14)_{104x2、106} 男子黃，小便自利，當與虛勞小建中湯。(22) 酒黃疸，心中懊懣或熱痛，梔子大黃湯主之。(15)_{101、102、104、106、107、108、109} 諸病黃家，但利其小便；假令脈浮，當以汗解之，宜桂枝加黃耆湯主之。方見水氣病中。(16)_{108、111} 諸黃，腹痛而嘔者，宜柴胡湯。必小柴胡湯，方見嘔吐中。(21)₁₀₈ 黃疸腹滿，小便不利而赤，自汗出，此為表和裏實，當下之，宜大黃硝石湯。(19)火劫_{101、102、104} 黃疸病，茵陳五苓散主之。一本云茵陳湯及五苓散并主之。(18)濕熱₁₁₁ 黃疸病，小便色不變，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦。噦者，小半夏湯主之。(20)寒濕₁₀₈ 諸黃，豬膏髮煎主之。(17)
16	驚悸	火邪者，桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。(12)₁₀₁ 心下悸者，半夏麻黃丸主之。(13)
	吐血	吐血不止者，柏葉湯主之。(14) 心氣不足，吐血、衄血，瀉心湯主之。(17)
	下血	下血，先便後血，此遠血也，黃土湯主之。(15)_{102、109} 下血，先血後便，此近血也，赤小豆當歸散主之。(16)₁₀₁
17★	嘔吐	嘔而胸滿者，茱萸湯主之。(8) 乾嘔，吐涎沫，頭痛者，茱萸湯主之。(9)_{103、106、110} 乾嘔，吐逆，吐涎沫，半夏乾薑散主之。(20)_{103、106、107、111} 胃反嘔吐者，大半夏湯主之。(16)_{100、107、110} 嘔而脈弱，小便復利，身有微熱，見厥者，難治，四逆湯主之。(14)_{100、109、110}

		食已即吐者，大黃甘草湯主之。(17)_{109、111} 嘔而發熱者，小柴胡湯主之。(15)₁₀₀ 乾嘔而利者，黃芩加半夏生薑湯主之。(11)_{103、110} 吐後，渴欲得水而貪飲者，文蛤湯主之。兼主微風、脈緊、頭痛。(19) 嘔而腸鳴，心下痞者，半夏瀉心湯主之。(10)₁₁₁ 諸嘔吐，穀不得下者，小半夏湯主之。(12)_{107、110} 病人胸中似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，徹心中憤憤然無奈者，生薑半夏湯主之。(21)₁₀₇ 嘔吐而病在膈上，後思水者，解，急與之。思水者，猪苓散主之。(13)_{101、104} 胃反，吐而渴欲飲水者，茯苓澤瀉湯主之。(18)_{100x2、105、111}
	噦	乾嘔、噦，若手足厥者，橘皮湯主之。(22)_{110、111} 噦逆者，橘皮竹茹湯主之。(23)_{109、110、111}
	下利	下利腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻其表。溫裏宜四逆湯，攻表宜桂枝湯。(36)₁₁₁ 下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之。(45)_{103、105、107} 下利，三部脈皆平，按之心下堅者，急下之，宜大承氣湯。(37)_{108、111x3} 下利脈遲而滑者、實也、利未欲止，急下之，宜大承氣湯。(38)_{111x2} 下利脈反滑者，當有所去，下乃愈，宜大承氣湯。(39)₁₁₁ 下利譫語者，有燥屎也，小承氣湯主之。(41) 氣利，訶黎勒散主之。(47)₁₀₃ 下利已差，至其年月日時復發者，以病不盡故也。當下之，宜大承氣湯。(40)_{105、111x2} 熱利下重者，白頭翁湯主之。(43)_{103、105} 下利便膿血者，桃花湯主之。(42)_{103、105} 下利後更煩，按之心下濡者，為虛煩也，梔子豉湯主之。(44)₁₀₅ 下利肺痛，紫參湯主之。(46)
18		腸癰者，少腹腫痞，按之即痛如淋，小便自調，時時發熱，自汗出，復惡寒。其脈遲緊者，膿未成，可下之，當有血。脈洪數者，膿已成，不可下也，大黃牡丹湯主之。(4)₁₀₀ 腸癰之為病，其身甲錯，腹皮急，按之濡，如腫狀，腹無積聚，身無熱，脈數，此為腸內有癰膿，薏苡附子敗醬散主之。(3)_{105、106} 浸淫瘡，黃連粉主之。(8)₁₀₆ 病金瘡，王不留行散主之。(6)₁₀₉
19		病人常以手指臂腫動，此人身體瞶瞶者，藜蘆甘草湯主之。(2) 轉筋入腹者，雞屎白散主之。(3) 陰狐疝氣者，偏有小大，時時上下，蜘蛛散主之。(4) 蝮蟲之為病，令人吐涎，心痛發作有時，毒藥不止，甘草粉蜜湯主之。(6) 蝮厥者，烏梅丸主之。(8)₁₀₉
20		婦人得平脈，陰脈小弱，其人渴，不能食，無寒熱，名妊娠，桂枝湯主之。(1) 血不止者，其癥不去故也，當下其癥，桂枝茯苓丸主之。(2) 婦人懷妊六七月，脈弦發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒者，少腹如扇，所以然者，子臟開故也，當以附子湯溫其臟。方未見(3)₁₀₉ 婦人有漏下者，有半產後因續下血都不絕者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，為胞阻，膠艾湯主之。(4)_{102、106x2} 婦人懷妊，腹中疝痛，當歸芍藥散主之。(5)₁₀₁ 妊娠嘔吐不止，乾薑人參半夏丸主之。(6)_{106、109}

		妊娠，小便難，飲食如故，當歸貝母苦參丸主之。(7)_{102、109} 妊娠有水氣，身重，小便不利，洒淅惡寒，起即頭眩，葵子茯苓散主之。(8)_{101、108、109} 婦人妊娠，宜常服當歸散主之。(9)_{104、107} 妊娠養胎，白朮散主之。(10)_{103、104、105、109}
21		產婦鬱冒，其脈微弱，嘔不能食，大便反堅，但頭汗出。大便堅，嘔不能食，小柴胡湯主之。(2) 產後腹中疝痛，當歸生薑羊肉湯主之，并治腹中寒疝，虛勞不足。(4)_{101、106、107} 產後腹痛，煩滿不得臥，枳實芍藥散主之。(5)_{102、107、108} 產婦腹痛，法當以枳實芍藥散，假令不愈者，此為腹中有瘀血著臍下，宜下瘀血湯主之；亦主經水不利。(6)_{102x2、106、107} 產後七八日，無太陽證，少腹堅痛，此惡露不盡；不大便，煩躁發熱、切脈微實，再倍發熱，日晡時煩躁者，不食，食則譫語，至夜即愈，宜大承氣湯主之。熱在裏，結在膀胱也。(7)₁₀₇ 產後風，續之數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下悶，乾嘔，汗出，雖久，陽旦證續在耳，可與陽旦湯。(8)₁₀₉ 產後中風，發熱，面正赤，喘而頭痛，竹葉湯主之。(9)_{100、101、104} 婦人乳中虛，煩亂嘔逆，安中益氣，竹皮大丸主之。(10)₁₀₁ 產後下利虛極，白頭翁加甘草阿膠湯主之。(11)
22		婦人中風，七八日續來寒熱，發作有時，經水適斷，此為熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。(1) 婦人咽中如有炙臠，半夏厚朴湯主之。(5)₁₀₆ 婦人臟躁，喜悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸，甘麥大棗湯主之。(6)₁₀₉ 婦人吐涎沫，醫反下之，心下即痞，當先治其吐涎沫，小青龍湯主之；涎沫止，乃治痞，瀉心湯主之。(7)_{105、107} 婦人年五十所，病下利數十日不止，暮即發熱，少腹裏急，腹滿，手掌煩熱，唇口乾燥，此病屬帶下，瘀血在少腹不去。當以溫經湯主之。(9)₁₀₈ 寸口脈弦而大，弦則為減，大則為芤，減則為寒，芤則為虛，寒虛相搏，此名曰革，婦人則半產漏下，旋覆花湯主之。(11) 帶下經水不利，少腹滿痛，經一月再見者，土瓜根散主之。(10) 婦人少腹滿如敦狀，小便微難而不渴，生後者，此為水與血俱結血室也，大黃甘遂湯主之。(13)₁₀₅ 婦人經水不利下，抵當湯主之。亦治男子膀胱滿急有瘀血者。(14) 婦人經水閉不利，臟堅癖不止，中有乾血，下白物，礬石丸主之。(15) 蛇床子散方，溫陰中坐藥。(20)₁₀₄ 婦人六十二種風，及腹中血氣刺痛，紅藍花酒主之。(16) 婦人腹中諸疾痛，當歸芍藥散主之。(17)₁₀₈ 婦人腹中痛，小建中湯主之。(18) 婦人病飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息者，此名轉胞不得溺也，但利小便則愈，宜腎氣丸主之(19) 少陰脈滑而數者，陰中即生瘡，陰中蝕瘡爛者，狼牙湯洗之。(21) 胃氣下泄，陰吹而正暄，此穀氣之實也，膏髮煎導之。(22)
其他常考條文		
5		邪在於絡，肌膚不仁；邪在於經，即重不勝；邪入於腑，即不識人；邪入於臟，舌即難言，口吐涎。(2)_{106、108}
11	中風	肺中風者，口燥而喘，身運而重，冒而腫脹。(1) 肝中風者，頭目瞤，兩脅痛，行常偃，令人嗜甘。(4)₁₁₁

		心中風者，翕翕發熱，不能起，心中飢，食即嘔吐。(8)₁₀₈ 脾中風者，翕翕發熱，形如醉人，腹中煩重，皮目瞶瞶而短氣。(13)₁₀₈
	中寒	肺中寒，吐濁涕。(2) 肝中寒，兩臂不舉，舌本燥，喜太息，胸中痛，不得轉側，食則吐而汗出也。(5)₁₁₁ 心中寒，其人苦病心如噉蒜狀，劇者心痛徹背，背痛徹心，譬如蠱注。其脈浮者，自吐乃愈。(9)
	死脈	肺死臟，浮之虛，按之弱如蔥葉，下無根者，死。(3)₁₀₆ 肝死臟，浮之弱，按之如索不來，或曲如蛇行者，死。(6)_{106、111} 心死臟，浮之實如麻豆，按之益躁急者，死。(11)₁₀₆ 脾死臟，浮之大堅，按之如覆盂潔潔，狀如搖者，死。(14)₁₀₆ 腎死臟，浮之堅，按之亂如轉丸，益下入尺中者，死。(17)
	寒熱	熱在上焦者，因咳為肺痿 熱在中焦者，則為堅； 熱在下焦者，則尿血，亦令淋秘不通。 大腸有寒者，多驚澹；有熱者，便腸垢。 小腸有寒者，其人下重便血；有熱者，必痔。(19)₁₀₉
12	四飲	其人素盛今瘦，水走腸間，瀝瀝有聲，謂之痰飲； 飲後水流在脅下，咳唾引痛，謂之懸飲； 飲水流行，歸於四肢，當汗出而不汗出，身體疼重，謂之溢飲； 咳逆倚息，短氣不得臥，其形如腫，謂之支飲。(2)_{103、104、110}
	五臟飲	水在心，心下堅築，短氣，惡水不欲飲。(3)_{104、106} 水在肺，吐涎沫，欲飲水。(4)_{102、104、105} 水在脾，少氣身重。(5)₁₀₄ 水在肝，脅下支滿，噯而痛。(6)₁₀₄ 水在腎，心下悸。(7)
14	五水	風水其脈自浮，外證骨節疼痛，惡風。(1)_{103、105、106、109} 寸口脈沉滑者，中有水氣，面目腫大，有熱，名曰風水。視人之目窠上微擁，如蠶新臥起狀，其頸脈動，時時咳，按其手足上，陷而不起者。(3)_{103、107} 皮水其脈亦浮，外證胛腫，按之沒指，不惡風，其腹如鼓，不渴，當發其汗。(1)_{103、107、109} 正水其脈沉遲，外證自喘。(1)_{103、109} 石水其脈自沉，外證腹滿不喘。(1)_{103、105、109} 黃汗其脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫，久不愈，必致癰膿。(1)_{100、104} 不惡風者，小便通利，上焦有寒，其口多涎，此為黃汗。(2) 黃汗之為病，身體腫一作重。發熱汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，色正黃如柏汁，脈自沉。(28)₁₁₀ 黃汗之病，兩脛自冷；假令發熱，此屬歷節。食已汗出，又身常暮盜汗出者，此勞氣也。(29)
	五臟水	心水者，其身重而少氣，不得臥，煩而躁，其人陰腫。(13) 肝水者，其腹大，不能自轉側，脅下腹痛，時時津液微生，小便續通。(14) 肺水者，其身腫，小便難，時時鴨塘。(15)₁₀₂ 脾水者，其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少氣，小便難。(16)₁₀₈ 腎水者，其腹大，臍腫腰痛，不得溺，陰下濕如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。(17)