

Übungsklausur zur Prüfungsvorbereitung

Statistik und Data Science I · Lernpaket

Probeklausur

Datum: _____ **Übungsklausur 5 (nicht offiziell)**

Prüfungsfach: **STATISTIK (TEIL A)** (SoSe 2026)

Themensteller*innen: Übungsaufgaben im Stil der Altklausur

Kandidat*in

--	--	--	--	--	--	--	--

Matrikel-Nr.: _____

Fachrichtung:

Raum:

Platz:

Bitte beachten Sie:

- Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikelnummer.
- Schreiben Sie leserlich.
- Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur.
- **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**

Zugelassene Hilfsmittel:

- Zugelassener Taschenrechner
- Schreibutensilien
- Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt, das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Seitenumfang: **20 + Deckblatt + Hinweise**

Anzahl der Aufgaben: **8**

Gesamtpunktzahl: **75**

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle:

Formelblatt: ☐ handschriftlich ☐ Kopie ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis			
Punktzahl (1. Durchlauf)	Änderungen	Punktzahl (Endergebnis)	Note

Hinweise

Allgemeines:

- Es darf nur mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben und gezeichnet werden. Mit Bleistift geschriebene sowie jegliche in grün oder rot verfasste Angaben werden grundsätzlich ignoriert und **nicht gewertet**.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Beachten Sie, dass im Rahmen dieser Klausur die Dezimalpunkt-Notation – d. h. ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen – verwendet wird.

Form der anzugebenden Lösung:

- **Vereinfachen Sie alle Ergebnisse**, es sei denn, dies wird explizit nicht gefordert.
- Wenn Ihre Lösungen reelle, nicht ganze Zahlen (d.h. Antwort $\in \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\}$) beinhalten, verwenden Sie **vollständig gekürzte Brüche** oder **auf drei Nachkommastellen kaufmännisch gerundete Dezimalzahlen**. Runden Sie dabei Zwischenergebnisse auf mindestens vier Nachkommastellen. Ausnahmen hierfür sind, wenn in der Aufgabe ausdrücklich etwas anderes verlangt wird oder wenn sich Ihre Antwort als gängige Funktion von natürlichen Zahlen darstellen lässt, z.B. $\log 4$ oder $\sqrt{2}$. Im Falle von Letzterem werden keine gerundeten Ergebnisse benötigt.
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis bzw. Ihre Endergebnisse in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden explizit aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Sofern Ihrer Meinung nach keine Lösung existiert oder die Aufgabenstellung widersprüchlich oder unzureichend ist, schreiben Sie **nicht lösbar** ins Lösungskästchen sowie **eine Begründung** in das entsprechende Feld am Ende der Klausur.

Anzahl der anzugebenden Lösungen:

- Lösungskästchen dürfen **nur eine eindeutige Antwort** enthalten. Bei Aufgaben, bei denen mehrere Lösungen ermittelt werden, aber nur ein Lösungskästchen steht, müssen alle Lösungen in diesem Kästchen angegeben werden.
- Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an. Streichen Sie vorherige falsche Angaben, wenn Sie Änderungen oder Ergänzungen in Ihrer Lösung vornehmen.

Platzierung der Lösung:

- Alle Lösungen und Lösungswege sollten nur in entsprechend gekennzeichneten Lösungskästchen angegeben werden. Wenn ein Kästchen für einen Lösungsweg nicht ausreicht, benutzen Sie die Ränder oder Rückseiten und kennzeichnen Sie eindeutig, was bewertet werden soll.
- Alles, was außerhalb der Lösungskästchen geschrieben wird, wird bei der Korrektur **nicht** berücksichtigt, es sei denn, es wurde durch Sie im Sinne des vorigen Punktes eindeutig gekennzeichnet.

Nebenrechnungen:

- Für Nebenrechnungen nutzen Sie bitte freie Flächen außerhalb der Kästchen oder die Rückseiten. Die Nebenrechnungen werden nicht mitkorrigiert.

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Ron möchte für seine Hausarbeit untersuchen, mit welchem Verkehrsmittel die Studierenden seines Jahrgangs zur Universität kommen. Er befragt zufällig 12 Studierende. Dabei steht eine **1** für Bus, eine **2** für Fahrrad, eine **3** für Auto und eine **4** für „zu Fuß“.

```
1 > sort(Verkehrsmittel)
2 [1] 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4
```

- (a) Geben Sie das Skalenniveau des Merkmals „Verkehrsmittel“ an und ob es sich um ein diskretes oder stetiges Merkmal handelt.

- (b) Berechnen Sie die folgenden Lage- und Streuungsparameter der Variable `Verkehrsmittel`. Falls Sie der Meinung sind, dass ein Parameter nicht sinnvoll angegeben werden kann, **begründen Sie kurz in einem Satz**. Sie können den obigen R-Output benutzen.

 $x_{mod} =$ _____ $x_{med} =$ _____ $\bar{x} =$ _____

$$s_x^2 =$$

--

erreichte Punkte

Aufgabe 2 (14 Punkte)

Die Fachschaft möchte das Angebot an Semestertickets verbessern. Dazu erfasst sie bei 10 zufällig ausgewählten Studierenden die Fahrtzeit zur Uni X in Minuten sowie den Wohnort Y (Göttingen (GÖ) oder Umland (UL)).


Fahrtzeit in min	x_i	12	25	12	40	18	25	12	55	18	25
Wohnort	y_i	GÖ	UL	GÖ	UL	GÖ	GÖ	GÖ	UL	UL	UL

Hinweis: $\sum_{i=1}^{10} x_i = 242$; $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 7580$


- (a) Geben Sie für X und Y an, ob ein diskretes oder stetiges Merkmal vorliegt! Welches Skalenniveau liegt jeweils zugrunde? (4P)

X :


Y:

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for a drawing or answer. It is positioned to the right of the label 'Y:'. Below the box, there is a horizontal line extending to the right edge of the page.

(b) Zeichnen Sie die empirische Verteilungsfunktion für X ! (6P)



(c) Klassieren Sie die Fahrtzeit in die Klassen $K_1 = [0, 20)$, $K_2 = [20, 40)$ und $K_3 = [40, 60]$ und bestimmen Sie den Mittelwert für die klassierten Daten! (4P)



erreichte Punkte

Aufgabe 3 (11 Punkte)

Luna überlegt, ob sich für sie ein Premium-Abo bei einem Streamingdienst lohnt. Aus einer Nutzerumfrage weiß sie, dass 40 % aller Nutzer*innen ein Premium-Abo haben.

Die Nutzer*innen lassen sich nach ihrer hauptsächlichen Nutzung in drei (sich gegenseitig ausschließende) Gruppen einteilen:

1. Hauptsächlich Serien
2. Hauptsächlich Filme
3. Hauptsächlich Dokumentationen

Zunächst betrachtet sie die Premium-Nutzer*innen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % schaut eine Premium-Nutzerin bzw. ein Premium-Nutzer hauptsächlich Serien, mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % hauptsächlich Filme.

Danach betrachtet sie auch die Nutzer*innen ohne Premium-Abo: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % schaut eine Person ohne Premium-Abo hauptsächlich Serien und mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % hauptsächlich Filme.

(a) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten. (7P)

$$P(\text{„kein Premium“}) =$$

$$P(\text{„Dokus“} \mid \text{„Premium“}) =$$

$$P(\text{„Dokus“} \mid \text{„kein Premium“}) =$$

Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person hauptsächlich Dokumentationen schaut!

- (b) Eine zufällig ausgewählte Person schaut hauptsächlich Filme. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Premium-Abo hat? Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (2P)

- (c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter acht zufällig und unabhängig ausgewählten Nutzer*innen mindestens eine Person mit Premium-Abo befindet? **Vereinfachen Sie hierbei so weit wie möglich!** (2P)

erreichte Punkte

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Ihnen sei folgender Ergebnisraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ eines Laplace-Experiments gegeben. Außerdem seien die Mengen $A = \{2, 4, 5, 8\}$, $B = \{1, 2, 5, 9\}$ bekannt.

- (a) Berechnen Sie die folgenden Mächtigkeiten (Anzahl an Elementen in einer Menge).

$$|\bar{A} \cap B| =$$

$$|A \cup \bar{B}| =$$

- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, wenn Sie wissen, dass A **nicht** eingetreten ist **und** tragen Sie links die korrekte Notation für die gesuchte Wahrscheinlichkeit in die beiden Lücken ein.

$$P(\quad | \quad) =$$

erreichte Punkte

Aufgabe 5 (11 Punkte)

Eine Tutorin vermutet einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Lernstunden pro Woche (X) und der Anzahl der Fehler im wöchentlichen Testat (Y). Die Grundlage ihrer Beobachtungen bilden 6 Studierende:

Studierende	ν	1	2	3	4	5	6
Lernstunden	x_ν	1	4	6	3	5	5
Fehler im Testat	y_ν	10	6	3	8	5	4

- (a) Berechnen Sie die empirische Varianz der Lernstunden. Geben Sie Ihren Lösungsweg an: (2 P)

$s_x^2 =$


- (b) Ermitteln Sie den Korrelationskoeffizienten r_{xy} aus den Werten der obigen Tabelle. Verwenden Sie im Folgenden für die Berechnung die hier angegebenen Werte:

$$s_y^2 = 5.6667, \quad s_x^2 = 2.6667, \quad \bar{y} = 6 \quad \text{und} \quad \sum_{\nu=1}^6 (x_\nu \cdot y_\nu) = 121$$


Geben Sie Ihren Lösungsweg an: (3 P)

Interpretieren Sie den berechneten Wert. Wenn Sie den Wert nicht berechnen konnten, interpretieren Sie $r_{xy} = -0.5$. (2 P)

- (c) Die Tutorin behauptet, dass der Korrelationskoeffizient beweist, dass mehr Lernstunden zu weniger Fehlern *führen*. Stimmen Sie dieser Aussage zu? Begründen Sie in 1–2 Sätzen. (2 P)



- (d) Skizzieren Sie ein mögliches Streudiagramm, bei dem ein *perfekter, aber nicht linearer* Zusammenhang zwischen X und Y besteht und trotzdem $r_{xy} = 0$ gilt. (2 P)



erreichte Punkte

Aufgabe 6 (10 Punkte)

Sie überlegen, ein gebrauchtes E-Bike zu kaufen, und betrachten die Zufallsvariable X , wobei

X : Monate bis zum Defekt des Akkus.

Gehen Sie davon aus, dass X Weibull-verteilt ist mit zunächst unbekannten Parametern λ und r . Für $x \geq 0$ ist die Dichte somit gegeben durch

$$f(x; \lambda, r) = r\lambda(\lambda x)^{r-1} \exp(-(\lambda x)^r)$$

und die Verteilungsfunktion durch

$$F(x; \lambda, r) = 1 - \exp(-(\lambda x)^r)$$

Nehmen Sie im Folgenden an, dass $r = 2$. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, wobei die X_i identisch und unabhängig verteilt sind.

- (a) Stellen Sie hierfür zunächst die Log-Likelihood auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an (vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich!): (4P)

- (b) Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. (3P)

- (c) Prüfen Sie auch die hinreichende Bedingung bzw. die Bedingung zweiter Ordnung! (2P)

- (d) Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 2, 1)$. (1P)

 $\hat{\lambda} =$

erreichte Punkte

Aufgabe 7 (5 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \frac{\theta}{3}$ mit $\theta \in \mathbb{R}$. Nun ziehen Sie eine n -fache, unabhängige Zufallsstichprobe $\{X_1, \dots, X_n\}$ dieser Zufallsvariablen.

Testen Sie, ob der Schätzer

$$\hat{\theta} = \frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=2}^n X_i} + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

ein unverzerrter Schätzer für θ ist.

erreichte Punkte

Aufgabe 8 (8 Punkte)

In der Mensa stehen zwei Kaffeeautomaten A und B, die laut Hersteller jeweils 200 ml pro Becher abfüllen sollen. Studierende vermuten, dass Automat A im Mittel *mehr* abfüllt. Sie messen jeweils 4 Becher:

Becher	1	2	3	4	$\bar{x}$
Automat A	203	206	201	206	204
Automat B	199	202	198	201	200

Näherungsweise nehmen Sie an, dass die Varianz der Füllmenge bekannt sei und $\sigma^2 = 16$ beträgt. Gehen Sie davon aus, dass die Beobachtungen jeweils einer Normalverteilung folgen ($N(\mu_A, \sigma^2)$ für Automat A und $N(\mu_B, \sigma^2)$ für Automat B).

Sie wollen statistisch absichern, dass Automat A im Mittel mehr als 200 ml abfüllt.

(a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf. (2 P)

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung an. (3 P)

- (c) Ein Kommilitone will R benutzen, um zu einem Signifikanzniveau von 5 % statistisch abzusichern, dass Automat A im Mittel mehr als 200 ml abfüllt. Leider ist er sich nicht sicher und probiert mehrere Möglichkeiten:

(1)

```
1 x <- c(199, 202, 198, 201)
2 t.test(x, mu=200, alternative="g", conf.level=0.95)
3   One Sample t-test
4 t = ?, df = 3, p-value = 0.5
```

(2)

```
1 x <- c(203, 206, 201, 206)
2 t.test(x, mu=200, alternative="l", conf.level=0.95)
3   One Sample t-test
4 t = ?, df = 3, p-value = 0.9765
```

(3)

```
1 x <- c(203, 206, 201, 206)
2 t.test(x, mu=200, alternative="g", conf.level=0.95)
3   One Sample t-test
4 t = ?, df = 3, p-value = 0.02346
```

Geben Sie die Nummer des R-Codes an, den Sie wählen würden, um den Test durchzuführen. (1 P)

Treffen Sie anhand des R-Codes eine Testentscheidung und begründen Sie diese. (2 P)

--

erreichte Punkte

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar, widersprüchlich oder unzureichend definiert sind. Notieren Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.