






Kuva 1. Pääosa pentlandiitista esiintyy puhtaina 40-200 μm partikkeleina. Kuvassa on tyypillinen vapaa pentlandiittirae (NIP).




Kuva 2. Osa pentlandiitista (NIP) on pieninä sulkeumina silikaattirakeissa. Kuvassa on tyypillisiä pentlandiittisulkeumia.




Kuva 3. Kuvassa on violariittiutunutta (VIOL) pentlandiittia (NIP).




Kuva 4. Kuvassa on iso magneettikiisurae (FEK), jossa sekarakeena kuparikiisua (CUK) ja pentlandiittia (NIP).




Kuva 5. Milleriitti (MIL) esiintyy tavallisesti pentlandiitin (NIP) kanssa sekarakeina. Näissä partikkeleissa esiintyy myös pyriittiä (SK).




Kuva 6. Kuvassa milleriitti-pentlandiittisekarae.




Kuva 7. Kuvassa on pyriitti-pentlandiittisekarae.




Kuva 8. Osa kuparikiisusta (CUK) on myrmeekiittisenä rakenteena pyriitin (SK) kanssa.



Kuva 9. Kuvassa puhdas kuparikiisurae (CUK).



Kuva 10. Näytteen kuparikiisupitoisuus on 0,08 %. Kuparikiisu esiintyy pääasiassa alle 10 μm sulkeumina silikaateissa. Kuvassa on erittäin pienikiteistä kuparikiisua silikaatin sulkeumina.



Kuva 11. Kuvassa on tyypillinen nikkoliitti-gersdorffiittirae, jossa on myös kuparikiisua (CUK).
NIK=nikkoliitti ja GERS=gersdorffiitti.



Kuva 12. Kuvassa lähes vapaa gersdorffiittipartikkeli.