Sokolov Arseny May 12, 2020 1

Proposition 1: Доказать, что
$$\left|\sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(s, t_k'\right) K_{\xi}\left(t, t_k'\right) \Delta t_k - R_{\xi\zeta}(t, s)\right| \to 0$$

Proof:

$$\begin{split} &\left|\sum_{k=0}^{n-1}\varphi\left(s,t_{k}'\right)K_{\xi}\left(t,t_{k}'\right)\Delta t_{k}-R_{\xi\zeta}(t,s)\right|=\left|\sum_{k=0}^{n-1}\varphi(s,t_{k}')(\operatorname{M}\xi_{t}\xi_{t_{k}'}-\operatorname{M}\xi_{t}\operatorname{M}\xi_{t_{k}'})\Delta t_{k}-\operatorname{M}\xi_{t}\operatorname{M}\zeta_{s}\right|\leq\\ &\left|\sum_{k=0}^{n-1}\varphi(s,t_{k}')\operatorname{M}\xi_{t}\xi_{t_{k}'}\Delta t_{k}-\operatorname{M}\xi_{t}\zeta_{s}\right|+\left|\sum_{k=0}^{n-1}\varphi(s,t_{k}')\operatorname{M}\xi\operatorname{M}\xi_{t_{k}'}\Delta t_{k}-\operatorname{M}\xi_{t}\operatorname{M}\zeta_{s}\right| \end{split}$$

Докажем, что данное выражение стремится к нулю. Для этого рассмотрим каждое слагаемое по отдельности. Для первого слагаемого имеем:

$$\begin{split} &\left|\sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t_k') \operatorname{M} \xi_t \xi_{t_k'} \Delta t_k - \operatorname{M} \xi_t \zeta_s \right| = \left| \operatorname{M} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t_k') \xi_t \xi_{t_k'} \Delta t_k - \xi_t \zeta_s \right) \right| = \\ &= \left| \operatorname{M} \left[\xi_t \left(\sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t_k') \xi_{t_k'} \Delta t_n - \zeta_s \right) \right] \right| \leq \operatorname{M} \left| \xi_t \left(\sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t_k') \xi_{t_k'}' \Delta t_k - \zeta_s \right) \right| \leq \\ &\leq \sqrt{\operatorname{M} \xi_t^2} \cdot \sqrt{\operatorname{M} \left| \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t_k') \xi_{t_k'} \Delta t_k - \zeta_s \right|^2} \longrightarrow 0 \end{split}$$

Для второго слагаемого:

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t'_k) \operatorname{M} \xi_t \operatorname{M} \xi_{t'_k} \Delta t_k - \operatorname{M} \xi_t \operatorname{M} \zeta_s \right| = \left| \operatorname{M} \xi_t \left(\sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t'_k) \operatorname{M} \xi_{t'_k} \Delta t_k - \operatorname{M} \zeta_s \right) \right| \le$$

$$\leq \left| \operatorname{M} \xi_t \right| \cdot \left| \operatorname{M} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t'_k) \xi_{t'_k} \Delta t_k - \zeta_s \right| \le \left| \operatorname{M} \xi_t \right| \cdot \operatorname{M} \sqrt{\left| \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(s, t'_k) \xi_{t'_k} \Delta t_k - \zeta_s \right|^2} \longrightarrow 0$$

Таким образом:

$$\begin{aligned} &\left| \sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(s, t_{k}'\right) K_{\xi}\left(t, t_{k}'\right) \Delta t_{k} - R_{\xi\zeta}(t, s) \right| = \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(s, t_{k}'\right) M \, \xi_{t} \xi_{t_{k}'} \Delta t_{k} - M \, \xi_{t} \zeta_{s} \right| + \left| \sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(s, t_{k}'\right) M \, \xi \, M \, \xi_{t_{k}'} \Delta t_{k} - M \, \xi_{t} \, M \, \zeta_{s} \right| \longrightarrow 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$