

Guía de Nomenclatura Inorgánica

Referencia completa de una página: las 9 funciones químicas, los tres sistemas de nomenclatura, las tablas de prefijos/sufijos y las excepciones más comunes. Guárdala o imprímela para consultarla sin conexión.

Cómo leer esta guía — el modelo de 4 colores

Cada compuesto inorgánico se arma combinando un **catión** (siempre primero) con un **anión** (siempre segundo). El color del anión te dice qué tipo de compuesto estás nombrando:

① **Ámbar** — Cation (metal, ion +)

② **Azul** — Anión simple (no metal, ion -)

③ **Violeta** — OH^- (hidróxido)

④ **Teal** — Oxoanión (anión con oxígeno)

Tres sistemas nombran el mismo compuesto de forma distinta: **Tradicional** (sufijos -oso/-ico), **Stock** (número romano entre paréntesis) y **Sistemática/IUPAC** (prefijos mono-/di-/tri-...). Los tres son correctos; el examen o el ejercicio te dice cuál usar.

Las 9 funciones inorgánicas — regla de formulación y los 3 nombres


Para cada función: cómo se combinan las valencias para armar la fórmula, y el patrón general (no solo un ejemplo) de cada sistema de nomenclatura.

1 Óxido básico



Tradicional	óxido + sufijo del metal (-oso/-ico)	óxido férrico
Stock	óxido de + metal (valencia en romano)	óxido de hierro (III)
Sistemática	prefijo+óxido de prefijo+metal	trióxido de dihierro

 **Formulación:** metal + oxígeno; se intercambian las valencias (la del uno pasa a ser el subíndice del otro).



2 Óxido ácido (también llamado anhídrido)



Tradicional	anhídrido + sufijo del no metal (-oso/-ico)	anhídrido sulfúrico
Stock	óxido de + no metal (valencia en romano)	óxido de azufre (VI)
Sistemática	prefijo+óxido de prefijo+no metal	trióxido de azufre

 **Formulación:** no metal + oxígeno; se intercambian las valencias, igual que en el óxido básico. $\text{S}^{6+} + \text{O}^{2-} \rightarrow$



3 Hidruro metálico



Tradicional	hidruro + sufijo o "de" + metal (si es valencia fija)	hidruro de calcio
Stock	hidruro de + metal (valencia en romano)	hidruro de calcio
Sistemática	prefijo+hidruro de metal	dihidruro de calcio

 **Formulación:** metal + tantos hidrógenos (H^-) como indique la valencia del metal. $\text{Ca}^{2+} + \text{H}^- \rightarrow \text{CaH}_2$

4 Ácido hídrico



Disuelto en agua	ácido + no metal+hídrico	ácido clorhídrico (HCl(aq))
Puro / gas	no metal+uro de hidrógeno	cloruro de hidrógeno (HCl(g))

 **Formulación:** tantos hidrógenos (H^+) como indique la valencia del no metal, sin oxígeno. $\text{H}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{HCl}$

5 Hidróxido (base)



Tradicional	hidróxido + sufijo del metal (-oso/-ico)	hidróxido férrico
Stock	hidróxido de + metal (valencia en romano)	hidróxido de hierro (III)
Sistemática	prefijo+hidróxido de metal	trihidróxido de hierro

 **Formulación:** metal + tantos grupos OH^- como indique su valencia. $\text{Fe}^{3+} + \text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$

6 Ácido oxácido



Tradicional	ácido + sufijo del no metal (-oso/-ico, con hipo-/per- si tiene 4 valencias)	ácido sulfúrico
Sistemática	prefijo+oxo+prefijo+no metal+ato (valencia) de hidrógeno	tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno

 **Formulación:** se escribe el óxido ácido correspondiente y se le suma una molécula de agua. $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

7 Sal binaria



Tradicional	no metal+uro + sufijo del metal (-oso/-ico)	sulfuro férrico
Stock	no metal+uro de metal (valencia en romano)	sulfuro de hierro (III)
Sistemática	prefijo+no metal+uro de prefijo+metal	trisulfuro de dihierro

 **Formulación:** metal + no metal; se intercambian las valencias. $\text{Fe}^{3+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Fe}_2\text{S}_3$

8 Sal oxigenada



Tradicional	oxoanión + sufijo del metal (-oso/-ico)	sulfato férrico
Stock	oxoanión de metal (valencia en romano)	sulfato de hierro (III)
Sistemática	(bis/tris/tetrakis+)oxoanión de prefijo+metal	tris(tetraoxosulfato) de dihierro

 **Formulación:** metal + oxoanión; se intercambian las valencias, el metal siempre a la izquierda. $\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

9 Sal ácida

NaHCO₃

Tradicional	bi+oxoanión de metal	bicarbonato de sodio
Stock/Sistemática	hidrógeno(oxoanión) de metal	hidrogenocarbonato de sodio

 **Formulación:** el ácido poliprótico no cedió todos sus H⁺ al neutralizarse; el anión conserva 1 o 2 hidrógenos ionizables. $\text{Na}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{NaHCO}_3$

Un mismo compuesto, dos nombres tradicionales: a los óxidos ácidos (función 2) también se les puede llamar **anhídridos**. Ambos nombres son correctos y se usan indistintamente en Tradicional.

 **Nota IonNom:** en el Juego y en NomenClash, los **ácidos oxácidos**, las **sales oxigenadas** y los **ácidos hídricos** se validan únicamente con nomenclatura **Tradicional**. Stock y Sistemática son correctos y se enseñan en Teoría, pero no se aceptan como respuesta en esas tres categorías del juego.

Sufijos y prefijos de la nomenclatura Tradicional

METALES CON 2 VALENCIAS (ÓXIDOS, HIDRUROS, SALES BINARIAS, HIDRÓXIDOS)

VALENCIA	SUFIJO	EJEMPLO (FE: +2 / +3)
Menor	-oso	Fe ²⁺ → ferroso (óxido ferroso)
Mayor	-ico	Fe ³⁺ → férrico (óxido férrico)

OXOÁCIDOS Y OXOANIONES CON HASTA 4 VALENCIAS (FAMILIA DEL CLORO)

EO	ÁCIDO	OXOANIÓN
Más bajo	hipo-...-oso (hipocloroso)	hipo-...-ito (hipoclorito)
Bajo	...-oso (cloroso)	...-ito (clorito)
Alto	...-ico (clórico)	...-ato (clorato)
Más alto	per-...-ico (perclórico)	per-...-ato (perclorato)

Metales de **valencia fija** (no llevan sufijo ni número romano): Na, K, Li, Ag⁺¹ · Ca, Mg, Ba, Zn⁺² · Al⁺³.

Prefijos de la nomenclatura Sistemática (IUPAC)

1	2	3	4	5	6
mono-	di-	tri-	tetra-	penta-	hexa-

Cuenta los átomos de cada elemento en la fórmula y antepón el prefijo (el "mono-" del catión suele omitirse). Nunca mezcles prefijos de Sistemática con sufijos de Tradicional o números romanos de Stock — es el error más común en exámenes.

Cuando el oxoanión necesita un prefijo compuesto (2 o más unidades de un anión ya complejo), se usan en su lugar: bis- (2), tris- (3), tetrakis- (4), pentakis- (5) — así se evita la ambigüedad. Ejemplo:

$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{tris}(\text{tetraoxosulfato})$ de dihierro.

Esquema de valencias — estados de oxidación más comunes

Agrupados como en la tabla periódica: **ámbar = metales (cationes)**, **azul = no metales (aniones)**. Los números son los estados de oxidación que más aparecen en 10°-11°.

ALCALINOS (IA) Li Na K +1 — fija	ALCALINOTÉRREOS (IIA) Mg Ca Ba +2 — fija	OTROS METALES DE VALENCIA FIJA Ag Zn Al Ag +1 · Zn +2 · Al +3	METALES DE TRANSICIÓN (VALENCIA VARIABLE) Fe Cu Sn Pb Cr Mn Hg Fe +2/+3 · Cu +1/+2 · Sn +2/+4 · Pb +2/+4 · Cr +2/+3/+6 · Mn +2/+3/+4/+6/+7 · Hg +1/+2
HALÓGENOS (VIIA) F Cl Br I F -1 (solo) · Cl, Br, I: -1 como anión; +1/+3/+5/+7 en oxoácidos	ANFÍGENOS (VIA) O S Se Te O -2 (solo) · S, Se, Te: -2 como anión; +4/+6 en oxoácidos	NITROGENOIDEOS (VA) N P As -3 como anión; +3/+5 en oxoácidos	CARBONOIDEOS (IVA) C Si C +2/+4/-4 · Si +4

Los metales de transición variable no se "adivinan": el estado de oxidación se calcula igualando a cero la suma de cargas del compuesto (ver Excepciones más abajo para Mn, Cr y Hg).

Excepciones que más confunden en clase

MANGANESO — 5 ESTADOS DE OXIDACIÓN

Con +2, +3 y +4 la Tradicional solo alcanza para dos (manganoso/mangánico); el +3 **no tiene nombre Tradicional** y exige Stock: óxido de manganeso (III). Con +6 y +7 solo existe como oxoanión: manganato / permanganato de potasio.

CROMO — ACTÚA COMO NO METAL EN +6

$\text{Cr}^{2+}/\text{Cr}^{3+}$ forman óxidos básicos normales. En +6, el Cr se comporta como no metal: CrO_3 es un **anhídrido** (no un óxido básico) y forma ácido crómico, cromato (CrO_4^{2-}) y dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$).

MERCURIO — EL ÚNICO CATIÓN DIATÓMICO

El ion mercurioso es **Hg_2^{2+}** (dos átomos de Hg unidos, EO +1 cada uno), nunca " Hg^+ " suelto. Hg_2Cl_2 = cloruro mercurioso; HgCl_2 (con Hg^{2+}) = cloruro mercúrico.

ÁCIDOS HÍDRICOS: EL MISMO HX TIENE DOS NOMBRES

En estado puro/gaseoso (sin agua): *haluro de hidrógeno* (HCl(g) = cloruro de hidrógeno). Disuelto en agua: *ácido ...hídrico* (HCl(aq) = ácido clorhídrico). Ojo con la "h" intercalada: clor**h**ídrico, sulf**h**ídrico, no "clorídrico".

LOS TRES TIPOS DE "HIDRURO"

Metálico (H^- , metal + H, ej. CaH_2) · **Ácido hídrico** (H^+ + no metal, ej. HCl) · **Agua** (H_2O , caso único: hidrógeno + OH^-). No son la misma familia aunque las tres lleven hidrógeno.

Sales ácidas — el ácido que no cedió todo su hidrógeno

Cuando un ácido con 2 o más hidrógenos ionizables (poliprótico) solo cede parte de ellos al neutralizarse, el anión que queda conserva hidrógeno y se nombra con el prefijo **bi-** (Tradicional) o **hidrógeno-** (Stock/Sistemática).

FÓRMULA	TRADICIONAL	STOCK / SISTEMÁTICA
NaHCO_3	bicarbonato de sodio	hidrogenocarbonato de sodio
NaHSO_4	bisulfato de sodio	hidrogenosulfato de sodio
Na_2HPO_4	fosfato ácido de disodio	hidrogenofosfato de disodio
NaH_2PO_4	fosfato diácido de sodio	dihidrogenofosfato de sodio

Los 4 pasos para nombrar cualquier compuesto

① **Identifica el catión** (primer elemento, metal) y si su valencia es fija o variable · ② **Identifica el anión** por su color/tipo (simple, OH^- u oxoanión) · ③ **Determina la función** con la tabla maestra de arriba · ④ **Aplica las reglas** del sistema pedido (Tradicional, Stock o Sistemática) sin mezclarlas entre sí.