

Véletlen fizikai folyamatok, hatodik házi feladat

Horváth Bendegúz

2018. március 24.

1. feladat

A feladat szövege

Lokalizált mágneses momentum (μ) z-tengely irányú B mágneses térben van. A mágneses momentum (μ) a tér irányában $\pm\mu B$ értéket vehet fel, s ezekben az állapotokban energiája $\mp\mu_B B$. A mágneses momentum T hőmérsékletű közeggel van egyensúlyban, s kölcsönhatás eredményeképpen μ billeg a $-\mu B$ és $+\mu B$ állapotok között ($-\mu B \leftrightarrow +\mu B$).

(i) Írjuk fel a folyamat master egyenletét!

(ii) Válasszunk olyan átmeneti rátákat, amelyek kielégítik a részletes egyensúly elvét!

(iii) Határozzuk meg az átlagos mágneses momentum $\langle\mu(t)\rangle$ időfejlődését, ha kezdetben ($t = 0$) a mágneses momentum a z-tengely pozitív irányába mutatott.

A feladat megoldása

(i) A rendszer két állapot között változik, így ezekre az állapotokra felírva a master egyenlet:

$$\partial_t P_{-\mu}(t) = -w_0 P_{-\mu}(t) + w P_{+\mu}(t)$$

$$\partial_t P_{+\mu}(t) = w_0 P_{+\mu}(t) - w P_{-\mu}(t)$$

Az egyenletekben $P_{\pm\mu}(t)$ a $\pm\mu$ állapotban tartózkodás valószínűségét jelöli.

(ii) Először próbáljuk meg megoldani a sajátértékegyenletet:

$$\partial_t \begin{pmatrix} P_{-\mu}(t) \\ P_{+\mu}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -w_0 & w \\ w_0 & -w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{-\mu}(t) \\ P_{+\mu}(t) \end{pmatrix}$$

Az Ising-spinrendszerhez hasonlóan, a $P_{\pm\mu}^{(e)} = \frac{1}{Z} e^{-\beta E(\mp\mu B)}$. A sajátértékek a számolás után a következőknek adódnak: $\lambda_1 = 0$, ez az egyensúlyi állapothoz tartozik, és $\lambda_2 = -(w_0 + w)$. Ezek után a részletes egyensúlyi elvét kielégítő átmeneti rátákat kell meghatározni. Legyen

$$\frac{w_{n,n'}}{w_{n',n}} = e^{-\beta(E_{n'} - E_n)}$$

Ha $\Delta E = (E_{n'} - E_n) > 0$, akkor az átmeneti ráta

$$w_{n',n} = \frac{1}{\tau} e^{-\beta(E_{n'} - E_n)}.$$

A $\Delta E = \pm 2\mu_B B$ és pozitív, ha felfelé álló állapotból lefelé álló állapotba ugrott a mágneses momentum. Ha $\Delta E < 0$, akkor $w_{n',n} = \frac{1}{\tau}$, τ az ugrások közti idő. Így

$$w_0 = \frac{1}{\tau}$$

$$w = \frac{1}{\tau} e^{-\beta 2\mu_B B}$$

megkaptuk az átmeneti rátákat.

(iii) Az előző feladatrészen kiszámoltuk a sajátértékeket, így az állapotban tartózkodás valószínűségét leíró vektort a következő módon kaphatjuk meg:

$$\vec{P}(t) = \vec{P}^{(e)} + e^{\lambda_2 t} a_2 \vec{P}_2$$

Az a_2 együtthatót a kezdeti feltételből határozhatjuk meg, ami esetünkben

$$\vec{P}(0) = (0, 1)^T = \vec{P}^{(e)} + a_2 \vec{P}_2.$$

$\vec{P}_2 = (1, -1)^T$ sajátvektor, így behelyettesítve az egyenletbe

$$a_2 = -\frac{1}{Z} e^{-\beta \mu_B B}$$

Tehát

$$\vec{P}(t) = \frac{1}{Z} \begin{pmatrix} e^{-\beta \mu_B B} \\ e^{+\beta \mu_B B} \end{pmatrix} - \frac{1}{Z} e^{-\beta \mu_B B} e^{-\frac{1+\frac{1}{\tau} e^{-\beta 2\mu_B B}}{\tau} t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Nekünk viszont a feladat teljes megoldásához a mágnesezettség várható értéke kell, amit a következő módon kaptaunk meg:

$$\langle \mu(t) \rangle = (-1, 1)^T \vec{P}(t).$$

$$\langle \mu(t) \rangle = \frac{1}{Z} \left[-e^{-\beta \mu_B B} + 2e^{-\beta \mu_B B} \cdot e^{-\frac{1+\frac{1}{\tau} e^{-\beta 2\mu_B B}}{\tau} t} + e^{\beta \mu_B B} \right]$$

2. feladat

A feladat szövege

Legyen egy egész értékeket felvevő stochasztikus változó, n , momentum-generátor függvénye $G(s)$. A normalizációból következik, hogy $G(0) = 1$, s n momentumai G deriváltján keresztül kifejezhetők:

$$\langle n \rangle = -\frac{dG(s)}{ds} \Big|_{s=0}, \dots, \quad \langle n^k \rangle = (-1)^k \frac{d^k G(s)}{ds^k} \Big|_{s=0}$$

A kumuláns generátor függvény a momentum-generátor függvény logaritmus,

$$\Phi(s) = \ln G(s)$$

s a kumulánsokat a következőképpen kapjuk:

$$\langle \kappa_1 \rangle = \frac{d\Phi(s)}{ds} \Big|_{s=0}, \dots, \quad \langle \kappa_k \rangle = (-1)^k \frac{d^k \Phi}{ds^k} \Big|_{s=0}$$

Az első kumulánsokat könnyű kiszámolni, s egyszerű értelműk van

$$\langle \kappa_1 \rangle = \langle n \rangle, \quad \langle \kappa_2 \rangle = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2,$$

Feladatok:

(i) Határozzuk meg a kumuláns-generáló függvényt az előadáson tárgyalt sorbanaállási problémára, s számítsuk ki az első két kumuláns! Vegyük észre, hogy az átlagos sorhossz és annak szórása lényegesen egyszerűbben kapható meg így, mint ha a momentum-generáló függvényen keresztül számoltuk volna.

(ii) Számítsuk ki a 3. kumuláns (κ_3) a momentumokon keresztül! Mi lesz κ_3 értéke, ha n eloszlásfüggvénye szimmetrikus ($P_n = P_{-n}$)?

A feladat megoldása

A momentum-generátor függvényünk a következő alakú:

$$G(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn} P_n$$

P_n -et tudjuk az órán felírt megoldásból,

$$P_n = \frac{\lambda_n \lambda_{n-1} \dots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_1} P_0$$

$$P_{-n} = \frac{\mu_0 \mu_{-1} \dots \mu_{-(n+1)}}{\lambda_{-1} \lambda_{-2} \dots \lambda_{-n}} P_0$$

Esetünkben a momentum-generátor függvény csak 0-tól megy a szummázás, így onnantól fog kelleni a P_n . Számoljuk ki az első kumuláns:

$$\langle \kappa_1 \rangle = -\frac{d\Phi(s)}{ds} \Big|_{s=0} = -\frac{d \ln(G(s))}{ds} \Big|_{s=0} = -\left(\frac{1}{G(s)} \frac{dG(s)}{ds} \right) \Big|_{s=0} = -\frac{dG(s)}{ds} \Big|_{s=0} = -(-n)P_0 + \sum_{n=1}^{\infty} P_n =$$

$$= nP_0 + (1 - P_0) = P_0(n - 1) + 1$$

A második kumuláns:

$$\begin{aligned}\langle \kappa_2 \rangle &= \frac{d}{ds} \frac{d}{ds} \ln(G(s)) \Big|_{s=0} = \left(\frac{d}{ds} \frac{1}{G(s)} + \frac{d^2 G(s)}{ds^2} \right) \Big|_{s=0} = \left(-\frac{1}{G^2(s)} \frac{dG(s)}{ds} + \frac{d^2 G(s)}{ds^2} \right) \Big|_{s=0} = \\ &= \langle n \rangle + n^2 P_1 + (1 - P_1 - P_0)\end{aligned}$$

3. feladat

A feladat szövege

Meredek hegyoldalban függőlegesen l távolságra vannak a kapaszkodók. A hegymászó w rátával lép felfelé, s w_0 annak a rátája, hogy visszacsúszik az $nl = 0$ szintre, s onnan folytatja a mászást [ez a probléma példája az ún. újrakezdési (reset) folyamatoknak].

Feladatok:

- (i) Írjuk fel az egyenletet, amely meghatározza, hogy a hegymászó milyen P_n valószínűséggel van nl magasságban!
- (ii) Határozzuk meg, hogy átlagosan milyen magasra jut a hegymászó!

A feladat megoldása